調査地No.5

区域 北部

所在地 沼田市利根町追貝

樹種ヒノキ林齢41年生標高657m方位S75W傾斜7°

	間伐前	間伐後1年目	間伐後2年目	間伐後3年目
相対照度	1.8%	7.6%	6.0%	3.5%
植被率	2.3%	2.3%	4.5%	5.8%

備考


過去に間伐されているが、間伐前は林冠が閉鎖 していた。林床は落葉層が薄く、植生がほとん どみられかったが、間伐後は林内が明るくな り、植被率がやや改善傾向である。




林内の様子



林冠の様子





林床の様子





林床の様子

調査地No.4

区域 北部

所在地 沼田市利根町穴原

樹種ヒノキ林齢25年生標高877m方位N25W傾斜45°

	間伐前	間伐後1年目	間伐後2年目	間伐後3年目
相対照度	3.9%	-	6.0%	3.9%
植被率	1.0%	1.0%	5.3%	8.5%

備考

急峻で礫の多い地形である。植栽木は成長が悪く、間伐前に倒木がみられた。間伐後は植被率がやや改善傾向である。



林内の様子



林冠の様子



林床の様子





林床の様子

調査地No.6

区域 県央

所在地 渋川市赤城町溝呂木

樹種 ヒノキ 林齢 28年生 標高 541m 方位 N85W 傾斜 7°

	間伐前	間伐後1年目	間伐後2年目	間伐後3年目
相対照度	1.3%	5.0%	2.9%	1.7%
植被率	3.0%	0.3%	10.0%	5.3%

備考

平坦な林分であるが、間伐前は林冠にツルが繁茂し、植栽木に支障をきたしていた。間伐後は林内が明るくなり、間伐後2年目には植被率の増加がみられたが、相対照度が全林分中最も低く、植生の回復が遅れている。



林内の様子



林冠の様子



林床の様子





林床の様子