(身体状況調査)

表46 BMIの平均値及び標準偏差一年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差－総数・男性・女性、15歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	593	22.7	3.4	0.2	13.8	16.8	18.0	18.7	20.3	22.3	24.9	27.0	28.8	32.1	36.6
15～19歳	17	19.6	1.8	0.2	16.5	16.5	16.5	18.1	18.6	19.1	20.5	23.4	24.2	24.2	24.2
20～29歳	28	21.6	4.0	1.2	13.8	14.0	17.0	17.4	18.0	20.7	23.9	29.0	29.7	29.7	29.7
30～39歳	50	23.7	3.9	0.5	17.0	17.0	18.5	19.2	20.5	23.1	26.1	30.2	31.8	32.2	32.2
40～49歳	62	22.2	3.3	0.4	15.0	15.0	18.2	19.6	20.2	21.3	23.2	26.2	28.7	34.4	34.4
50～59歳	76	22.5	3.1	0.6	16.8	16.8	17.6	19.0	20.2	21.6	24.9	27.5	28.0	30.5	30.5
60～69歳	110	23.0	3.3	0.3	16.8	16.8	18.1	19.0	20.3	23.1	25.2	27.3	28.1	33.0	33.1
70歳以上	250	23.1	3.2	0.2	14.8	17.2	18.0	18.8	21.1	22.8	25.4	26.7	28.7	31.4	36.6
(再掲)20歳以上	576	22.8	3.3	0.2	13.8	16.8	18.0	18.8	20.4	22.5	25.0	27.0	28.9	32.2	36.6
(再掲)20～69歳	326	22.7	3.5	0.3	13.8	16.8	18.0	18.8	20.2	22.2	24.7	27.6	29.6	33.0	34.4
(再掲)40～69歳	248	22.6	3.2	0.2	15.0	16.8	18.1	19.1	20.2	22.1	24.6	26.8	28.1	33.6	34.4
(再掲)65歳以上	319	23.1	3.2	0.2	14.8	17.1	18.1	19.0	21.2	22.8	25.4	26.8	28.6	32.1	36.6
(再掲)65～69歳	69	23.3	3.3	0.4	16.8	16.8	18.6	19.2	21.1	23.3	25.2	27.6	29.4	33.1	33.1
(再掲)70～74歳	95	23.4	3.3	0.2	17.4	17.5	18.1	19.1	21.3	23.4	25.6	26.5	29.2	36.6	36.6
(再掲)75～79歳	70	22.9	3.1	0.5	17.2	17.2	17.6	18.8	21.1	22.4	25.1	26.8	28.5	32.2	32.2
(再掲)80～84歳	55	22.4	2.8	0.3	14.8	14.8	17.4	18.3	20.5	22.6	24.2	26.4	26.7	27.0	27.0
(再掲)80歳以上	85	22.9	3.1	0.3	14.8	15.0	17.5	18.5	21.1	22.7	25.0	27.0	27.9	30.1	30.1
(再掲)85歳以上	30	23.6	3.4	0.4	17.0	17.0	17.6	18.2	21.9	23.2	25.6	28.8	30.0	30.1	30.1
(再掲)20歳以上※1	576	22.8	3.4	0.2	13.8	16.8	17.8	18.6	20.3	22.4	25.0	27.6	29.4	32.2	36.6
(再掲)20～49歳※1	140	22.6	3.8	0.4	13.8	15.5	17.5	18.2	20.2	22.2	24.5	28.7	30.0	34.0	34.4
(再掲)65～74歳※1	164	23.4	3.3	0.2	16.8	17.4	18.2	19.2	21.3	23.4	25.5	27.2	29.2	33.7	36.6
(再掲)75歳以上※1	155	22.8	3.1	0.2	14.8	16.4	17.5	18.5	21.1	22.6	25.0	27.0	28.2	31.2	32.2
男性	270	23.5	3.3	0.2	15.0	17.1	18.4	19.7	21.3	23.4	25.4	27.5	29.3	33.6	36.6
15～19歳	10	19.8	2.4	0.4	16.5	16.5	16.5	18.2	18.9	21.8	24.1	24.2	24.2	24.2	24.2
20～29歳	11	23.7	3.7	1.1	17.3	17.3	17.3	17.7	22.3	22.9	26.6	29.2	29.6	29.6	29.6
30～39歳	25	24.7	3.8	0.7	17.0	17.0	18.4	20.1	22.2	24.3	27.0	30.7	32.0	32.2	32.2
40～49歳	27	23.2	3.7	0.6	15.0	15.0	19.4	20.2	20.5	22.4	24.5	28.2	34.0	34.4	34.4
50～59歳	37	23.5	2.8	0.4	18.5	18.5	19.0	20.0	21.1	24.1	25.3	27.6	28.3	29.9	29.9
60～69歳	45	23.9	3.3	0.6	18.1	18.1	19.6	19.8	21.2	23.6	25.5	27.6	31.3	33.1	33.1
70歳以上	115	23.4	2.9	0.2	17.3	17.3	18.1	19.6	21.3	23.5	25.6	26.6	27.5	35.5	36.6
(再掲)20歳以上	260	23.6	3.2	0.2	15.0	17.2	18.9	20.0	21.3	23.6	25.6	27.6	29.5	33.7	36.6
(再掲)20～69歳	145	23.8	3.4	0.3	15.0	17.0	19.4	20.0	21.2	23.6	25.5	28.1	30.4	33.9	34.4
(再掲)40～69歳	109	23.6	3.2	0.3	15.0	16.2	19.7	20.0	20.9	23.5	25.3	27.6	29.7	34.3	34.4
(再掲)65歳以上	144	23.6	3.1	0.2	17.3	17.3	18.2	19.8	21.4	23.6	25.6	27.1	28.3	34.8	36.6
(再掲)65～69歳	29	24.3	3.5	0.6	18.1	18.1	19.1	19.9	21.6	23.6	25.6	29.5	32.5	33.1	33.1
(再掲)70～74歳	40	23.8	3.3	0.5	17.5	17.5	18.5	20.3	21.3	23.6	25.8	26.6	28.8	36.6	36.6
(再掲)75～79歳	36	22.8	2.8	0.6	17.3	17.3	17.3	18.2	20.8	23.0	24.5	26.2	27.6	30.9	30.9
(再掲)80～84歳	26	23.1	2.7	0.5	17.6	17.6	17.6	19.0	21.9	23.1	25.6	26.4	26.8	27.0	27.0
(再掲)80歳以上	39	23.6	2.6	0.4	17.6	17.6	17.9	20.1	22.0	23.4	25.6	27.3	27.4	28.4	28.4
(再掲)85歳以上	13	24.3	2.5	0.4	20.6	20.6	20.6	20.6	22.2	24.5	26.8	27.9	28.4	28.4	28.4
(再掲)20歳以上※1	260	23.7	3.3	0.2	15.0	17.1	18.5	19.9	21.3	23.5	25.6	27.7	29.6	33.7	36.6
(再掲)20～49歳※1	63	23.8	3.8	0.5	15.0	15.0	17.7	19.9	21.1	23.0	26.0	29.5	31.2	34.4	34.4
(再掲)65～74歳※1	69	24.1	3.4	0.5	17.5	17.6	19.2	20.4	21.3	23.6	25.7	27.7	31.2	36.6	36.6
(再掲)75歳以上※1	75	23.2	2.7	0.3	17.3	17.3	17.5	19.5	21.5	23.4	25.0	26.6	27.4	30.9	30.9
女性	323	22.1	3.3	0.2	13.8	16.8	17.6	18.3	19.6	21.4	24.1	26.7	28.8	31.3	33.6
15～19歳	7	19.5	0.8	0.1	18.4	18.4	18.4	18.5	18.7	19.3	20.4	20.7	20.7	20.7	20.7
20～29歳	17	20.3	3.7	1.1	13.8	13.8	15.9	17.2	17.5	20.2	20.9	26.8	29.7	29.7	29.7
30～39歳	25	22.5	3.8	0.8	18.3	18.3	18.3	18.6	19.5	21.2	24.3	28.7	31.4	32.0	32.0
40～49歳	35	21.4	2.7	0.4	17.8	17.8	18.0	18.8	19.9	20.6	22.2	25.5	26.6	33.6	33.6
50～59歳	39	21.5	3.2	0.7	16.8	16.8	16.8	17.7	19.7	20.8	23.2	26.6	28.7	30.5	30.5
60～69歳	65	22.3	3.1	0.6	16.8	16.8	17.6	18.4	19.2	22.0	24.7	26.5	27.7	29.3	29.3
70歳以上	135	22.8	3.3	0.3	14.8	16.1	17.8	18.5	20.6	22.2	25.1	27.0	29.6	31.8	32.2
(再掲)20歳以上	316	22.1	3.3	0.3	13.8	16.8	17.6	18.3	19.7	21.6	24.2	26.7	28.9	31.4	33.6
(再掲)20～69歳	181	21.7	3.2	0.3	13.8	16.8	17.5	18.1	19.5	20.9	23.5	26.4	28.6	31.7	33.6
(再掲)40～69歳	139	21.8	3.0	0.4	16.8	16.8	17.6	18.4	19.7	21.1	23.5	26.2	27.6	31.7	33.6
(再掲)65歳以上	175	22.7	3.2	0.3	14.8	16.4	17.9	18.6	20.5	22.3	25.1	26.7	29.1	31.2	32.2
(再掲)65～69歳	40	22.6	2.9	0.7	16.8	16.8	18.2	18.9	20.2	22.4	25.1	26.4	27.7	28.6	28.6
(再掲)70～74歳	55	23.2	3.3	0.3	17.4	17.5	17.9	18.6	20.7	22.9	25.2	27.6	29.3	31.3	31.3
(再掲)75～79歳	34	22.9	3.3	0.5	17.2	17.2	17.8	19.0	21.3	21.8	25.6	27.7	29.7	32.2	32.2
(再掲)80～84歳	29	21.7	2.8	0.5	14.8	14.8	16.2	17.9	19.8	21.6	23.1	26.4	26.8	27.0	27.0
(再掲)80歳以上	46	22.2	3.4	0.3	14.8	14.8	17.2	18.0	20.1	22.0	23.6	26.7	29.4	30.1	30.1
(再掲)85歳以上	17	23.0	4.1	0.5	17.0	17.0	17.0	17.6	19.8	22.3	25.6	30.0	30.1	30.1	30.1
(再掲)20歳以上※1	316	22.0	3.3	0.3	13.8	16.8	17.5	18.1	19.6	21.3	23.9	26.7	29.0	31.5	33.6
(再掲)20～49歳※1	77	21.3	3.4	0.3	13.8	14.8	17.5	17.9	19.3	20.6	22.2	26.5	29.1	33.6	33.6
(再掲)65～74歳※1	95	22.9	3.1	0.4	16.8	16.8	18.0	18.8	20.5	22.8	25.1	26.3	29.0	31.3	31.3
(再掲)75歳以上※1	80	22.5	3.4	0.4	14.8	14.9	17.4	18.4	20.5	21.9	25.0	27.0	29.9	32.2	32.2

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦2名を除外している。

注2) BMIは体重(kg)／(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表47-1 BMIの状況—年齢階級別、肥満度別(BMI別)、割合、標準誤差—総数・男性・女性、15歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	総数	593	8.6%	1.3%	67.6%	1.1%	23.8%	1.6%	21.1%	1.7%
	15～19歳	17	19.1%	7.2%	80.9%	7.2%	0.0%	0.0%	72.8%	9.2%
	20～29歳	28	29.6%	13.7%	50.0%	14.6%	20.4%	13.9%	36.7%	12.6%
	30～39歳	50	3.6%	2.7%	69.3%	6.5%	27.1%	6.7%	19.0%	6.4%
	40～49歳	62	5.8%	3.0%	80.3%	5.4%	13.9%	4.4%	19.2%	6.1%
	50～59歳	76	7.1%	3.4%	71.9%	3.5%	21.0%	3.3%	21.0%	4.6%
	60～69歳	110	7.5%	2.5%	67.3%	4.2%	25.3%	2.8%	21.1%	3.5%
	70歳以上	250	8.1%	2.5%	63.4%	3.7%	28.5%	3.7%	16.1%	1.8%
	(再掲)20歳以上	576	8.3%	1.4%	67.2%	1.0%	24.5%	1.8%	19.4%	1.8%
	(再掲)20～69歳	326	8.5%	1.5%	69.8%	2.9%	21.8%	2.7%	21.8%	3.2%
	(再掲)40～69歳	248	6.9%	1.1%	72.2%	2.1%	20.9%	2.1%	20.6%	2.5%
	(再掲)65～74歳	164	5.0%	1.7%	64.5%	2.4%	30.5%	2.4%	15.7%	2.6%
	(再掲)75歳以上	155	9.3%	2.6%	65.2%	4.6%	25.5%	4.5%	15.9%	2.3%
	(再掲)20歳以上※1	576	9.0%	1.7%	67.0%	1.6%	23.9%	2.1%	20.1%	2.4%
	(再掲)20～29歳※1	28	26.7%	12.5%	49.0%	15.3%	24.3%	15.6%	32.7%	11.8%
	(再掲)20～39歳※1	78	15.4%	6.2%	58.9%	8.5%	25.7%	8.2%	26.0%	7.7%
	(再掲)20～49歳※1	140	11.4%	4.1%	67.5%	6.6%	21.2%	5.3%	22.5%	5.7%
	(再掲)20～69歳※1	326	9.4%	2.0%	68.6%	3.6%	22.0%	3.6%	21.7%	3.8%
	(再掲)40～69歳※1	248	6.6%	1.1%	73.1%	1.8%	20.3%	2.1%	19.7%	2.5%
	(再掲)65～74歳※1	164	5.0%	1.7%	64.8%	2.3%	30.2%	2.3%	15.7%	2.5%
(再掲)75歳以上※1	155	9.5%	2.6%	65.1%	4.2%	25.4%	4.3%	16.4%	2.2%	
男性	総数	270	5.1%	1.2%	65.9%	3.0%	29.0%	2.2%	11.9%	2.6%
	15～19歳	10	27.3%	8.2%	72.7%	8.2%	0.0%	0.0%	70.8%	10.2%
	20～29歳	11	16.2%	10.0%	45.5%	19.8%	38.4%	21.2%	18.5%	10.3%
	30～39歳	25	2.8%	3.0%	61.0%	9.4%	36.2%	9.1%	7.8%	5.3%
	40～49歳	27	2.7%	2.9%	80.0%	5.1%	17.3%	4.6%	5.5%	5.9%
	50～59歳	37	0.0%	0.0%	69.7%	4.4%	30.3%	4.4%	8.1%	4.2%
	60～69歳	45	1.9%	1.9%	68.7%	6.8%	29.4%	7.2%	11.4%	5.5%
	70歳以上	115	6.5%	3.1%	62.2%	8.1%	31.2%	5.9%	10.7%	3.0%
	(再掲)20歳以上	260	4.3%	1.3%	65.7%	3.2%	30.0%	2.4%	9.9%	2.0%
	(再掲)20～69歳	145	2.8%	1.4%	68.1%	3.9%	29.1%	3.4%	9.3%	2.9%
	(再掲)40～69歳	109	1.5%	1.0%	72.0%	3.3%	26.5%	3.1%	8.7%	3.5%
	(再掲)65～74歳	69	3.4%	2.5%	61.2%	5.5%	35.4%	5.9%	9.3%	2.7%
	(再掲)75歳以上	75	7.8%	4.3%	65.5%	9.9%	26.7%	7.0%	11.5%	3.8%
	(再掲)20歳以上※1	260	4.8%	1.5%	65.2%	2.9%	30.0%	2.9%	10.1%	2.3%
	(再掲)20～29歳※1	11	16.2%	10.0%	45.5%	19.8%	38.4%	21.2%	18.5%	10.3%
	(再掲)20～39歳※1	36	9.6%	5.1%	53.1%	11.6%	37.3%	11.6%	13.2%	5.6%
	(再掲)20～49歳※1	63	6.8%	4.0%	63.9%	8.2%	29.2%	7.9%	10.1%	5.2%
	(再掲)20～69歳※1	145	4.2%	2.2%	66.3%	5.0%	29.5%	4.5%	9.9%	3.2%
	(再掲)40～69歳※1	109	1.5%	1.1%	72.8%	3.1%	25.7%	2.7%	8.3%	3.4%
	(再掲)65～74歳※1	69	3.3%	2.5%	62.2%	5.1%	34.5%	5.8%	9.4%	2.8%
(再掲)75歳以上※1	75	7.8%	4.3%	65.5%	9.9%	26.7%	7.0%	11.5%	3.8%	
女性	総数	323	11.7%	2.2%	69.1%	3.4%	19.2%	3.1%	29.1%	2.1%
	15～19歳	7	10.2%	11.0%	89.8%	11.0%	0.0%	0.0%	75.1%	14.1%
	20～29歳	17	38.0%	17.1%	52.8%	15.2%	9.2%	8.5%	48.1%	14.6%
	30～39歳	25	4.4%	4.5%	78.6%	8.3%	17.0%	8.3%	31.4%	9.1%
	40～49歳	35	8.3%	4.1%	80.6%	6.6%	11.2%	6.0%	30.5%	9.5%
	50～59歳	39	14.1%	6.3%	74.1%	5.4%	11.8%	5.9%	33.7%	8.3%
	60～69歳	65	11.6%	4.0%	66.2%	7.8%	22.2%	7.5%	28.5%	6.6%
	70歳以上	135	9.5%	3.7%	64.4%	4.3%	26.1%	3.8%	20.9%	2.5%
	(再掲)20歳以上	316	11.8%	2.4%	68.5%	3.6%	19.8%	3.3%	27.8%	2.3%
	(再掲)20～69歳	181	13.3%	2.2%	71.2%	4.9%	15.5%	4.4%	32.5%	3.7%
	(再掲)40～69歳	139	11.5%	2.2%	72.4%	4.4%	16.1%	4.9%	30.6%	3.5%
	(再掲)65～74歳	95	6.3%	2.9%	67.1%	5.1%	26.6%	5.3%	20.7%	4.8%
	(再掲)75歳以上	80	10.9%	4.2%	64.8%	4.9%	24.3%	4.7%	20.3%	3.1%
	(再掲)20歳以上※1	316	12.9%	2.5%	68.7%	3.7%	18.4%	3.1%	29.4%	2.8%
	(再掲)20～29歳※1	17	38.0%	17.1%	52.8%	15.2%	9.2%	8.5%	48.1%	14.6%
	(再掲)20～39歳※1	42	21.8%	9.3%	65.2%	8.4%	12.9%	4.8%	40.1%	10.8%
	(再掲)20～49歳※1	77	16.4%	5.8%	71.4%	7.2%	12.2%	2.9%	36.2%	7.4%
	(再掲)20～69歳※1	181	14.7%	2.6%	71.0%	4.8%	14.3%	4.0%	33.8%	4.5%
	(再掲)40～69歳※1	139	11.6%	2.3%	73.5%	3.7%	14.9%	4.6%	31.1%	3.4%
	(再掲)65～74歳※1	95	6.3%	2.9%	66.9%	5.1%	26.8%	5.2%	20.8%	4.6%
(再掲)75歳以上※1	80	10.9%	4.2%	64.8%	4.9%	24.3%	4.7%	20.3%	3.1%	

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦2名を除外している。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) BMIの判定は次のとおり。 低体重(やせ):18.5未満、普通:18.5以上25.0未満、肥満:25.0以上

注4) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表47-2 BMIの状況－年齢階級別、肥満度別(BMI別)、割合、標準誤差－総数・男性・女性、65歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下		(再掲) 20以上25未満	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
65～69歳	69	4.0%	2.1%	69.8%	4.1%	26.3%	3.5%	15.0%	4.5%	58.7%	4.9%
70～74歳	95	5.9%	2.5%	60.2%	4.3%	33.9%	4.3%	16.3%	3.1%	49.8%	4.3%
75～79歳	70	9.5%	2.8%	65.2%	5.2%	25.3%	6.3%	15.1%	3.5%	59.6%	4.2%
80～84歳	55	7.5%	2.9%	69.3%	7.8%	23.3%	7.2%	19.6%	5.0%	57.1%	9.6%
80歳以上	85	9.2%	2.8%	65.1%	9.0%	25.7%	7.8%	16.6%	3.3%	57.7%	9.8%
85歳以上	30	11.9%	3.3%	58.6%	11.4%	29.5%	10.1%	11.9%	3.3%	58.6%	11.4%
(再掲)65歳以上	319	7.2%	2.0%	64.9%	2.7%	28.0%	2.6%	15.8%	1.5%	56.2%	2.7%
(再掲)65～69歳※1	69	3.8%	2.0%	69.6%	3.8%	26.6%	3.3%	14.4%	4.0%	59.0%	4.6%
(再掲)70～74歳※1	95	6.0%	2.6%	60.6%	4.0%	33.4%	4.1%	16.9%	3.2%	49.7%	4.0%
(再掲)75～79歳※1	70	9.3%	2.8%	64.8%	5.4%	25.9%	6.1%	15.2%	3.5%	59.0%	4.4%
(再掲)80～84歳※1	55	7.4%	2.8%	70.1%	7.1%	22.5%	6.9%	20.2%	5.0%	57.4%	9.1%
(再掲)80歳以上※1	85	9.6%	2.9%	65.4%	8.5%	24.9%	7.5%	17.4%	3.5%	57.7%	9.4%
(再掲)85歳以上※1	30	13.1%	3.7%	58.1%	11.7%	28.8%	10.0%	13.1%	3.7%	58.1%	11.7%
65～69歳	29	2.8%	2.6%	67.9%	6.5%	29.3%	8.0%	9.8%	4.3%	60.9%	8.6%
70～74歳	40	3.9%	2.6%	55.5%	9.8%	40.6%	9.1%	8.9%	3.3%	50.5%	10.0%
75～79歳	36	11.2%	6.3%	69.8%	7.4%	19.0%	9.4%	15.0%	6.0%	65.9%	7.6%
80～84歳	26	8.0%	6.7%	60.3%	19.1%	31.7%	13.8%	14.0%	6.4%	54.3%	17.5%
80歳以上	39	4.8%	3.5%	61.7%	14.8%	33.5%	11.9%	8.4%	3.3%	58.1%	13.7%
85歳以上	13	0.0%	0.0%	63.8%	11.7%	36.2%	11.7%	0.0%	0.0%	63.8%	11.7%
(再掲)65歳以上	144	5.7%	2.4%	63.5%	6.0%	30.8%	4.1%	10.5%	2.0%	58.7%	5.4%
(再掲)65～69歳※1	29	2.8%	2.6%	67.9%	6.5%	29.3%	8.0%	9.8%	4.3%	60.9%	8.6%
(再掲)70～74歳※1	40	3.9%	2.6%	55.5%	9.8%	40.6%	9.1%	8.9%	3.3%	50.5%	10.0%
(再掲)75～79歳※1	36	11.2%	6.3%	69.8%	7.4%	19.0%	9.4%	15.0%	6.0%	65.9%	7.6%
(再掲)80～84歳※1	26	8.0%	6.7%	60.3%	19.1%	31.7%	13.8%	14.0%	6.4%	54.3%	17.5%
(再掲)80歳以上※1	39	4.8%	3.5%	61.7%	14.8%	33.5%	11.9%	8.4%	3.3%	58.1%	13.7%
(再掲)85歳以上※1	13	0.0%	0.0%	63.8%	11.7%	36.2%	11.7%	0.0%	0.0%	63.8%	11.7%
65～69歳	40	4.9%	3.4%	71.3%	8.4%	23.8%	8.5%	19.2%	8.6%	57.0%	10.0%
70～74歳	55	7.4%	4.2%	63.7%	6.1%	28.9%	4.8%	21.9%	4.6%	49.2%	4.9%
75～79歳	34	7.8%	5.9%	60.5%	9.9%	31.7%	6.6%	15.3%	6.1%	53.1%	9.1%
80～84歳	29	7.0%	4.1%	77.4%	9.7%	15.7%	9.2%	24.7%	6.4%	59.6%	8.9%
80歳以上	46	13.3%	3.9%	68.3%	6.2%	18.4%	6.6%	24.3%	5.6%	57.3%	7.7%
85歳以上	17	23.7%	8.6%	53.5%	16.5%	22.8%	9.8%	23.7%	8.6%	53.5%	16.5%
(再掲)65歳以上	175	8.4%	3.0%	66.1%	3.8%	25.5%	3.7%	20.5%	2.9%	54.0%	3.3%
(再掲)65～69歳※1	40	4.9%	3.4%	71.3%	8.4%	23.8%	8.5%	19.2%	8.6%	57.0%	10.0%
(再掲)70～74歳※1	55	7.4%	4.2%	63.7%	6.1%	28.9%	4.8%	21.9%	4.6%	49.2%	4.9%
(再掲)75～79歳※1	34	7.8%	5.9%	60.5%	9.9%	31.7%	6.6%	15.3%	6.1%	53.1%	9.1%
(再掲)80～84歳※1	29	7.0%	4.1%	77.4%	9.7%	15.7%	9.2%	24.7%	6.4%	59.6%	8.9%
(再掲)80歳以上※1	46	13.3%	3.9%	68.3%	6.2%	18.4%	6.6%	24.3%	5.6%	57.3%	7.7%
(再掲)85歳以上※1	17	23.7%	8.6%	53.5%	16.5%	22.8%	9.8%	23.7%	8.6%	53.5%	16.5%

注1) 身長と体重の測定を行った65歳以上の者を集計対象とした。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ):18.5未満

普通:18.5以上25.0未満

肥満:25.0以上

注4) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表47-3 目標とするBMIの範囲の分布—年齢階級、目標とするBMIの範囲、割合、標準誤差—総数・男性・女性、18歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	範囲未満		範囲内		範囲以上	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	584	23.9%	1.9%	51.9%	2.1%	24.2%	1.7%
18～19歳	8	7.9%	8.8%	92.1%	8.8%	0.0%	0.0%
20～29歳	28	29.6%	13.7%	50.0%	14.6%	20.4%	13.9%
30～39歳	50	3.6%	2.7%	69.3%	6.5%	27.1%	6.7%
40～49歳	62	5.8%	3.0%	80.3%	5.4%	13.9%	4.4%
50～59歳	76	21.0%	4.6%	58.0%	4.0%	21.0%	3.3%
60～69歳	110	32.0%	4.6%	42.7%	3.8%	25.3%	2.8%
70～79歳	165	30.8%	3.4%	39.2%	1.7%	30.0%	3.4%
80歳以上	85	30.6%	4.1%	43.7%	9.7%	25.7%	7.8%
(再掲)18～49歳	148	9.8%	3.0%	71.5%	5.5%	18.7%	4.1%
(再掲)50～64歳	117	24.6%	4.6%	53.7%	3.4%	21.7%	2.6%
(再掲)65～74歳	164	30.0%	4.0%	39.5%	2.7%	30.5%	2.4%
(再掲)75歳以上	155	31.8%	3.4%	42.7%	4.4%	25.5%	4.5%
(再掲)20歳以上	576	24.1%	2.0%	51.4%	2.2%	24.5%	1.8%
(再掲)65歳以上	319	30.9%	3.1%	41.1%	2.6%	28.0%	2.6%
(再掲)50～69歳	186	27.2%	3.5%	49.5%	2.9%	23.4%	2.3%
(再掲)70歳以上	250	30.7%	2.9%	40.8%	3.4%	28.5%	3.7%
(再掲)20歳以上※1	576	22.1%	2.4%	53.9%	2.5%	23.9%	2.1%
(再掲)20～49歳※1	140	11.4%	4.1%	67.5%	6.6%	21.2%	5.3%
(再掲)65～74歳※1	164	29.6%	3.6%	40.2%	2.5%	30.2%	2.3%
(再掲)75歳以上※1	155	32.5%	3.4%	42.1%	4.1%	25.4%	4.3%
男性	266	17.0%	2.3%	53.6%	3.0%	29.3%	2.2%
18～19歳	6	10.7%	11.6%	89.3%	11.6%	0.0%	0.0%
20～29歳	11	16.2%	10.0%	45.5%	19.8%	38.4%	21.2%
30～39歳	25	2.8%	3.0%	61.0%	9.4%	36.2%	9.1%
40～49歳	27	2.7%	2.9%	80.0%	5.1%	17.3%	4.6%
50～59歳	37	8.1%	4.2%	61.7%	5.2%	30.3%	4.4%
60～69歳	45	21.0%	5.7%	49.7%	5.1%	29.4%	7.2%
70～79歳	76	30.2%	4.5%	39.9%	4.7%	30.0%	5.7%
80歳以上	39	20.2%	5.2%	46.3%	14.0%	33.5%	11.9%
(再掲)18～49歳	69	5.5%	2.8%	68.5%	6.8%	26.0%	6.4%
(再掲)50～64歳	53	9.9%	5.6%	60.1%	4.7%	30.1%	5.4%
(再掲)65～74歳	69	27.2%	5.8%	37.4%	5.6%	35.4%	5.9%
(再掲)75歳以上	75	24.8%	4.3%	48.5%	8.6%	26.7%	7.0%
(再掲)20歳以上	260	17.2%	2.4%	52.8%	3.2%	30.0%	2.4%
(再掲)65歳以上	144	26.0%	3.4%	43.2%	5.1%	30.8%	4.1%
(再掲)50～69歳	82	14.8%	4.7%	55.4%	2.7%	29.8%	4.3%
(再掲)70歳以上	115	26.6%	3.7%	42.2%	6.4%	31.2%	5.9%
(再掲)20歳以上※1	260	14.6%	2.4%	55.4%	3.1%	30.0%	2.9%
(再掲)20～49歳※1	63	6.8%	4.0%	63.9%	8.2%	29.2%	7.9%
(再掲)65～74歳※1	69	26.7%	5.6%	38.8%	5.8%	34.5%	5.8%
(再掲)75歳以上※1	75	24.8%	4.3%	48.5%	8.6%	26.7%	7.0%
女性	318	29.9%	2.1%	50.4%	2.5%	19.6%	3.2%
18～19歳	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20～29歳	17	38.0%	17.1%	52.8%	15.2%	9.2%	8.5%
30～39歳	25	4.4%	4.5%	78.6%	8.3%	17.0%	8.3%
40～49歳	35	8.3%	4.1%	80.6%	6.6%	11.2%	6.0%
50～59歳	39	33.7%	8.3%	54.5%	9.0%	11.8%	5.9%
60～69歳	65	40.4%	9.5%	37.4%	6.4%	22.2%	7.5%
70～79歳	89	31.4%	4.4%	38.6%	3.7%	30.0%	3.9%
80歳以上	46	40.3%	6.2%	41.3%	7.3%	18.4%	6.6%
(再掲)18～49歳	79	13.7%	4.2%	74.2%	5.8%	12.1%	2.9%
(再掲)50～64歳	64	37.6%	6.5%	48.1%	7.9%	14.3%	5.6%
(再掲)65～74歳	95	32.2%	7.3%	41.1%	3.6%	26.6%	5.3%
(再掲)75歳以上	80	38.6%	4.3%	37.1%	3.0%	24.3%	4.7%
(再掲)20歳以上	316	30.2%	2.1%	50.1%	2.7%	19.8%	3.3%
(再掲)65歳以上	175	35.2%	4.6%	39.2%	1.9%	25.5%	3.7%
(再掲)50～69歳	104	37.7%	5.8%	44.4%	5.1%	17.9%	5.9%
(再掲)70歳以上	135	34.5%	3.8%	39.5%	2.7%	26.1%	3.8%
(再掲)20歳以上※1	316	30.2%	2.1%	50.1%	2.7%	19.8%	3.3%
(再掲)20～49歳※1	77	16.4%	5.8%	71.4%	7.2%	12.2%	2.9%
(再掲)65～74歳※1	95	31.9%	7.0%	41.3%	3.3%	26.8%	5.2%
(再掲)75歳以上※1	80	38.6%	4.3%	37.1%	3.0%	24.3%	4.7%

注1) 身長と体重の測定を行った18歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦2名を除外している。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした。

<参考> 目標とするBMIの範囲(18歳以上)^{1,2}

年齢(歳)	目標とするBMI(kg/m ²)
18～49	18.5～24.9
50～64	20.0～24.9
65～74 ³	21.5～24.9
75以上 ³	21.5～24.9

¹ 男女共通。あくまでも参考として使用するべきである。

² 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かったBMIを基に、疾患別の発症率とBMIとの関連、死因とBMIとの関連、喫煙や疾患の合併によるBMIや死亡リスクへの影響、日本人のBMIの実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。

³ 高齢者では、フレイルの予防及び生活習慣病の発症予防の両方に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とするBMIの範囲を21.5～24.9kg/m²とした。

(厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」)

表48 腹囲の分布一年齢階級別、腹囲の区分、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

性年齢		人数	<85cm(男)/<90cm(女)		≥85cm(男)/≥90cm(女)	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	12	78.2%	13.1%	21.8%	13.1%
	30～39歳	28	74.9%	10.1%	25.1%	10.1%
	40～49歳	38	75.2%	7.4%	24.8%	7.4%
	50～59歳	49	75.6%	10.2%	24.4%	10.2%
	60～69歳	90	65.9%	5.8%	34.1%	5.8%
	70歳以上	197	58.2%	3.5%	41.8%	3.5%
	(再掲)20歳以上	414	65.6%	2.8%	34.4%	2.8%
	(再掲)65～74歳	138	59.3%	3.5%	40.7%	3.5%
	(再掲)75歳以上	120	59.6%	6.2%	40.4%	6.2%
	(再掲)20歳以上※1	414	66.8%	3.6%	33.2%	3.6%
	(再掲)20～49歳※1	78	72.4%	8.5%	27.6%	8.5%
	(再掲)65～74歳※1	138	59.0%	3.6%	41.0%	3.6%
	(再掲)75歳以上※1	120	61.7%	6.1%	38.3%	6.1%
男性	20～29歳	5	45.9%	24.0%	54.1%	24.0%
	30～39歳	14	58.0%	16.6%	42.0%	16.6%
	40～49歳	16	46.7%	16.2%	53.3%	16.2%
	50～59歳	19	52.4%	13.3%	47.6%	13.3%
	60～69歳	36	35.6%	8.3%	64.4%	8.3%
	70歳以上	86	35.4%	5.2%	64.6%	5.2%
	(再掲)20歳以上	176	40.8%	5.0%	59.2%	5.0%
	(再掲)65～74歳	57	34.8%	7.1%	65.2%	7.1%
	(再掲)75歳以上	56	37.4%	7.5%	62.6%	7.5%
	(再掲)20歳以上※1	176	42.8%	6.1%	57.2%	6.1%
	(再掲)20～49歳※1	35	50.1%	13.9%	49.9%	13.9%
	(再掲)65～74歳※1	57	35.3%	7.1%	64.7%	7.1%
	(再掲)75歳以上※1	56	37.4%	7.5%	62.6%	7.5%
女性	20～29歳	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	14	92.9%	5.7%	7.1%	5.7%
	40～49歳	22	97.2%	2.8%	2.8%	2.8%
	50～59歳	30	91.1%	6.2%	8.9%	6.2%
	60～69歳	54	87.9%	5.1%	12.1%	5.1%
	70歳以上	111	77.4%	3.7%	22.6%	3.7%
	(再掲)20歳以上	238	85.4%	1.7%	14.6%	1.7%
	(再掲)65～74歳	81	79.1%	4.9%	20.9%	4.9%
	(再掲)75歳以上	64	79.7%	5.6%	20.3%	5.6%
	(再掲)20歳以上※1	238	86.6%	1.7%	13.4%	1.7%
	(再掲)20～49歳※1	43	96.5%	2.2%	3.5%	2.2%
	(再掲)65～74歳※1	81	78.7%	4.9%	21.3%	4.9%
	(再掲)75歳以上※1	64	79.7%	5.6%	20.3%	5.6%

注1) 腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦2名を除外した。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表49-1 収縮期(最高)・拡張期(最低)平均値及び標準偏差、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用を含む〕

性年齢	人数	収縮期(最高)血圧				拡張期(最低)血圧			
		平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値
20~29歳	5	108.5	29.5	12.1	96.4	64.3	10.1	4.1	61.0
30~39歳	19	109.0	17.1	3.5	107.0	64.8	13.3	2.2	61.0
40~49歳	27	116.2	15.1	2.3	113.0	71.0	11.3	1.8	70.2
50~59歳	38	123.1	14.7	2.7	123.8	74.1	9.7	2.1	74.0
60~69歳	80	134.7	16.3	2.3	137.0	74.8	10.2	1.1	74.0
70歳以上	163	134.0	15.1	2.5	133.0	71.7	10.2	1.6	70.9
(再掲)20歳以上	332	129.3	17.8	1.3	131.0	72.1	10.7	1.0	71.7
(再掲)65~74歳	121	136.1	15.7	1.6	137.0	75.6	9.6	1.1	75.0
(再掲)75歳以上	97	133.9	14.1	3.1	132.0	69.3	10.1	2.2	69.0
(再掲)20歳以上※1	332	127.7	18.5	1.3	129.0	71.9	10.9	0.9	71.0
(再掲)20~49歳※1	51	113.7	18.9	3.2	109.2	68.5	12.2	1.8	67.0
(再掲)40~89歳※1	308	130.1	16.6	1.2	131.0	72.9	10.4	1.1	72.0
(再掲)65~74歳※1	121	136.4	15.6	1.5	137.0	75.7	9.5	1.0	75.0
(再掲)75歳以上※1	97	133.9	14.0	3.1	132.0	69.0	10.1	2.2	67.3
20~29歳	2	123.1	43.3	21.9	120.9	70.3	13.1	6.6	69.6
30~39歳	7	119.0	23.1	6.4	113.0	71.0	17.8	6.0	71.4
40~49歳	9	123.7	12.6	2.1	120.8	77.6	11.3	2.9	77.0
50~59歳	15	128.3	13.9	3.0	127.0	78.9	9.0	2.7	80.0
60~69歳	31	140.9	14.1	2.7	139.0	78.6	9.1	1.4	79.0
70歳以上	68	133.9	16.2	3.3	133.0	73.8	10.0	2.1	72.0
(再掲)20歳以上	132	133.2	17.0	2.1	133.0	75.5	10.4	1.4	75.0
(再掲)65~74歳	47	138.2	16.0	2.9	137.0	78.1	9.4	1.7	79.0
(再掲)75歳以上	45	133.8	15.4	3.6	133.0	71.7	9.2	2.3	70.5
(再掲)20歳以上※1	132	131.8	18.0	2.2	132.0	75.7	10.6	1.2	76.0
(再掲)20~49歳※1	18	122.3	21.3	5.4	119.8	74.0	13.1	2.6	72.4
(再掲)40~89歳※1	123	133.5	15.7	1.8	133.0	76.4	9.9	1.5	77.0
(再掲)65~74歳※1	47	138.8	15.7	2.8	137.7	78.1	9.3	1.6	79.0
(再掲)75歳以上※1	45	133.8	15.4	3.6	133.0	71.7	9.2	2.3	70.5
20~29歳	3	93.5	1.6	0.8	93.3	58.1	1.9	0.9	57.9
30~39歳	12	103.6	10.0	2.9	100.2	61.3	9.1	2.6	60.0
40~49歳	18	112.2	15.0	4.2	108.5	67.5	10.0	2.6	67.0
50~59歳	23	119.3	14.4	3.1	122.5	70.7	8.8	1.9	70.0
60~69歳	49	130.3	16.5	2.2	130.0	72.1	10.2	1.6	72.0
70歳以上	95	134.1	14.3	2.3	132.0	70.1	10.1	1.4	69.7
(再掲)20歳以上	200	126.5	17.8	1.1	127.3	69.6	10.2	0.8	69.0
(再掲)65~74歳	74	134.6	15.4	1.7	135.7	73.8	9.4	1.4	72.0
(再掲)75歳以上	52	134.0	13.0	3.1	132.0	67.0	10.4	2.3	66.1
(再掲)20歳以上※1	200	124.6	18.2	1.0	126.0	69.1	10.2	0.8	69.0
(再掲)20~49歳※1	33	106.9	13.8	2.6	104.8	64.2	9.7	1.6	61.0
(再掲)40~89歳※1	185	127.6	16.9	1.4	128.0	70.3	9.9	1.0	70.0
(再掲)65~74歳※1	74	134.6	15.5	1.7	135.6	73.8	9.3	1.4	72.0
(再掲)75歳以上※1	52	134.0	13.0	3.1	132.0	67.0	10.4	2.3	66.1

注1) 単位:mmHg

注2) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。

注4) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表49-2 収縮期(最高)・拡張期(最低)平均値及び標準偏差、標準誤差、標準誤差一総数・男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者を除外〕

性年齢	人数	収縮期(最高)血圧				拡張期(最低)血圧				
		平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	
20～29歳	5	108.5	29.5	12.1	96.4	64.3	10.1	4.1	61.0	
30～39歳	19	109.0	17.1	3.5	107.0	64.8	13.3	2.2	61.0	
40～49歳	24	116.4	14.6	2.4	112.5	71.3	11.1	1.8	69.7	
50～59歳	33	122.2	15.7	3.0	122.5	74.3	10.3	2.4	74.0	
60～69歳	58	132.8	17.4	3.3	134.0	73.4	10.9	1.2	72.0	
70歳以上	73	134.8	16.5	3.3	133.0	73.4	10.3	2.1	72.0	
総数	212	127.2	19.1	1.5	127.1	72.2	11.1	0.8	71.0	
(再掲)65～74歳	76	136.7	16.1	1.4	137.3	75.3	10.1	1.2	74.0	
(再掲)75歳以上	35	132.8	16.1	5.6	131.0	70.3	10.1	3.4	67.0	
(再掲)20歳以上※1	212	123.3	19.6	1.5	125.0	71.9	11.3	0.7	71.0	
(再掲)20～49歳※1	48	113.5	19.1	3.4	109.0	68.3	12.2	1.9	66.8	
(再掲)40～89歳※1	188	128.5	17.6	1.6	129.0	73.4	10.6	1.0	72.0	
(再掲)65～74歳※1	76	136.8	16.0	1.3	137.2	75.3	10.1	1.1	74.0	
(再掲)75歳以上※1	35	133.1	16.0	5.6	131.0	70.2	10.0	3.4	67.0	
男性	20～29歳	2	123.1	43.3	21.9	120.9	70.3	13.1	6.6	69.6
30～39歳	7	119.0	23.1	6.4	113.0	71.0	17.8	6.0	71.4	
40～49歳	8	124.2	14.0	2.4	121.6	78.6	12.3	3.2	77.0	
50～59歳	12	127.6	15.9	3.9	125.7	79.8	9.4	3.0	79.0	
60～69歳	20	140.2	15.7	4.2	137.9	78.6	10.7	2.4	77.0	
70歳以上	32	134.6	18.5	4.2	133.0	75.1	11.4	3.1	72.4	
(再掲)20歳以上	81	132.1	18.9	2.3	132.0	76.4	11.7	1.7	76.0	
(再掲)65～74歳	26	141.1	16.9	3.6	139.0	79.3	10.5	1.9	79.0	
(再掲)75歳以上	19	130.1	17.4	5.5	130.6	71.2	10.5	4.0	69.0	
(再掲)20歳以上※1	81	130.4	19.9	2.5	131.0	76.2	11.8	1.3	76.0	
(再掲)20～49歳※1	17	122.4	22.3	5.9	119.2	74.1	13.7	2.8	71.9	
(再掲)40～89歳※1	72	132.7	17.2	2.3	132.1	77.6	10.9	1.8	77.0	
(再掲)65～74歳※1	26	141.1	16.6	3.5	139.0	79.1	10.5	1.9	78.1	
(再掲)75歳以上※1	19	130.1	17.4	5.5	130.6	71.2	10.5	4.0	69.0	
女性	20～29歳	3	93.5	1.6	93.3	58.1	1.9	0.9	57.9	
30～39歳	12	103.6	10.0	2.9	100.2	61.3	9.1	2.6	60.0	
40～49歳	16	112.3	13.5	4.2	109.1	67.5	8.5	2.3	67.0	
50～59歳	21	118.9	15.1	3.0	122.1	70.9	9.5	2.3	70.0	
60～69歳	38	128.9	17.2	2.4	126.0	70.8	10.0	1.7	69.6	
70歳以上	41	135.0	14.9	3.0	132.1	72.0	9.3	1.5	71.1	
(再掲)20歳以上	131	124.0	18.6	1.7	124.7	69.5	9.9	0.5	68.3	
(再掲)65～74歳	50	134.1	15.2	1.6	135.6	72.8	9.2	1.7	72.0	
(再掲)75歳以上	16	135.4	14.9	5.1	131.3	69.4	9.8	3.2	67.0	
(再掲)20歳以上※1	131	121.7	18.7	1.6	123.0	69.0	9.9	0.5	67.5	
(再掲)20～49歳※1	31	106.6	12.8	2.4	105.6	63.9	8.9	1.6	61.0	
(再掲)40～89歳※1	116	125.7	17.4	1.8	126.0	70.6	9.4	0.6	70.0	
(再掲)65～74歳※1	50	134.1	15.2	1.5	135.5	72.9	9.1	1.7	72.0	
(再掲)75歳以上※1	16	135.4	14.9	5.1	131.3	69.4	9.8	3.2	67.0	

注1) 単位:mmHg
 注2) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。
 注3) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。
 注4) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表50-1 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差一年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20～29歳	4	5.2	0.2	0.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	30～39歳	16	5.3	0.4	0.1	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.4	5.9	6.8	6.8	6.8
	40～49歳	27	5.6	0.7	0.1	4.7	4.8	4.9	5.2	5.6	5.8	6.0	7.5	8.5	8.5
	50～59歳	37	5.5	0.3	0.1	4.9	4.9	5.0	5.3	5.4	5.6	5.9	6.2	6.3	6.3
	60～69歳	76	5.7	0.8	0.1	4.6	4.8	5.2	5.4	5.6	5.8	6.3	7.1	10.5	10.5
	70歳以上	160	5.7	0.5	0.0	5.0	5.0	5.3	5.4	5.6	5.9	6.5	6.7	8.2	8.5
	(再掲)20歳以上	320	5.7	0.6	0.0	4.6	4.9	5.0	5.3	5.6	5.8	6.7	6.7	8.5	10.5
	(再掲)65～74歳	116	5.8	0.7	0.1	5.0	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.4	6.7	10.1	10.5
	(再掲)75歳以上	96	5.7	0.5	0.0	5.0	5.0	5.1	5.3	5.5	5.9	6.4	6.7	8.5	8.5
	(再掲)20歳以上※1	320	5.6	0.6	0.0	4.6	4.9	5.0	5.3	5.5	5.8	6.2	6.6	8.5	10.5
	(再掲)20～49歳※1	47	5.5	0.6	0.1	4.7	4.7	4.9	5.1	5.4	5.7	5.9	6.5	8.5	8.5
	(再掲)65～74歳※1	116	5.8	0.7	0.1	5.0	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.4	6.8	10.1	10.5
(再掲)75歳以上※1	96	5.7	0.5	0.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.9	6.3	6.7	8.5	8.5
男性	20～29歳	2	5.3	0.2	0.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	30～39歳	5	5.6	0.7	0.3	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	6.1	6.8	6.8	6.8	6.8
	40～49歳	9	5.9	1.0	0.3	5.0	5.0	5.0	5.6	5.8	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5
	50～59歳	14	5.5	0.4	0.0	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	5.7	6.0	6.0	6.3	6.3
	60～69歳	28	6.1	1.2	0.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.7	6.3	7.9	9.7	10.5	10.5
	70歳以上	66	5.9	0.6	0.1	5.0	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0	6.7	6.9	8.5	8.5
	(再掲)20歳以上	124	5.9	0.8	0.1	4.9	4.9	5.0	5.4	5.6	6.0	6.7	7.2	10.0	10.5
	(再掲)65～74歳	44	6.0	0.9	0.1	5.0	5.0	5.3	5.4	5.8	6.3	6.7	7.6	10.5	10.5
	(再掲)75歳以上	44	5.8	0.6	0.1	5.0	5.0	5.3	5.4	5.5	5.9	6.7	6.9	8.5	8.5
	(再掲)20歳以上※1	124	5.8	0.8	0.1	4.9	4.9	5.0	5.4	5.6	5.9	6.6	7.5	10.0	10.5
	(再掲)20～49歳※1	16	5.7	0.8	0.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.5	5.9	7.2	8.5	8.5	8.5
	(再掲)65～74歳※1	44	6.0	0.9	0.1	5.0	5.0	5.3	5.5	5.8	6.3	6.7	7.7	10.5	10.5
(再掲)75歳以上※1	44	5.8	0.6	0.1	5.0	5.0	5.3	5.4	5.5	5.9	6.7	6.9	8.5	8.5	
女性	20～29歳	2	5.2	0.2	0.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	30～39歳	11	5.2	0.2	0.1	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7
	40～49歳	18	5.4	0.3	0.1	4.7	4.7	4.7	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.0	6.0
	50～59歳	23	5.5	0.3	0.1	4.9	4.9	5.0	5.3	5.4	5.6	5.9	6.1	6.2	6.2
	60～69歳	48	5.5	0.3	0.0	4.6	4.7	5.1	5.2	5.3	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1
	70歳以上	94	5.7	0.4	0.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4	8.0
	(再掲)20歳以上	196	5.5	0.4	0.0	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	6.0	6.1	7.1	8.0
	(再掲)65～74歳	72	5.6	0.3	0.0	5.0	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	7.0	7.0
	(再掲)75歳以上	52	5.6	0.4	0.1	5.0	5.0	5.1	5.4	5.5	5.8	6.0	6.3	8.0	8.0
	(再掲)20歳以上※1	196	5.5	0.4	0.0	4.6	4.7	5.0	5.3	5.5	5.7	6.0	6.1	7.1	8.0
	(再掲)20～49歳※1	31	5.3	0.3	0.0	4.7	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.6	5.7	5.8	6.0
	(再掲)65～74歳※1	72	5.6	0.3	0.0	5.0	5.0	5.2	5.4	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	7.0
(再掲)75歳以上※1	52	5.6	0.4	0.1	5.0	5.0	5.1	5.4	5.5	5.8	6.0	6.0	6.3	8.0	

注1) 単位: %

注2) ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表50-2 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差、平均値、標準偏差、標準誤差一総数・男性・女性、20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用除く〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20～29歳	4	5.2	0.2	0.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
30～39歳	16	5.3	0.4	0.1	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.4	5.9	6.8	6.8	6.8
40～49歳	27	5.6	0.7	0.1	4.7	4.7	4.8	4.9	5.2	5.6	5.8	6.0	7.5	8.5	8.5
50～59歳	37	5.5	0.3	0.1	4.9	4.9	4.9	5.0	5.3	5.4	5.6	5.9	6.2	6.3	6.3
60～69歳	68	5.6	0.4	0.1	4.6	4.7	5.2	5.2	5.3	5.6	5.7	5.8	5.9	10.5	10.5
70歳以上	147	5.7	0.4	0.0	5.0	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.9	6.3	6.6	7.2	7.5
(再掲)20歳以上	299	5.6	0.5	0.0	4.6	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.4	7.7	10.5
(再掲)65～74歳	105	5.7	0.6	0.1	5.0	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8	6.2	6.6	10.3	10.5
(再掲)75歳以上	90	5.6	0.4	0.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.8	6.1	6.6	7.5	7.5
(再掲)20歳以上※1	299	5.6	0.5	0.0	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7	6.0	6.3	8.0	10.5
(再掲)20～49歳※1	47	5.5	0.6	0.1	4.7	4.7	4.9	5.0	5.1	5.4	5.7	5.9	6.3	8.5	8.5
(再掲)65～74歳※1	105	5.7	0.6	0.1	5.0	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8	6.2	6.5	10.3	10.5
(再掲)75歳以上※1	90	5.6	0.4	0.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.8	6.0	6.6	7.5	7.5
20～29歳	2	5.3	0.2	0.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
30～39歳	5	5.6	0.7	0.3	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	6.1	6.8	6.8	6.8	6.8
40～49歳	9	5.9	1.0	0.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.6	5.8	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5
50～59歳	14	5.5	0.4	0.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3
60～69歳	21	5.8	1.1	0.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.6	5.8	5.9	10.1	10.5	10.5
70歳以上	58	5.7	0.5	0.1	5.0	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.9	6.6	6.8	7.0	7.0
(再掲)20歳以上	109	5.7	0.7	0.1	4.9	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.5	6.8	10.3	10.5
(再掲)20～49歳	36	5.9	0.9	0.2	5.0	5.0	5.2	5.3	5.4	5.7	5.9	6.6	7.5	10.5	10.5
(再掲)65～74歳	40	5.7	0.5	0.1	5.0	5.0	5.3	5.3	5.4	5.5	5.9	6.5	6.8	7.0	7.0
(再掲)75歳以上	109	5.7	0.7	0.1	4.9	4.9	5.0	5.1	5.4	5.6	5.8	6.4	6.8	10.3	10.5
(再掲)20歳以上※1	16	5.7	0.8	0.1	5.0	5.0	5.2	5.4	5.4	5.7	5.9	7.2	8.5	8.5	8.5
(再掲)65～74歳※1	36	5.9	1.0	0.2	5.0	5.0	5.2	5.4	5.4	5.7	5.9	6.6	7.9	10.5	10.5
(再掲)75歳以上※1	40	5.7	0.5	0.1	5.0	5.0	5.3	5.3	5.4	5.5	5.9	6.5	6.8	7.0	7.0
20～29歳	2	5.2	0.2	0.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
30～39歳	11	5.2	0.2	0.1	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7
40～49歳	18	5.4	0.3	0.1	4.7	4.7	4.7	4.8	5.1	5.4	5.7	5.7	6.0	6.0	6.0
50～59歳	23	5.5	0.3	0.1	4.9	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.9	6.1	6.2	6.2
60～69歳	47	5.5	0.2	0.0	4.6	4.7	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	5.8	5.8	6.0	6.0
70歳以上	89	5.6	0.4	0.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	7.5	7.5
(再掲)20歳以上	190	5.5	0.4	0.0	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.9	6.1	6.9	7.5
(再掲)65～74歳	69	5.6	0.3	0.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.9	6.9
(再掲)75歳以上	50	5.6	0.4	0.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.4	5.5	5.8	6.0	6.1	7.5	7.5
(再掲)20歳以上※1	190	5.5	0.4	0.0	4.6	4.7	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.9	7.5
(再掲)20～49歳※1	31	5.3	0.3	0.0	4.7	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.6	5.7	5.8	6.0	6.0
(再掲)65～74歳※1	69	5.6	0.3	0.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.9	6.9
(再掲)75歳以上※1	50	5.6	0.4	0.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.4	5.5	5.8	6.0	6.1	7.5	7.5

注1) 単位: %

注2) ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射または血糖を下げる薬を使用していない20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」は、身体状況調査の問診「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「無」と回答した者、(7)に「有」かつ「(7-1) 現在、糖尿病の治療の有無」に「無」と回答した者、及び(7-1)に「有」かつ「(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」に「無」と回答した者を、「インスリン注射または血糖を下げる薬を使用していない者」とした。

注4) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表51-1 血清総コレステロール値の平均及び標準偏差、年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用を含む〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	4	195.4	13.3	5.5	179.0	179.0	179.0	179.0	183.2	194.7	208.6	213.0	213.0	213.0	213.0
	16	191.4	39.8	11.5	147.0	147.0	147.0	147.0	153.6	184.5	236.4	244.0	275.0	275.0	275.0
	27	215.2	36.5	11.0	152.0	152.0	154.0	167.9	191.9	211.1	241.0	273.7	292.6	297.0	297.0
	37	211.8	35.4	6.9	128.0	128.0	130.8	166.5	190.3	212.5	243.1	255.4	265.2	266.0	266.0
	76	218.7	30.2	2.5	161.0	161.0	165.1	180.2	203.0	215.3	238.8	261.5	274.8	286.0	286.0
	160	203.5	37.2	4.3	120.0	120.0	145.6	156.9	177.0	202.1	223.9	250.4	270.4	316.5	323.0
	320	208.4	35.9	2.1	120.0	127.1	148.0	163.7	183.9	208.0	232.0	254.7	270.7	303.1	323.0
	116	214.8	34.5	3.5	121.0	121.6	160.8	172.7	188.0	214.0	236.6	260.3	270.9	317.4	323.0
	96	199.3	36.6	5.6	120.0	125.0	142.0	148.1	172.0	200.8	220.0	242.2	273.3	311.0	311.0
	320	208.8	35.8	1.9	120.0	127.4	149.8	165.0	184.0	208.0	232.5	255.0	271.1	301.4	323.0
	47	206.0	36.9	7.2	147.0	147.0	151.1	155.0	179.0	198.6	236.0	254.5	283.6	297.0	297.0
	116	215.1	34.4	3.5	121.0	125.0	162.0	173.0	188.1	214.0	237.5	260.5	270.9	317.7	323.0
	96	200.3	36.9	5.8	120.0	129.4	142.3	148.7	172.3	201.5	227.0	245.3	274.1	311.0	311.0
	2	192.0	14.4	7.3	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	191.5	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
	5	209.2	49.2	19.9	153.0	153.0	153.0	153.0	169.7	204.4	253.9	275.0	275.0	275.0	275.0
	9	232.0	43.1	14.9	175.0	175.0	175.0	175.0	205.8	226.7	278.9	297.0	297.0	297.0	297.0
	14	199.8	41.5	13.0	128.0	128.0	128.0	128.0	171.5	196.7	235.0	257.2	266.0	266.0	266.0
	28	213.7	31.2	7.2	162.0	162.0	162.7	170.9	187.5	210.8	238.1	259.0	275.0	286.0	286.0
	66	192.5	33.9	4.2	120.0	120.0	136.5	147.2	167.0	199.3	220.0	232.9	245.3	257.0	257.0
	124	201.8	36.8	3.0	120.0	120.4	140.4	152.4	175.0	204.0	225.4	251.8	259.9	295.3	297.0
	44	209.2	35.7	5.8	121.0	121.0	153.6	162.0	184.0	210.4	238.4	256.0	259.7	286.0	286.0
	44	187.9	31.1	4.1	120.0	120.0	138.2	143.0	167.0	186.4	217.6	227.2	232.0	237.0	237.0
	124	204.1	37.3	2.9	120.0	120.9	142.0	154.0	179.0	204.0	226.4	254.3	275.3	296.0	297.0
	16	216.7	41.0	7.1	153.0	153.0	154.6	166.5	183.7	206.3	237.8	288.7	297.0	297.0	297.0
	44	210.4	35.3	5.9	121.0	121.0	155.2	162.3	184.0	210.9	238.6	256.4	259.9	286.0	286.0
	44	187.9	31.1	4.1	120.0	120.0	138.2	143.0	167.0	186.4	217.6	227.2	232.0	237.0	237.0
	2	200.3	16.2	8.3	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	200.2	213.0	213.0	213.0	213.0	213.0
	11	185.2	36.1	12.2	147.0	147.0	147.0	147.0	152.5	177.2	236.7	238.0	238.0	238.0	238.0
	18	206.1	30.0	10.0	152.0	152.0	152.5	157.2	191.2	198.0	237.3	250.5	256.0	256.0	256.0
	23	219.9	28.9	5.6	169.0	169.0	169.6	179.5	194.9	218.6	249.0	258.9	265.3	266.0	266.0
	48	221.9	29.4	3.8	161.0	161.0	178.8	180.9	205.0	217.9	239.8	270.1	276.0	281.0	281.0
	94	212.3	37.5	5.8	142.0	142.8	157.5	171.0	187.8	207.8	233.5	270.0	277.1	323.0	323.0
	196	213.0	34.5	2.6	142.0	145.6	155.6	170.9	190.0	211.0	236.0	260.9	272.3	312.8	323.0
	72	218.8	33.3	3.8	157.0	157.0	170.5	181.0	194.9	216.0	236.3	269.4	272.8	323.0	323.0
	52	209.7	38.4	7.2	142.0	142.0	147.2	166.3	187.0	206.6	232.1	269.9	283.8	311.0	311.0
	196	212.1	34.4	2.6	142.0	145.8	155.0	169.4	190.0	210.0	236.0	256.0	270.9	311.8	323.0
	31	198.0	32.3	7.6	147.0	147.0	147.0	151.7	175.1	195.4	236.0	242.5	252.2	256.0	256.0
	72	218.6	33.5	3.9	157.0	157.0	170.8	181.0	194.1	215.6	236.2	269.5	272.7	323.0	323.0
	52	209.7	38.4	7.2	142.0	142.0	147.2	166.3	187.0	206.6	232.1	269.9	283.8	311.0	311.0

注1) 単位:mg/dL

注2) 血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表51-2 血清総コレステロール値の平均及び標準偏差、標準誤差、標準偏差、標準誤差一総数・男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用除外〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20～29歳	4	195.4	13.3	5.5	179.0	179.0	179.0	179.0	183.2	194.7	208.6	213.0	213.0	213.0	213.0
30～39歳	15	188.4	39.7	12.1	147.0	147.0	147.0	147.0	153.1	179.0	236.7	248.5	275.0	275.0	275.0
40～49歳	24	219.8	38.3	11.7	152.0	152.0	153.2	164.7	193.5	211.7	243.1	281.9	294.5	297.0	297.0
50～59歳	34	213.8	37.0	7.2	128.0	128.0	128.0	158.5	189.6	218.8	249.0	259.9	265.8	266.0	266.0
60～69歳	56	220.7	30.9	3.5	161.0	161.0	163.0	180.1	205.0	217.0	248.1	265.2	276.5	286.0	286.0
70歳以上	107	209.2	34.6	5.1	131.0	134.6	152.7	166.6	185.9	211.2	227.4	255.8	270.8	319.9	323.0
(再掲)20歳以上	240	211.9	35.3	1.9	128.0	132.3	152.5	165.0	187.0	212.0	235.0	257.0	272.0	295.3	323.0
(再掲)65～74歳	83	219.4	34.3	4.5	155.0	155.0	163.3	175.7	196.0	216.7	244.4	268.8	274.5	323.0	323.0
(再掲)75歳以上	64	203.2	32.5	5.8	131.0	132.5	146.7	158.2	175.0	210.0	220.2	236.6	271.4	278.0	278.0
(再掲)20歳以上※1	240	211.9	35.7	1.6	128.0	129.9	152.0	165.0	187.4	211.3	236.0	258.0	273.0	295.4	323.0
(再掲)20～49歳※1	43	206.8	38.8	7.7	147.0	147.0	149.4	153.6	179.0	198.8	237.2	265.5	286.1	297.0	297.0
(再掲)65～74歳※1	83	219.7	34.7	4.6	155.0	155.3	163.0	175.7	196.0	216.6	245.7	269.3	276.0	323.0	323.0
(再掲)75歳以上※1	64	204.3	32.8	5.8	131.0	132.8	146.8	158.8	178.4	210.8	220.7	243.3	273.3	278.0	278.0
20～29歳	2	192.0	14.4	7.3	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0	191.5	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
30～39歳	4	201.1	56.3	26.4	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	190.7	256.9	275.0	275.0	275.0	275.0
40～49歳	7	252.2	36.5	14.3	205.0	205.0	205.0	205.0	225.1	240.5	287.3	297.0	297.0	297.0	297.0
50～59歳	13	199.6	44.3	14.9	128.0	128.0	128.0	128.0	162.4	192.9	235.0	259.3	266.0	266.0	266.0
60～69歳	22	218.7	34.6	8.5	162.0	162.0	162.2	163.4	201.0	209.8	251.8	259.9	282.8	286.0	286.0
70歳以上	51	200.4	30.9	5.3	131.0	132.2	147.2	156.4	173.0	204.1	222.4	238.8	249.3	257.0	257.0
(再掲)20歳以上	99	207.4	36.7	2.2	128.0	128.0	147.7	162.0	179.0	208.0	232.1	255.0	274.0	297.0	297.0
(再掲)65～74歳	33	216.6	34.7	5.5	155.0	155.0	162.0	165.5	183.0	217.7	247.6	257.9	268.9	286.0	286.0
(再掲)75歳以上	35	194.3	29.0	5.3	131.0	131.4	141.0	148.6	172.0	202.3	220.0	227.6	233.3	237.0	237.0
(再掲)20歳以上※1	99	209.0	38.0	1.9	128.0	128.0	147.7	162.0	180.0	206.0	233.4	257.6	279.5	297.0	297.0
(再掲)20～49歳※1	13	221.5	44.1	6.2	153.0	153.0	153.0	161.8	195.2	204.6	272.3	292.5	297.0	297.0	297.0
(再掲)65～74歳※1	33	217.3	35.2	5.8	155.0	155.0	162.0	164.0	183.6	217.9	249.7	258.7	271.3	286.0	286.0
(再掲)75歳以上※1	35	194.3	29.0	5.3	131.0	131.0	141.0	148.6	172.0	202.3	220.0	227.6	233.3	237.0	237.0
20～29歳	2	200.3	16.2	8.3	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	200.2	213.0	213.0	213.0	213.0	213.0
30～39歳	11	185.2	36.1	12.2	147.0	147.0	147.0	147.0	152.5	177.2	236.7	238.0	238.0	238.0	238.0
40～49歳	17	207.1	31.5	10.9	152.0	152.0	152.3	154.9	190.7	199.2	238.6	251.4	256.0	256.0	256.0
50～59歳	21	223.4	28.5	6.8	169.0	169.0	169.0	181.4	195.2	228.3	249.5	260.7	265.7	266.0	266.0
60～69歳	34	222.0	28.8	5.1	161.0	161.0	179.3	180.7	207.9	217.8	241.5	272.0	275.9	281.0	281.0
70歳以上	56	219.0	36.2	6.1	146.0	146.0	165.4	180.5	189.9	215.7	236.0	270.8	276.8	323.0	323.0
(再掲)20歳以上	141	215.3	33.9	2.4	146.0	146.2	155.0	172.7	191.0	213.0	237.9	264.2	272.0	307.9	323.0
(再掲)65～74歳	50	221.4	34.2	5.6	161.0	161.0	180.0	180.8	197.8	216.1	236.7	270.8	278.6	323.0	323.0
(再掲)75歳以上	29	215.9	33.6	5.3	146.0	146.0	158.3	168.0	189.7	216.0	232.7	273.8	276.9	278.0	278.0
(再掲)20歳以上※1	141	214.2	33.9	2.6	146.0	146.2	154.7	169.0	190.7	212.9	237.9	262.2	270.8	305.8	323.0
(再掲)20～49歳※1	30	198.1	33.2	8.0	147.0	147.0	147.0	151.4	172.3	192.8	236.1	243.4	252.6	256.0	256.0
(再掲)65～74歳※1	50	221.5	34.5	5.8	161.0	161.0	180.0	180.9	196.5	216.0	237.5	270.8	279.0	323.0	323.0
(再掲)75歳以上※1	29	215.9	33.6	5.3	146.0	146.0	158.3	168.0	189.7	216.0	232.7	273.8	276.9	278.0	278.0

注1) 単位:mg/dL

注2) 血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表52-1 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差、平均値、標準偏差、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用を含む〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20～29歳	4	57.5	24.6	10.5	28.0	28.0	28.0	28.0	33.0	54.9	81.9	83.0	83.0	83.0	83.0
30～39歳	16	67.7	15.8	3.3	35.0	35.0	35.1	42.7	55.0	66.0	81.4	89.4	106.0	106.0	106.0
40～49歳	27	66.2	17.1	4.1	39.0	39.0	39.0	50.1	52.0	64.2	77.8	95.5	98.2	99.0	99.0
50～59歳	37	60.8	15.8	3.2	34.0	34.0	34.9	41.0	48.0	61.5	72.8	82.4	94.1	99.0	99.0
60～69歳	76	65.3	17.2	2.2	36.0	36.0	39.4	43.0	52.0	63.0	77.6	87.0	96.6	112.0	112.0
70歳以上	160	60.6	17.2	2.2	31.0	31.0	36.0	40.0	49.0	57.7	70.7	81.8	92.6	120.7	125.0
(再掲)20歳以上	320	62.6	17.2	1.3	28.0	31.0	38.0	42.0	50.0	61.0	74.0	84.0	93.8	113.0	125.0
(再掲)65～74歳	116	63.5	18.7	2.1	31.0	34.8	38.0	42.0	50.0	59.1	74.2	87.0	101.3	123.2	125.0
(再掲)75歳以上	96	59.9	15.7	2.7	31.0	31.0	35.9	40.0	48.6	58.6	71.2	78.6	83.6	117.0	117.0
(再掲)20歳以上※1	320	62.3	17.2	1.2	28.0	28.0	37.5	42.0	50.0	60.0	74.0	84.0	93.6	112.9	125.0
(再掲)20～49歳※1	47	63.5	17.9	2.4	28.0	28.0	30.5	39.0	51.3	61.0	78.5	91.2	96.3	106.0	106.0
(再掲)65～74歳※1	116	63.2	18.7	2.1	31.0	35.1	38.0	42.0	50.0	58.3	74.0	87.0	101.9	123.3	125.0
(再掲)75歳以上※1	96	60.4	15.7	2.7	31.0	31.0	37.0	40.3	49.0	60.0	71.5	79.4	83.7	117.0	117.0
20～29歳	2	41.0	14.4	7.3	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	40.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
30～39歳	5	57.0	15.0	3.5	35.0	35.0	35.0	35.0	42.3	58.0	66.0	86.0	86.0	86.0	86.0
40～49歳	9	53.2	9.6	3.2	39.0	39.0	39.0	39.0	49.5	52.3	61.6	77.0	77.0	77.0	77.0
50～59歳	14	53.8	16.5	3.6	34.0	34.0	34.0	34.6	41.3	48.8	62.3	85.8	99.0	99.0	99.0
60～69歳	28	54.9	14.3	2.1	36.0	36.0	37.5	39.4	44.4	53.4	60.8	76.0	92.8	104.0	104.0
70歳以上	66	54.4	15.2	2.3	31.0	31.0	35.0	36.2	42.6	53.0	62.5	75.6	82.3	99.0	99.0
(再掲)20歳以上	124	54.1	14.6	1.5	28.0	28.8	35.0	37.3	43.2	50.9	62.0	74.9	82.0	102.4	104.0
(再掲)65～74歳	44	54.6	16.0	2.2	31.0	31.9	36.0	38.1	43.7	50.0	61.0	81.0	94.7	104.0	104.0
(再掲)75歳以上	44	54.4	14.5	2.9	31.0	31.0	34.1	37.0	42.4	53.2	67.0	75.8	79.2	83.0	83.0
(再掲)20歳以上※1	124	53.5	14.4	1.6	28.0	28.0	34.0	36.6	43.8	50.0	61.0	72.5	81.5	102.4	104.0
(再掲)20～49歳※1	16	50.4	12.3	2.7	28.0	28.0	28.0	28.0	40.4	50.7	60.3	66.0	86.0	86.0	86.0
(再掲)65～74歳※1	44	54.6	15.8	2.1	31.0	32.3	36.0	38.3	43.6	50.0	61.0	81.0	95.2	104.0	104.0
(再掲)75歳以上※1	44	54.4	14.5	2.9	31.0	31.0	34.1	37.0	42.4	53.2	67.0	75.8	79.2	83.0	83.0
20～29歳	2	81.2	2.8	1.5	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	81.2	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
30～39歳	11	71.4	14.9	4.6	53.0	53.0	53.0	53.0	56.5	70.2	83.4	94.8	106.0	106.0	106.0
40～49歳	18	73.1	16.3	6.1	51.0	51.0	51.1	51.6	56.5	73.1	85.5	97.3	99.0	99.0	99.0
50～59歳	23	65.6	13.8	2.5	43.0	43.0	43.2	47.3	51.0	63.9	76.0	85.2	92.8	97.0	97.0
60～69歳	48	71.9	15.8	2.8	38.0	38.0	46.0	52.9	59.9	72.7	84.0	92.7	99.7	112.0	112.0
70歳以上	94	65.7	17.2	3.0	36.0	36.0	43.6	47.7	55.0	62.4	74.0	84.8	105.9	125.0	125.0
(再掲)20歳以上	196	68.5	16.4	1.4	36.0	37.3	46.0	50.0	56.0	67.0	78.1	91.0	97.5	118.2	125.0
(再掲)65～74歳	72	69.8	18.1	3.1	38.0	38.0	41.9	49.7	56.6	68.0	80.0	92.5	110.5	125.0	125.0
(再掲)75歳以上	52	64.9	15.2	3.0	36.0	36.0	43.3	47.6	55.0	63.3	74.0	82.9	92.6	117.0	117.0
(再掲)20歳以上※1	196	68.6	16.2	1.2	36.0	37.6	46.0	50.5	56.0	67.0	79.0	91.0	97.0	117.5	125.0
(再掲)20～49歳※1	31	73.2	15.0	4.0	51.0	51.0	51.5	52.4	58.6	75.5	83.4	95.1	98.3	106.0	106.0
(再掲)65～74歳※1	72	69.6	18.2	3.2	38.0	38.0	42.0	49.5	56.1	68.0	79.6	92.6	110.7	125.0	125.0
(再掲)75歳以上※1	52	64.9	15.2	3.0	36.0	36.0	43.3	47.6	55.0	63.3	74.0	82.9	92.6	117.0	117.0

注1) 単位mg/dL

注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表52-2 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差—総数・男性・女性・20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用除外〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20～29歳	4	57.5	24.6	10.5	28.0	28.0	28.0	28.0	33.0	54.9	81.9	83.0	83.0	83.0	83.0
30～39歳	15	68.6	16.0	3.7	35.0	35.0	35.0	41.7	56.2	66.0	82.0	90.0	106.0	106.0	106.0
40～49歳	24	68.7	16.5	5.3	50.0	50.0	51.8	53.6	64.6	79.0	96.3	96.3	98.6	99.0	99.0
50～59歳	34	60.8	16.2	3.2	34.0	34.0	41.0	47.7	61.3	73.7	81.9	81.9	97.1	99.0	99.0
60～69歳	56	65.0	17.0	2.2	36.0	36.0	44.0	51.8	61.2	77.6	85.8	93.8	93.8	112.0	112.0
70歳以上	107	60.0	18.2	2.9	31.0	31.0	38.9	47.1	57.0	71.5	82.6	82.6	96.9	124.2	125.0
(再掲)20歳以上	240	62.7	17.6	1.7	28.0	31.0	36.1	41.0	50.0	60.0	75.4	84.0	95.5	112.9	125.0
(再掲)65～74歳	83	63.7	19.3	2.3	35.0	35.0	39.0	39.0	50.0	58.0	75.0	89.2	104.3	125.0	125.0
(再掲)75歳以上	64	58.3	15.5	3.6	31.0	31.0	38.6	44.0	44.0	58.6	72.0	77.4	83.3	99.0	99.0
(再掲)20歳以上※1	240	62.5	17.6	1.6	28.0	28.0	36.0	41.2	50.0	60.0	75.7	84.0	95.1	112.8	125.0
(再掲)20～49歳※1	43	65.1	18.0	2.9	28.0	28.0	40.4	52.0	64.1	79.0	92.6	92.6	96.9	106.0	106.0
(再掲)65～74歳※1	83	63.4	19.4	2.4	35.0	35.0	39.0	37.4	50.0	58.0	75.0	89.3	105.0	125.0	125.0
(再掲)75歳以上※1	64	58.8	15.5	3.6	31.0	31.0	39.1	44.7	59.9	72.3	77.7	83.5	99.0	99.0	99.0
20～29歳	2	41.0	14.4	7.3	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	40.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
30～39歳	4	57.7	18.0	4.8	35.0	35.0	35.0	35.0	37.6	60.4	72.8	86.0	86.0	86.0	86.0
40～49歳	7	57.7	7.5	2.4	50.0	50.0	50.0	52.1	54.7	63.3	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
50～59歳	13	54.3	17.6	4.0	34.0	34.0	34.0	41.0	48.0	63.4	88.9	99.0	99.0	99.0	99.0
60～69歳	22	53.6	14.4	2.1	36.0	36.0	38.3	44.1	51.5	59.4	70.0	100.2	104.0	104.0	104.0
70歳以上	51	55.1	16.3	2.8	31.0	31.0	36.0	42.0	53.0	62.9	76.7	83.6	99.0	99.0	99.0
(再掲)20歳以上	99	54.5	15.5	2.0	28.0	28.0	34.7	36.0	43.0	53.0	62.0	76.0	82.6	104.0	104.0
(再掲)65～74歳	33	55.0	17.0	3.4	35.0	35.0	36.0	36.0	43.1	50.5	61.0	82.2	99.6	104.0	104.0
(再掲)75歳以上	35	54.5	15.4	3.3	31.0	31.0	36.3	42.0	53.0	66.4	76.5	80.6	83.0	83.0	83.0
(再掲)20歳以上※1	99	53.8	15.3	2.1	28.0	28.0	35.2	43.0	43.0	50.9	62.0	75.6	82.2	104.0	104.0
(再掲)20～49歳※1	13	51.6	13.4	3.3	28.0	28.0	28.0	40.1	51.9	61.0	61.1	68.4	86.0	86.0	86.0
(再掲)65～74歳※1	33	54.8	16.8	3.1	35.0	35.0	36.4	43.2	43.2	50.0	61.0	81.0	100.3	104.0	104.0
(再掲)75歳以上※1	35	54.5	15.4	3.3	31.0	31.0	36.3	42.0	53.0	66.4	76.5	80.6	83.0	83.0	83.0
20～29歳	2	81.2	2.8	1.5	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	81.2	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
30～39歳	11	71.4	14.9	4.6	53.0	53.0	53.0	56.5	70.2	83.4	94.8	106.0	106.0	106.0	106.0
40～49歳	17	73.0	17.1	6.8	51.0	51.0	51.5	56.0	76.0	90.8	97.6	97.6	99.0	99.0	99.0
50～59歳	21	65.2	14.0	2.5	43.0	43.0	46.5	51.0	64.5	76.0	82.9	95.0	95.0	97.0	97.0
60～69歳	34	72.1	14.6	2.6	38.0	38.0	47.1	51.6	60.4	74.5	84.0	88.8	94.8	112.0	112.0
70歳以上	56	65.5	18.8	4.4	36.0	36.0	42.8	46.0	53.7	60.0	73.8	87.7	110.2	125.0	125.0
(再掲)20歳以上	141	68.9	16.6	1.6	36.0	36.6	46.0	50.2	55.9	67.0	79.0	91.3	97.7	120.7	125.0
(再掲)65～74歳	50	70.1	18.5	3.3	38.0	38.0	50.6	56.5	66.8	79.8	92.6	111.1	125.0	125.0	125.0
(再掲)75歳以上	29	63.7	14.3	3.7	36.0	36.0	43.4	55.0	63.2	73.8	81.3	88.9	99.0	99.0	99.0
(再掲)20歳以上※1	141	68.9	16.4	1.4	36.0	36.8	46.2	50.6	55.6	67.0	79.0	91.2	97.3	120.1	125.0
(再掲)20～49歳※1	30	73.1	15.4	4.2	51.0	51.0	52.3	57.4	76.4	83.6	95.4	98.4	106.0	106.0	106.0
(再掲)65～74歳※1	50	69.9	18.8	3.5	38.0	38.0	50.3	56.0	66.5	79.6	93.6	111.6	125.0	125.0	125.0
(再掲)75歳以上※1	29	63.7	14.3	3.7	36.0	36.0	43.4	55.0	63.2	73.8	81.3	88.9	99.0	99.0	99.0

注1) 単位:mg/dl

注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと果の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表53-1 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用を含む〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20~29歳	4	108.2	16.3	8.0	91.0	91.0	91.0	93.3	109.2	122.4	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
30~39歳	16	101.9	29.8	6.8	60.0	60.0	66.6	80.5	91.0	120.3	156.2	173.0	173.0	173.0	173.0
40~49歳	27	123.2	33.2	5.9	67.0	67.0	75.7	98.0	120.5	137.2	187.1	196.7	196.7	197.0	197.0
50~59歳	37	123.6	31.0	4.3	68.0	68.0	68.6	70.1	101.0	125.4	149.0	168.0	171.9	176.0	176.0
60~69歳	76	123.3	26.4	3.3	50.0	58.0	85.5	94.0	102.8	121.4	141.9	160.4	175.4	181.0	181.0
70歳以上	160	111.6	28.3	2.7	48.0	51.3	67.3	78.0	92.9	109.0	128.0	150.0	160.1	202.0	216.0
(再掲)20歳以上	320	116.3	29.2	2.1	48.0	58.0	69.0	81.0	95.0	112.7	135.0	155.0	170.0	196.4	216.0
(再掲)65~74歳	116	120.1	28.0	3.5	50.0	50.4	65.0	81.0	100.3	115.0	140.2	155.2	171.2	210.7	216.0
(再掲)75歳以上	96	108.7	27.7	3.8	48.0	54.6	66.0	76.0	87.9	107.0	127.4	148.7	155.3	190.0	190.0
(再掲)20歳以上※1	320	117.1	29.6	2.1	48.0	59.3	69.0	81.0	95.0	114.0	137.0	155.0	172.3	196.6	216.0
(再掲)20~49歳※1	47	116.1	32.2	4.8	60.0	60.0	68.8	80.7	91.0	114.4	142.0	161.7	196.2	197.0	197.0
(再掲)65~74歳※1	116	120.5	27.9	3.6	50.0	52.9	65.0	85.0	100.9	115.1	140.4	156.3	173.0	211.0	216.0
(再掲)75歳以上※1	96	109.0	27.9	4.0	48.0	55.6	66.0	76.0	88.8	107.3	127.4	149.3	155.6	190.0	190.0
20~29歳	2	112.0	23.4	11.8	91.0	91.0	91.0	91.0	111.2	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
30~39歳	5	123.8	43.1	17.4	69.0	69.0	69.0	70.8	77.0	123.9	163.2	173.0	173.0	173.0	173.0
40~49歳	9	143.9	40.5	12.6	94.0	94.0	94.0	94.0	112.0	148.0	195.0	197.0	197.0	197.0	197.0
50~59歳	14	115.7	32.8	9.0	68.0	68.0	68.0	68.5	91.9	110.1	140.0	171.0	176.0	176.0	176.0
60~69歳	28	125.6	26.3	6.2	75.0	75.1	80.5	87.0	104.4	128.2	142.0	161.5	180.6	181.0	181.0
70歳以上	66	107.9	27.6	3.0	48.0	48.8	62.0	75.3	90.2	104.3	129.0	146.3	155.0	167.0	167.0
(再掲)20歳以上	124	116.3	31.0	3.1	48.0	49.9	68.0	78.0	94.0	114.6	139.0	155.0	173.5	196.8	197.0
(再掲)65~74歳	44	121.7	29.4	5.1	50.0	50.0	73.4	88.4	101.0	122.4	142.0	156.6	176.5	181.0	181.0
(再掲)75歳以上	44	104.5	25.3	3.0	48.0	49.8	63.6	75.3	79.0	101.8	127.3	137.5	152.2	157.0	157.0
(再掲)20歳以上※1	124	118.6	31.8	3.2	48.0	52.9	68.6	78.0	94.0	117.2	141.0	161.0	180.1	196.9	197.0
(再掲)20~49歳※1	16	131.4	37.7	6.8	69.0	69.0	77.1	83.9	94.9	121.5	157.7	196.5	197.0	197.0	197.0
(再掲)65~74歳※1	44	122.7	29.0	5.1	50.0	50.0	83.8	88.6	101.0	125.6	142.0	158.0	179.1	181.0	181.0
(再掲)75歳以上※1	44	104.5	25.3	3.0	48.0	49.8	63.6	75.3	79.0	101.8	127.3	137.5	152.2	157.0	157.0
20~29歳	2	102.8	9.1	4.7	97.0	97.0	97.0	97.0	102.7	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
30~39歳	11	94.4	20.5	5.4	60.0	60.0	60.0	63.5	78.7	89.6	119.7	120.9	121.0	121.0	121.0
40~49歳	18	112.1	23.0	3.6	67.0	67.0	67.0	80.5	91.7	114.7	125.0	136.5	162.0	162.0	162.0
50~59歳	23	128.9	29.3	4.5	69.0	69.0	69.3	78.9	110.0	133.2	151.0	168.9	171.6	172.0	172.0
60~69歳	48	121.8	26.6	4.0	50.0	53.1	66.0	84.4	100.0	115.8	144.0	161.1	173.8	179.0	179.0
70歳以上	94	114.6	28.7	3.9	58.0	59.3	72.9	81.0	97.6	110.0	128.0	152.3	174.0	216.0	216.0
(再掲)20歳以上	196	116.3	28.0	2.2	50.0	60.4	73.0	85.0	97.0	112.1	134.0	153.9	169.9	194.0	216.0
(再掲)65~74歳	72	119.0	27.2	3.3	63.0	63.0	65.0	82.0	99.0	114.0	132.7	157.9	172.9	216.0	216.0
(再掲)75歳以上	52	112.5	29.5	5.5	58.0	58.0	66.4	80.2	91.5	109.0	133.8	152.9	176.8	190.0	190.0
(再掲)20歳以上※1	196	116.0	28.0	2.1	50.0	60.0	72.5	82.5	97.0	112.0	134.0	153.4	168.8	191.8	216.0
(再掲)20~49歳※1	31	104.8	22.4	2.5	60.0	60.0	66.0	79.2	87.0	105.0	122.3	130.1	144.1	162.0	162.0
(再掲)65~74歳※1	72	118.9	27.2	3.3	63.0	63.0	85.0	92.0	99.0	114.0	131.6	157.9	172.9	216.0	216.0
(再掲)75歳以上※1	52	112.5	29.5	5.5	58.0	58.0	66.4	80.2	91.5	109.0	133.8	152.9	176.8	190.0	190.0

注1) 単位:mg/dl

注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の若者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表53-2 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上(コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用除外)

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20~29歳	4	108.2	16.3	8.0	91.0	91.0	91.0	91.0	93.3	109.2	122.4	125.0	125.0	125.0	125.0
30~39歳	15	98.2	27.2	6.7	60.0	60.0	65.6	65.6	70.9	89.7	119.7	135.8	173.0	173.0	173.0
40~49歳	24	126.7	35.6	6.0	67.0	67.0	70.6	70.6	100.3	124.7	149.4	196.1	196.9	197.0	197.0
50~59歳	34	125.2	31.9	4.8	68.0	68.0	68.5	69.0	100.0	133.3	149.6	168.4	172.6	176.0	176.0
60~69歳	56	124.5	25.8	3.4	50.0	72.5	94.9	94.9	105.0	121.6	140.6	162.3	179.3	181.0	181.0
70歳以上	107	117.0	27.1	2.5	48.0	59.7	76.7	82.6	100.0	114.0	134.6	153.7	165.5	213.1	216.0
(再掲)20歳以上	240	119.5	29.0	1.7	48.0	62.0	75.8	85.0	99.0	117.8	138.9	158.9	172.4	196.8	216.0
(再掲)65~74歳	83	123.4	27.8	4.0	62.0	62.0	90.9	94.2	101.0	114.3	141.0	166.1	179.0	216.0	216.0
(再掲)75歳以上	64	113.6	25.4	2.3	48.0	55.2	75.4	78.8	94.7	116.0	129.7	150.9	155.0	174.0	174.0
(再掲)20歳以上※1	240	120.0	29.8	1.8	48.0	62.0	75.0	85.0	98.2	118.0	139.0	161.0	173.1	196.9	216.0
(再掲)20~49歳※1	43	116.4	33.8	5.2	60.0	60.0	66.9	79.6	91.0	117.1	125.0	167.5	196.4	197.0	197.0
(再掲)65~74歳※1	83	123.8	27.9	3.9	62.0	63.4	91.6	94.3	101.0	114.7	141.0	166.5	179.4	216.0	216.0
(再掲)75歳以上※1	64	114.0	25.6	2.4	48.0	56.4	75.4	79.0	94.9	116.0	130.4	151.5	155.0	174.0	174.0
20~29歳	2	112.0	23.4	11.8	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	111.2	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
30~39歳	4	113.4	46.3	22.1	69.0	69.0	69.0	69.9	74.6	101.2	159.7	173.0	173.0	173.0	173.0
40~49歳	7	164.1	33.5	11.5	100.0	100.0	102.0	108.3	147.1	159.5	196.4	197.0	197.0	197.0	197.0
50~59歳	13	114.5	34.8	11.0	68.0	68.0	68.0	68.4	91.5	105.5	140.8	172.2	176.0	176.0	176.0
60~69歳	22	129.1	25.5	6.2	75.0	75.0	88.1	99.5	107.4	127.6	141.6	178.3	180.9	181.0	181.0
70歳以上	51	114.2	25.7	3.4	48.0	52.3	75.3	78.3	95.6	111.0	132.1	152.1	156.1	167.0	167.0
(再掲)20歳以上	99	126.6	30.6	2.4	48.0	62.0	75.0	78.8	100.0	117.9	140.9	164.3	180.3	197.0	197.0
(再掲)65~74歳	33	126.6	27.9	4.6	62.0	62.0	88.7	93.0	104.0	127.1	144.0	164.3	180.3	181.0	181.0
(再掲)75歳以上	35	109.8	23.6	2.4	48.0	49.9	75.3	77.4	93.1	111.0	128.0	138.0	155.1	157.0	157.0
(再掲)20歳以上※1	99	122.5	32.0	2.4	48.0	62.0	72.2	79.0	100.0	123.3	141.0	167.5	185.0	197.0	197.0
(再掲)20~49歳※1	13	136.5	40.1	6.7	69.0	69.0	74.8	81.0	108.4	123.9	172.0	196.7	197.0	197.0	197.0
(再掲)65~74歳※1	33	127.2	27.8	4.5	62.0	62.0	89.8	93.3	104.9	127.1	145.3	166.0	180.4	181.0	181.0
(再掲)75歳以上※1	35	109.8	23.6	2.4	48.0	49.9	75.3	77.4	93.1	111.0	128.0	138.0	155.1	157.0	157.0
20~29歳	2	102.8	9.1	4.7	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	102.7	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
30~39歳	11	94.4	20.5	5.4	60.0	60.0	60.0	63.5	78.7	89.6	119.7	120.9	121.0	121.0	121.0
40~49歳	17	112.1	24.2	4.0	67.0	67.0	67.0	79.6	91.2	121.6	125.0	140.3	162.0	162.0	162.0
50~59歳	21	132.5	28.4	5.8	69.0	69.0	69.0	83.2	114.3	135.4	151.5	169.4	171.8	172.0	172.0
60~69歳	34	121.6	26.0	4.2	50.0	52.2	88.2	93.3	97.6	113.8	139.1	162.0	175.2	179.0	179.0
70歳以上	56	120.2	28.4	2.9	64.0	64.0	81.2	86.4	100.9	114.0	134.9	154.8	174.0	216.0	216.0
(再掲)20歳以上	141	118.6	27.9	1.9	50.0	61.0	80.4	85.0	97.1	116.5	135.1	156.7	169.3	202.7	216.0
(再掲)65~74歳	50	121.1	27.9	4.6	62.0	62.0	90.7	94.8	100.5	113.6	131.4	166.9	177.5	216.0	216.0
(再掲)75歳以上	29	118.9	27.2	3.2	64.0	64.0	77.5	82.8	96.8	118.6	140.7	153.6	165.8	174.0	174.0
(再掲)20歳以上※1	141	118.2	28.0	1.9	50.0	60.4	78.0	85.0	97.0	118.0	135.0	156.8	168.6	200.9	216.0
(再掲)20~49歳※1	30	104.4	23.0	2.6	60.0	60.0	65.7	77.9	87.1	105.0	122.8	130.9	146.0	162.0	162.0
(再掲)65~74歳※1	50	121.1	28.0	4.5	62.0	62.0	90.9	94.8	100.6	113.6	130.3	167.2	177.8	216.0	216.0
(再掲)75歳以上※1	29	118.9	27.2	3.2	64.0	64.0	77.5	82.8	96.8	118.6	140.7	153.6	165.8	174.0	174.0

注1) 単位:mg/dl
 注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問題においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。
 注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表54-1 血清nonHDLコレステロール値の平均値及び標準偏差一年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差一総数・男性・女性、20歳以上〔コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用を含む〕

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値			P99	最大値
										P75	P90	P95		
20～29歳	4	137.9	20.7	9.3	107.0	107.0	107.0	107.0	119.5	144.0	151.0	151.0	151.0	151.0
30～39歳	16	123.7	37.5	9.5	73.0	73.0	73.2	77.8	93.5	110.7	153.3	182.0	208.0	208.0
40～49歳	27	149.0	36.8	7.5	94.0	94.0	98.0	103.0	120.4	141.2	171.6	219.3	231.5	232.0
50～59歳	37	150.9	37.5	6.1	82.0	82.0	82.6	90.1	122.0	152.7	178.5	200.6	213.8	218.0
60～69歳	76	153.4	31.3	4.0	82.0	87.6	110.2	114.2	129.0	147.9	172.0	201.0	209.5	241.0
70歳以上	160	142.8	33.2	2.9	71.0	74.2	93.0	104.0	119.8	138.4	163.2	187.7	194.6	250.8
(再掲)20歳以上	320	145.8	34.2	2.3	71.0	77.0	93.0	106.0	122.0	142.0	168.0	191.0	207.0	236.0
(再掲)65～74歳	116	151.4	32.5	4.0	71.0	71.8	109.8	114.0	127.0	147.0	170.2	195.2	206.2	263.9
(再掲)75歳以上	96	139.4	33.1	3.8	77.0	77.5	93.0	98.3	118.2	133.0	160.7	187.4	192.9	236.0
(再掲)20歳以上※1	320	146.5	34.6	2.5	71.0	77.0	93.0	105.0	123.0	144.5	168.0	193.3	208.0	235.8
(再掲)20～49歳※1	47	142.4	36.8	6.7	73.0	73.0	92.3	94.1	113.6	141.6	160.9	186.9	230.4	232.0
(再掲)65～74歳※1	116	151.9	32.7	4.0	71.0	76.3	110.0	114.0	127.0	147.0	170.3	198.2	207.9	264.1
(再掲)75歳以上※1	96	139.9	33.3	4.0	77.0	77.9	93.0	99.0	118.4	133.7	160.7	187.9	193.5	236.0
20～29歳	2	151.0	0.0	0.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
30～39歳	5	152.2	49.5	22.6	92.0	92.0	92.0	92.0	94.8	164.3	192.8	208.0	208.0	208.0
40～49歳	9	178.7	37.1	12.0	129.0	129.0	130.2	132.3	151.7	173.0	228.6	232.0	232.0	232.0
50～59歳	14	146.0	44.0	13.1	82.0	82.0	82.0	82.0	113.4	140.6	187.4	215.6	218.0	218.0
60～69歳	28	158.8	32.2	7.0	103.0	103.1	109.3	112.9	139.5	155.1	187.1	204.2	228.7	241.0
70歳以上	66	138.1	31.9	2.7	71.0	71.0	86.4	95.0	118.0	136.5	168.0	184.6	190.0	195.0
(再掲)20歳以上	124	147.7	35.9	3.6	71.0	72.5	92.1	99.4	120.6	147.1	174.3	191.0	212.3	238.8
(再掲)65～74歳	44	154.7	33.5	5.2	71.0	71.0	109.3	113.7	135.2	149.8	180.9	196.4	209.9	241.0
(再掲)75歳以上	44	133.5	30.8	3.2	77.0	77.0	85.7	93.0	112.6	128.5	161.8	177.6	187.7	190.0
(再掲)20歳以上※1	124	150.7	36.2	3.8	71.0	75.9	92.0	103.7	124.1	150.5	176.2	194.7	218.7	238.9
(再掲)20～49歳※1	16	166.3	35.7	6.7	92.0	92.0	95.1	131.5	144.3	160.1	180.2	231.0	232.0	232.0
(再掲)65～74歳※1	44	155.8	33.6	5.4	71.0	71.0	111.0	113.8	135.8	150.2	182.8	199.0	211.4	241.0
(再掲)75歳以上※1	44	133.5	30.8	3.2	77.0	77.0	85.7	93.0	112.6	128.5	161.8	177.6	187.7	190.0
20～29歳	2	119.1	19.0	9.8	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	118.9	134.0	134.0	134.0	134.0
30～39歳	11	113.9	28.1	8.2	73.0	73.0	73.0	75.3	90.5	109.3	148.5	153.7	154.0	154.0
40～49歳	18	133.0	25.4	4.6	94.0	94.0	94.0	101.0	115.1	136.5	142.6	173.5	189.0	189.0
50～59歳	23	154.3	33.1	5.8	86.0	86.0	86.3	99.4	132.8	162.3	173.2	200.2	202.5	203.0
60～69歳	48	150.0	30.6	4.5	82.0	84.2	109.3	115.0	127.0	146.0	171.1	200.0	205.9	214.0
70歳以上	94	146.6	33.9	4.3	86.0	86.0	99.4	109.2	125.1	140.0	161.0	190.7	212.6	268.0
(再掲)20歳以上	196	144.5	33.0	2.4	73.0	80.6	94.0	108.0	123.0	140.0	163.3	192.9	202.9	240.9
(再掲)65～74歳	72	149.0	31.8	4.1	91.0	91.0	108.2	114.5	126.1	145.0	167.8	198.2	207.3	268.0
(再掲)75歳以上	52	144.8	34.5	5.5	86.0	86.0	94.4	107.2	121.6	138.3	159.7	191.8	217.9	236.0
(再掲)20歳以上※1	196	143.5	33.1	2.3	73.0	76.0	94.0	106.1	122.1	139.0	163.1	192.3	201.2	238.2
(再掲)20～49歳※1	31	124.9	26.8	4.1	73.0	73.0	77.8	94.0	105.4	121.0	141.9	158.7	178.2	189.0
(再掲)65～74歳※1	72	149.0	31.9	4.0	91.0	91.0	108.2	114.7	126.3	145.0	167.0	198.2	207.8	268.0
(再掲)75歳以上※1	52	144.8	34.5	5.5	86.0	86.0	94.4	107.2	121.6	138.3	159.7	191.8	217.9	236.0

注1) 単位:mg/dL

注2) 血清総コレステロール値及びHDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと泉の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

non HDL コレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL)

表54-2 血清non HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性・20歳以上[コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用除く]

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20~29歳	4	137.9	20.7	9.3	107.0	107.0	107.0	107.0	119.5	144.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
30~39歳	15	119.8	35.7	10.0	73.0	73.0	73.0	76.7	93.2	109.5	152.1	173.7	208.0	208.0	208.0
40~49歳	24	151.0	39.7	7.6	94.0	94.0	95.7	101.0	116.6	141.7	176.2	230.2	231.7	232.0	232.0
50~59歳	34	153.0	38.6	6.6	82.0	82.0	82.0	90.2	121.5	162.4	183.8	201.4	214.7	218.0	218.0
60~69歳	56	155.7	32.1	4.8	82.0	100.9	111.6	116.6	129.0	149.2	184.6	201.0	212.5	241.0	241.0
70歳以上	107	149.2	31.5	3.1	78.0	78.7	104.0	112.2	126.9	145.0	169.9	190.0	198.4	264.2	268.0
(再掲)20歳以上	240	149.2	34.5	2.0	73.0	72.0	94.0	108.0	125.0	147.0	174.0	194.3	208.0	238.8	268.0
(再掲)65~74歳	83	155.7	32.7	4.6	103.0	105.2	113.6	118.0	130.6	147.0	178.3	201.0	212.0	268.0	268.0
(再掲)75歳以上	64	144.9	30.5	2.6	78.0	78.0	93.5	108.8	119.0	145.0	168.0	188.8	192.4	214.0	214.0
(再掲)20歳以上※1	240	149.5	35.2	2.2	73.0	78.0	93.8	106.8	125.0	148.8	172.0	197.7	212.0	237.7	268.0
(再掲)20~49歳※1	43	141.8	38.7	7.1	73.0	73.0	89.0	94.0	109.0	141.9	156.3	198.5	230.7	232.0	232.0
(再掲)65~74歳※1	83	156.3	33.1	4.7	103.0	105.3	113.7	118.4	130.7	147.5	179.4	201.0	212.0	268.0	268.0
(再掲)75歳以上※1	64	145.5	30.6	2.7	78.0	78.0	93.8	109.2	119.0	145.2	168.0	189.2	192.9	214.0	214.0
20~29歳	2	151.0	0.0	0.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0	151.0
30~39歳	4	143.3	56.2	30.4	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	137.6	197.2	208.0	208.0	208.0	208.0
40~49歳	7	194.4	35.1	12.5	129.0	129.0	132.6	144.3	171.1	180.7	230.9	232.0	232.0	232.0	232.0
50~59歳	13	145.2	46.9	15.4	82.0	82.0	82.0	82.0	111.4	132.4	190.3	216.2	218.0	218.0	218.0
60~69歳	22	165.1	32.8	7.9	103.0	103.0	116.4	127.1	146.9	154.0	190.3	211.3	237.4	241.0	241.0
70歳以上	51	145.4	29.7	3.3	78.0	78.0	95.2	110.2	121.6	140.6	173.5	186.8	190.5	195.0	195.0
(再掲)20歳以上	99	152.8	35.9	3.1	78.0	78.1	92.4	109.9	125.3	149.8	179.0	196.8	217.6	241.0	241.0
(再掲)65~74歳	33	161.7	31.9	4.8	103.0	103.3	118.0	119.2	138.0	156.4	188.2	202.4	221.9	241.0	241.0
(再掲)75歳以上	35	139.7	29.4	2.6	78.0	78.0	90.3	101.5	119.0	133.6	168.0	179.0	189.5	190.0	190.0
(再掲)20歳以上※1	99	155.2	36.9	3.4	78.0	78.6	92.0	110.8	128.3	151.0	179.7	206.6	228.8	241.0	241.0
(再掲)20~49歳※1	13	169.9	39.2	6.8	92.0	92.0	92.0	130.4	146.1	156.6	205.8	231.5	232.0	232.0	232.0
(再掲)65~74歳※1	33	162.5	32.6	5.2	103.0	103.1	118.0	120.7	138.0	155.8	188.8	203.6	224.6	241.0	241.0
(再掲)75歳以上※1	35	139.7	29.4	2.6	78.0	78.0	90.3	101.5	119.0	133.6	168.0	179.0	189.5	190.0	190.0
20~29歳	2	119.1	19.0	9.8	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	118.9	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0
30~39歳	11	113.9	28.1	8.2	73.0	73.0	73.0	75.3	90.5	109.3	148.5	153.7	154.0	154.0	154.0
40~49歳	17	134.0	26.6	4.8	94.0	94.0	94.0	100.6	114.6	139.2	143.0	175.8	189.0	189.0	189.0
50~59歳	21	158.2	32.1	7.2	86.0	86.0	86.0	107.2	137.2	163.5	180.8	200.5	202.8	203.0	203.0
60~69歳	34	149.9	30.7	5.1	82.0	83.6	109.6	114.2	125.3	143.0	172.0	200.5	205.4	214.0	214.0
70歳以上	56	153.5	33.1	3.6	86.0	86.0	109.1	112.8	131.1	151.0	165.3	200.1	212.2	268.0	268.0
(再掲)20歳以上	141	146.5	33.2	2.0	73.0	75.3	94.0	107.9	125.0	145.0	164.4	194.0	202.3	248.6	268.0
(再掲)65~74歳	50	151.3	32.9	5.3	108.0	108.0	110.8	115.8	127.0	145.0	167.2	201.0	211.8	268.0	268.0
(再掲)75歳以上	29	152.2	31.1	3.0	86.0	86.0	103.0	110.0	132.7	156.2	173.3	193.0	209.1	214.0	214.0
(再掲)20歳以上※1	141	145.2	33.4	2.0	73.0	74.1	94.0	106.0	121.6	143.0	164.0	193.9	201.1	245.9	268.0
(再掲)20~49歳※1	30	125.0	27.6	4.3	73.0	73.0	76.8	94.0	104.5	130.0	142.2	160.2	179.3	189.0	189.0
(再掲)65~74歳※1	50	151.6	33.1	5.3	108.0	108.0	111.1	116.2	127.0	145.0	166.5	201.0	212.0	268.0	268.0
(再掲)75歳以上※1	29	152.2	31.1	3.0	86.0	86.0	103.0	110.0	132.7	156.2	173.3	193.0	209.1	214.0	214.0

注1) 単位: mg/dL

注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

non HDL コレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL)

表55 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況一年齢階級別、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)が 強く疑われる者		メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の 予備群と考えられる者		左記以外		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	4	0.0%	0.0%	22.6%	21.2%	77.4%	21.2%
	30～39歳	14	0.0%	0.0%	6.4%	5.8%	93.6%	5.8%
	40～49歳	25	16.3%	4.8%	6.6%	4.9%	77.2%	7.8%
	50～59歳	37	2.4%	2.5%	15.3%	7.3%	82.3%	7.1%
	60～69歳	73	15.5%	6.3%	12.6%	2.8%	71.9%	5.2%
	70歳以上	156	18.1%	2.6%	21.3%	2.4%	60.6%	3.0%
	(再掲)20歳以上	309	14.3%	2.2%	16.6%	1.3%	69.1%	2.2%
	(再掲)65～74歳	112	13.6%	3.2%	21.4%	3.5%	65.1%	2.4%
	(再掲)75歳以上	94	21.9%	3.3%	17.1%	4.0%	61.0%	5.4%
	(再掲)20歳以上※1	309	13.0%	2.0%	16.3%	1.5%	70.7%	2.2%
	(再掲)20～49歳※1	43	10.2%	3.3%	11.2%	4.2%	78.5%	6.4%
	(再掲)65～74歳※1	112	13.6%	3.3%	21.4%	3.6%	65.0%	2.3%
(再掲)75歳以上※1	94	20.9%	3.2%	16.3%	3.9%	62.9%	5.3%	
男性	20～29歳	2	0.0%	0.0%	38.3%	34.7%	61.7%	34.7%
	30～39歳	5	0.0%	0.0%	20.4%	14.9%	79.6%	14.9%
	40～49歳	8	41.8%	9.9%	20.0%	14.0%	38.2%	19.6%
	50～59歳	14	5.9%	6.3%	26.3%	8.5%	67.8%	9.0%
	60～69歳	26	27.1%	12.9%	35.0%	9.5%	37.9%	9.9%
	70歳以上	66	29.4%	5.0%	32.5%	5.3%	38.1%	7.1%
	(再掲)20歳以上	121	25.3%	4.3%	31.1%	3.4%	43.6%	6.0%
	(再掲)65～74歳	42	23.3%	6.2%	41.4%	7.1%	35.3%	9.1%
	(再掲)75歳以上	44	32.7%	5.7%	25.0%	6.5%	42.4%	8.0%
	(再掲)20歳以上※1	121	23.3%	4.0%	30.5%	3.8%	46.2%	6.2%
	(再掲)20～49歳※1	15	20.7%	5.6%	25.8%	7.3%	53.5%	10.2%
	(再掲)65～74歳※1	42	23.4%	6.2%	40.4%	7.3%	36.2%	8.9%
(再掲)75歳以上※1	44	32.7%	5.7%	25.0%	6.5%	42.4%	8.0%	
女性	20～29歳	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	40～49歳	17	3.7%	4.0%	0.0%	0.0%	96.3%	4.0%
	50～59歳	23	0.0%	0.0%	7.9%	7.4%	92.1%	7.4%
	60～69歳	47	8.9%	5.3%	0.0%	0.0%	91.1%	5.3%
	70歳以上	90	8.2%	2.6%	11.4%	3.8%	80.4%	4.6%
	(再掲)20歳以上	188	6.4%	1.6%	6.1%	1.7%	87.5%	2.1%
	(再掲)65～74歳	70	6.8%	3.9%	7.5%	3.2%	85.7%	4.8%
	(再掲)75歳以上	50	11.3%	4.0%	9.2%	4.5%	79.5%	5.5%
	(再掲)20歳以上※1	188	5.6%	1.5%	6.1%	1.8%	88.3%	2.1%
	(再掲)20～49歳※1	28	2.2%	2.3%	0.0%	0.0%	97.8%	2.3%
	(再掲)65～74歳※1	70	6.6%	3.7%	8.0%	3.4%	85.4%	4.8%
(再掲)75歳以上※1	50	11.3%	4.0%	9.2%	4.5%	79.5%	5.5%	

注1) 血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答し、かつインスリン注射または血糖を下げる薬について有効回答とみなした20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦2名(30～39歳の2名)を除外した。

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」は、身体状況調査の問診「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「無」と回答した者、(7)に「有」かつ「(7-1)現在、糖尿病の治療の有無」に「無」と回答した者、及び(7-1)に「有」かつ「(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」に「無」と回答した者を、「使用していない」とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

”メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い”の判定

- メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者
腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち2つ以上の項目に該当する者。
- メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者
腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち1つに該当する者。

※”該当する”とは、下記の「基準」を満たしている場合、かつ/または「服薬」がある場合とする。

項目	腹囲(ウエスト周囲径) 男性:85cm以上 女性:90cm以上		
	血中脂質	血圧	血糖
基準	・HDLコレステロール値 40mg/dL未満	・収縮期血圧値 130mmHg以上 ・拡張期血圧値 85mmHg以上	・ヘモグロビン A1c(NGSP)値 6.0%以上
服薬	・コレステロールを下げる薬服用 ・中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用	・血圧を下げる薬服用	・血糖を下げる薬服用 ・インスリン注射使用

表56 糖尿病の指摘の状況一年齢階級別、糖尿病の指摘の有無、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		人数	指摘あり		指摘なし	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	5	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	19	4.1%	3.9%	95.9%	3.9%
	40～49歳	27	9.9%	6.7%	90.1%	6.7%
	50～59歳	38	6.3%	3.6%	93.7%	3.6%
	60～69歳	80	23.1%	8.6%	76.9%	8.6%
	70歳以上	163	16.4%	2.4%	83.6%	2.4%
	(再掲)20歳以上	332	15.2%	3.1%	84.8%	3.1%
	(再掲)65～74歳	121	21.1%	5.5%	78.9%	5.5%
	(再掲)75歳以上	97	15.5%	4.4%	84.5%	4.4%
	(再掲)20歳以上※1	332	13.8%	2.8%	86.2%	2.8%
	(再掲)20～49歳※1	51	6.4%	3.3%	93.6%	3.3%
	(再掲)65～74歳※1	121	21.5%	5.7%	78.5%	5.7%
	(再掲)75歳以上※1	97	14.5%	4.0%	85.5%	4.0%
男性	20～29歳	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	7	11.6%	10.3%	88.4%	10.3%
	40～49歳	9	10.2%	9.4%	89.8%	9.4%
	50～59歳	15	10.4%	7.8%	89.6%	7.8%
	60～69歳	31	40.0%	11.2%	60.0%	11.2%
	70歳以上	68	27.1%	5.1%	72.9%	5.1%
	(再掲)20歳以上	132	25.6%	5.0%	74.4%	5.0%
	(再掲)65～74歳	47	34.3%	6.8%	65.7%	6.8%
	(再掲)75歳以上	45	25.5%	9.2%	74.5%	9.2%
	(再掲)20歳以上※1	132	22.9%	5.1%	77.1%	5.1%
	(再掲)20～49歳※1	18	8.0%	5.1%	92.0%	5.1%
	(再掲)65～74歳※1	47	34.9%	7.3%	65.1%	7.3%
	(再掲)75歳以上※1	45	25.5%	9.2%	74.5%	9.2%
女性	20～29歳	3	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	12	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	40～49歳	18	9.8%	9.8%	90.2%	9.8%
	50～59歳	23	3.5%	3.0%	96.5%	3.0%
	60～69歳	49	11.3%	8.1%	88.7%	8.1%
	70歳以上	95	7.6%	2.5%	92.4%	2.5%
	(再掲)20歳以上	200	7.6%	2.2%	92.4%	2.2%
	(再掲)65～74歳	74	11.3%	5.7%	88.7%	5.7%
	(再掲)75歳以上	52	6.1%	3.4%	93.9%	3.4%
	(再掲)20歳以上※1	200	7.0%	2.1%	93.0%	2.1%
	(再掲)20～49歳※1	33	5.1%	5.2%	94.9%	5.2%
	(再掲)65～74歳※1	74	11.1%	5.5%	88.9%	5.5%
	(再掲)75歳以上※1	52	6.1%	3.4%	93.9%	3.4%

注1) ヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在、糖尿病の治療の有無」、「(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」及び「(7-3)現在の生活習慣の改善の取り組みの有無」が有効回答の者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表57 糖尿病を指摘されたことがある者における、治療の状況－治療の状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		人数	糖尿病の治療あり		糖尿病の治療なし	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	40～49歳	2	36.0%	33.8%	64.0%	33.8%
	50～59歳	3	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	60～69歳	13	81.6%	6.9%	18.4%	8.4%
	70歳以上	24	76.3%	8.5%	23.7%	9.1%
	(再掲)20歳以上	43	70.5%	4.7%	29.5%	6.8%
	(再掲)65～74歳	21	76.7%	7.8%	23.3%	9.5%
	(再掲)75歳以上	12	77.2%	9.1%	22.8%	9.1%
	(再掲)20歳以上※1	43	70.5%	4.7%	29.5%	6.8%
	(再掲)20～49歳※1	3	28.1%	26.3%	71.9%	26.3%
	(再掲)65～74歳※1	21	76.7%	7.8%	23.3%	9.5%
	(再掲)75歳以上※1	12	77.2%	9.1%	22.8%	9.1%
男性	20～29歳	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	40～49歳	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50～59歳	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	60～69歳	11	91.6%	8.8%	8.4%	8.8%
	70歳以上	17	73.0%	10.1%	27.0%	10.1%
	(再掲)20歳以上	32	75.5%	8.5%	24.5%	8.5%
	(再掲)65～74歳	15	83.7%	12.2%	16.3%	12.2%
	(再掲)75歳以上	9	71.4%	9.4%	28.6%	9.4%
	(再掲)20歳以上※1	32	75.5%	8.5%	24.5%	8.5%
	(再掲)20～49歳※1	2	56.2%	36.1%	43.8%	36.1%
	(再掲)65～74歳※1	15	83.7%	12.2%	16.3%	12.2%
	(再掲)75歳以上※1	9	71.4%	9.4%	28.6%	9.4%
女性	20～29歳	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	40～49歳	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	50～59歳	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	60～69歳	2	50.0%	13.3%	50.0%	13.3%
	70歳以上	7	87.8%	20.6%	12.2%	11.2%
	(再掲)20歳以上	11	55.9%	12.0%	44.1%	10.3%
	(再掲)65～74歳	6	58.4%	12.7%	41.6%	10.7%
	(再掲)75歳以上	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	11	55.9%	12.0%	44.1%	10.3%
	(再掲)20～49歳※1	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	(再掲)65～74歳※1	6	58.4%	12.7%	41.6%	10.7%
	(再掲)75歳以上※1	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

注1) ヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在、糖尿病の治療の有無」、「(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」及び「(7-3)現在の生活習慣の改善の取り組みの有無」が有効回答の者のうち、(7)に「有」と回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表58 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況－年齢階級別、糖尿病が疑われる人の状況、割合、標準誤差－総数・男性・女性・20歳以上

性年齢	人数	糖尿病が強く疑われる		糖尿病の可能性が否定できない人		左記以外		(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者*	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
20～29歳	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	15.9%	0.0%	0.0%
30～39歳	16	5.2%	4.9%	0.0%	0.0%	94.8%	16.3%	0.0%	0.0%
40～49歳	27	3.6%	3.4%	9.3%	4.7%	87.1%	4.4%	0.0%	0.0%
50～59歳	37	0.0%	0.0%	5.9%	4.1%	94.1%	4.4%	0.0%	0.0%
60～69歳	75	17.0%	4.6%	1.2%	1.2%	81.9%	6.8%	65.7%	10.4%
70歳以上	159	17.0%	2.6%	9.3%	3.8%	73.2%	3.2%	42.2%	10.3%
(再掲)20歳以上	318	12.8%	2.3%	6.7%	1.8%	80.5%	2.9%	47.4%	6.4%
(再掲)65～74歳	115	18.7%	3.1%	6.7%	3.3%	74.6%	4.5%	48.1%	9.1%
(再掲)75歳以上	96	16.0%	4.5%	8.0%	3.4%	75.1%	5.0%	45.0%	14.8%
(再掲)20歳以上※1	318	12.8%	2.3%	6.7%	1.8%	80.5%	2.9%	47.4%	6.4%
(再掲)20～49歳※1	47	3.8%	2.2%	5.5%	3.3%	90.7%	6.0%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳※1	115	18.7%	3.1%	6.7%	3.3%	74.6%	4.5%	48.1%	9.1%
(再掲)75歳以上※1	96	16.0%	4.5%	8.9%	3.4%	75.1%	5.0%	45.0%	14.8%
20～29歳	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	5	20.4%	18.5%	0.0%	0.0%	79.6%	45.6%	0.0%	0.0%
40～49歳	9	10.2%	9.4%	16.4%	12.6%	73.5%	11.4%	0.0%	0.0%
50～59歳	14	0.0%	0.0%	7.3%	7.2%	92.7%	8.1%	0.0%	0.0%
60～69歳	28	35.8%	8.7%	0.0%	0.0%	64.2%	13.5%	78.8%	11.6%
70歳以上	66	28.0%	5.7%	4.2%	2.3%	67.8%	4.7%	45.9%	11.8%
(再掲)20歳以上	124	24.2%	5.2%	4.4%	1.7%	71.4%	5.8%	53.8%	9.7%
(再掲)65～74歳	44	34.2%	8.5%	4.7%	3.1%	61.1%	8.9%	56.4%	14.3%
(再掲)75歳以上	44	25.0%	9.5%	1.5%	1.5%	73.6%	8.8%	50.7%	13.7%
(再掲)20歳以上※1	124	24.2%	5.2%	4.4%	1.7%	71.4%	5.8%	53.8%	9.7%
(再掲)20～49歳※1	16	10.9%	6.7%	9.9%	8.0%	79.2%	13.1%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳※1	44	34.2%	8.5%	4.7%	3.1%	61.1%	8.9%	56.4%	14.3%
(再掲)75歳以上※1	44	25.0%	9.5%	1.5%	1.5%	73.6%	8.8%	50.7%	13.7%
20～29歳	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	38.7%	0.0%	0.0%
30～39歳	11	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	9.0%	0.0%	0.0%
40～49歳	18	0.0%	0.0%	5.5%	5.5%	94.5%	5.5%	0.0%	0.0%
50～59歳	23	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	95.0%	5.0%	0.0%	0.0%
60～69歳	47	4.7%	4.4%	1.9%	2.0%	93.4%	4.8%	0.0%	0.0%
70歳以上	93	7.9%	2.6%	14.6%	5.9%	77.6%	4.3%	31.3%	18.8%
(再掲)20歳以上	194	4.7%	1.5%	8.3%	2.2%	87.0%	1.8%	23.9%	14.8%
(再掲)65～74歳	71	7.4%	3.2%	8.2%	3.5%	84.4%	3.4%	20.1%	16.5%
(再掲)75歳以上	52	7.9%	3.6%	15.6%	6.6%	76.5%	5.3%	28.5%	23.1%
(再掲)20歳以上※1	194	4.7%	1.5%	8.3%	2.2%	87.0%	1.8%	23.9%	14.8%
(再掲)20～49歳※1	31	0.0%	0.0%	3.2%	3.2%	96.8%	4.6%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳※1	71	7.4%	3.2%	8.2%	3.5%	84.4%	3.4%	20.1%	16.5%
(再掲)75歳以上※1	52	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%	32.6%

注1) ヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無、「(7-1)現在、糖尿病の治療の有無」、「(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」に「有」と回答した者
注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

*「服薬者」とは、身体状況調査票の「(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」に「有」と回答した者。

- 「糖尿病が強く疑われる人」の判定
ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査票(7)、(7-1)、(7-2)及び(7-3)が有効回答の者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の(7-1)「現在、糖尿病治療の有無」に「有」と回答した者
- 「糖尿病の可能性を否定できない人」の判定
ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる人」以外の人

表59 高血圧症有病者の状況－年齢階級別、高血圧症有病者の状況、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	高血圧症有病者		高血圧症者		正常高値血圧者		左記以外		(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
20～29歳	5	19.5%	18.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.5%	18.4%	0.0%	0.0%
30～39歳	19	4.1%	3.9%	0.0%	0.0%	10.5%	10.5%	75.2%	9.2%	0.0%	0.0%
40～49歳	25	13.9%	5.7%	17.1%	8.0%	5.1%	4.0%	63.9%	7.8%	23.0%	22.7%
50～59歳	38	30.7%	10.0%	20.4%	6.1%	18.7%	7.9%	30.2%	9.7%	58.6%	11.7%
60～69歳	78	48.2%	5.9%	21.6%	6.3%	14.7%	4.8%	15.5%	4.3%	53.2%	4.7%
70歳以上	161	66.8%	5.2%	15.3%	3.7%	10.4%	2.0%	7.5%	2.1%	73.9%	6.9%
(再掲)20歳以上	326	48.9%	3.4%	16.3%	2.4%	12.4%	1.7%	22.4%	2.3%	65.9%	5.3%
(再掲)65～74歳	118	60.2%	4.3%	22.4%	5.8%	8.8%	3.4%	8.6%	3.5%	56.1%	5.0%
(再掲)75歳以上	96	66.3%	5.9%	12.7%	3.1%	13.5%	2.7%	7.5%	3.4%	82.7%	10.3%
(再掲)20歳以上※1	326	44.5%	3.1%	16.1%	2.0%	12.4%	2.2%	27.0%	2.6%	63.7%	5.1%
(再掲)20～49歳※1	49	12.7%	3.5%	8.7%	3.6%	9.5%	5.6%	69.1%	7.9%	10.5%	10.0%
(再掲)65～74歳※1	118	60.1%	4.4%	23.0%	5.9%	8.5%	3.2%	8.4%	3.3%	57.4%	4.8%
(再掲)75歳以上※1	96	66.1%	5.9%	13.0%	3.2%	13.9%	2.9%	6.9%	3.2%	82.8%	10.5%
20～29歳	2	38.3%	34.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.7%	34.7%	0.0%	0.0%
30～39歳	7	11.6%	10.3%	0.0%	0.0%	43.0%	23.5%	45.4%	19.4%	0.0%	0.0%
40～49歳	8	20.0%	14.0%	32.0%	17.6%	0.0%	0.0%	48.0%	9.8%	0.0%	0.0%
50～59歳	15	43.3%	12.6%	33.2%	6.7%	4.9%	5.3%	18.6%	10.3%	58.0%	14.5%
60～69歳	29	56.5%	12.2%	30.2%	8.6%	7.6%	6.8%	5.7%	3.7%	59.3%	8.4%
70歳以上	68	71.0%	8.0%	10.2%	3.5%	7.4%	3.1%	11.3%	4.2%	69.7%	7.4%
(再掲)20歳以上	129	57.4%	7.0%	17.8%	3.5%	8.5%	3.0%	16.5%	3.5%	63.1%	5.1%
(再掲)65～74歳	45	69.4%	7.9%	19.5%	4.0%	7.1%	2.6%	7.1%	3.4%	57.2%	7.3%
(再掲)75歳以上	45	68.2%	9.7%	4.9%	4.4%	9.5%	4.7%	12.8%	6.0%	81.2%	8.9%
(再掲)20歳以上※1	129	52.0%	6.3%	18.8%	3.4%	8.4%	3.2%	20.8%	4.6%	58.5%	5.4%
(再掲)20～49歳※1	17	22.5%	6.4%	13.8%	7.8%	12.8%	9.1%	50.9%	13.9%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳※1	45	68.2%	8.4%	20.8%	6.4%	4.1%	2.8%	6.9%	3.3%	58.7%	7.1%
(再掲)75歳以上※1	45	68.2%	9.7%	9.5%	4.4%	9.5%	4.7%	12.8%	6.0%	81.2%	8.9%
20～29歳	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	7.0%	91.7%	7.0%	0.0%	0.0%
40～49歳	17	10.9%	7.8%	9.9%	7.3%	7.6%	6.3%	71.6%	11.5%	43.7%	36.1%
50～59歳	23	21.7%	8.7%	11.4%	8.1%	28.5%	8.1%	38.5%	9.6%	59.5%	25.4%
60～69歳	49	43.1%	4.5%	16.3%	6.4%	19.0%	8.0%	21.6%	6.5%	48.3%	9.9%
70歳以上	93	63.3%	8.1%	19.6%	6.8%	12.9%	3.8%	4.3%	2.2%	77.9%	7.2%
(再掲)20歳以上	197	42.7%	4.5%	15.2%	3.5%	15.2%	2.7%	26.8%	2.5%	68.5%	6.7%
(再掲)65～74歳	73	53.6%	7.2%	24.5%	7.7%	12.2%	6.1%	9.7%	4.7%	55.1%	5.9%
(再掲)75歳以上	51	64.4%	9.1%	15.9%	6.1%	17.5%	5.7%	2.3%	2.3%	84.2%	12.2%
(再掲)20歳以上※1	197	39.0%	4.2%	14.2%	3.2%	15.2%	2.7%	31.6%	2.5%	68.7%	6.5%
(再掲)20～49歳※1	32	5.4%	3.5%	4.9%	3.6%	7.0%	5.8%	82.8%	5.9%	43.7%	36.1%
(再掲)65～74歳※1	73	54.2%	7.3%	24.5%	7.7%	11.8%	5.8%	9.5%	4.6%	56.2%	5.6%
(再掲)75歳以上※1	51	64.4%	9.1%	15.9%	6.1%	17.5%	5.7%	2.3%	2.3%	84.2%	12.2%

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1) 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

* 「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に「有」と回答した者

● 「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

● 「高値血圧者」の判定
収縮期血圧130～139mmHg、かつ/または拡張期血圧80～89mmHg以上の者

● 「正常高値血圧者」の判定
収縮期血圧120～129mmHg、かつ/または拡張期血圧80mmHg未満の者

表60 「脂質異常症が疑われる者」の状況一年齢階級別、脂質異常症が疑われる人の状況、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

	性年齢	人数	脂質異常症が疑われる人		左記以外		(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者*	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	4	22.6%	21.2%	77.4%	21.2%	0.0%	0.0%
	30～39歳	16	11.9%	7.0%	88.1%	7.0%	56.3%	36.1%
	40～49歳	25	6.6%	4.9%	93.4%	4.9%	100.0%	0.0%
	50～59歳	37	16.6%	7.3%	83.4%	7.3%	67.8%	25.2%
	60～69歳	74	31.7%	5.3%	68.3%	5.3%	83.6%	7.1%
	70歳以上	157	39.1%	3.1%	60.9%	3.1%	81.0%	6.3%
	(再掲)20歳以上	313	30.0%	2.2%	70.0%	2.2%	79.6%	5.4%
	(再掲)65～74歳	113	32.7%	4.0%	67.3%	4.0%	76.0%	5.0%
	(再掲)75歳以上	94	40.8%	4.6%	59.2%	4.6%	83.3%	7.4%
	(再掲)20歳以上※1	313	28.0%	2.1%	72.0%	2.1%	77.6%	6.6%
	(再掲)20～49歳※1	45	12.7%	3.6%	87.3%	3.6%	48.5%	28.1%
	(再掲)65～74歳※1	113	32.6%	4.0%	67.4%	4.0%	76.5%	4.7%
	(再掲)75歳以上※1	94	41.7%	4.9%	58.3%	4.9%	84.4%	7.1%
男性	20～29歳	2	38.3%	34.7%	61.7%	34.7%	0.0%	0.0%
	30～39歳	5	46.7%	19.7%	53.3%	19.7%	56.3%	36.1%
	40～49歳	8	20.0%	14.0%	80.0%	14.0%	100.0%	0.0%
	50～59歳	14	24.9%	9.7%	75.1%	9.7%	47.0%	31.7%
	60～69歳	26	31.9%	10.8%	68.1%	10.8%	64.6%	12.3%
	70歳以上	66	35.7%	6.3%	64.3%	6.3%	62.0%	8.8%
	(再掲)20歳以上	121	32.9%	4.5%	67.1%	4.5%	60.8%	9.9%
	(再掲)65～74歳	42	38.5%	7.9%	61.5%	7.9%	54.6%	8.9%
	(再掲)75歳以上	44	32.4%	6.7%	67.6%	6.7%	68.7%	12.9%
	(再掲)20歳以上※1	121	32.1%	4.3%	67.9%	4.3%	57.8%	12.4%
	(再掲)20～49歳※1	15	30.9%	6.3%	69.1%	6.3%	48.5%	28.1%
	(再掲)65～74歳※1	42	37.9%	8.1%	62.1%	8.1%	55.2%	7.9%
	(再掲)75歳以上※1	44	32.4%	6.7%	67.6%	6.7%	68.7%	12.9%
女性	20～29歳	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	11	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	40～49歳	17	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50～59歳	23	11.0%	7.9%	89.0%	7.9%	100.0%	0.0%
	60～69歳	48	31.5%	7.6%	68.5%	7.6%	94.2%	5.4%
	70歳以上	91	42.1%	6.4%	57.9%	6.4%	95.0%	3.4%
	(再掲)20歳以上	192	28.0%	3.3%	72.0%	3.3%	95.0%	2.6%
	(再掲)65～74歳	71	28.8%	4.4%	71.2%	4.4%	95.4%	4.4%
	(再掲)75歳以上	50	49.2%	9.7%	50.8%	9.7%	92.7%	5.4%
	(再掲)20歳以上※1	192	25.1%	3.1%	74.9%	3.1%	95.2%	2.5%
	(再掲)20～49歳※1	30	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)65～74歳※1	71	29.0%	4.3%	71.0%	4.3%	95.8%	4.1%
	(再掲)75歳以上※1	50	49.2%	9.7%	50.8%	9.7%	92.7%	5.4%

注1) HDLコレステロールを測定し、身体状況調査の間診において「(6)(c)コレステロールを下げる薬」、「(6)(d)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用状況に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

*「服薬者」とは、身体状況調査の間診において「(6)(c)コレステロールを下げる薬」、「(6)(d)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」に使用「有」と回答した者

●「脂質異常症が疑われる人」の判定

県民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。

HDLコレステロールが40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

表61 運動習慣の有無-運動習慣の有無、年齢階級別、割合、標準誤差-総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		人数	運動の習慣有*		運動の習慣無	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	4	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	18	28.9%	9.5%	71.1%	9.5%
	40～49歳	24	20.8%	8.1%	79.2%	8.1%
	50～59歳	37	31.1%	11.1%	68.9%	11.1%
	60～69歳	78	58.7%	6.1%	41.3%	6.1%
	70歳以上	152	42.8%	3.8%	57.2%	3.8%
	(再掲)20歳以上	313	41.9%	4.7%	58.1%	4.7%
	(再掲)65～74歳	116	54.8%	5.4%	45.2%	5.4%
	(再掲)75歳以上	90	39.9%	5.8%	60.1%	5.8%
	(再掲)20歳以上※1	313	38.6%	5.2%	61.4%	5.2%
	(再掲)20～49歳※1	46	19.7%	4.9%	80.3%	4.9%
	(再掲)20～64歳※1	107	27.2%	5.9%	72.8%	5.9%
	(再掲)65歳以上※1	206	47.9%	4.0%	52.1%	4.0%
	(再掲)65～74歳※1	116	54.5%	5.5%	45.5%	5.5%
	(再掲)75歳以上※1	90	38.8%	5.8%	61.2%	5.8%
男性	20～29歳	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	6	50.6%	25.8%	49.4%	25.8%
	40～49歳	8	9.4%	10.1%	90.6%	10.1%
	50～59歳	15	19.6%	12.5%	80.4%	12.5%
	60～69歳	31	58.6%	8.5%	41.4%	8.5%
	70歳以上	63	55.6%	6.4%	44.4%	6.4%
	(再掲)20歳以上	125	47.5%	6.5%	52.5%	6.5%
	(再掲)65～74歳	45	62.1%	9.0%	37.9%	9.0%
	(再掲)75歳以上	42	52.1%	6.5%	47.9%	6.5%
	(再掲)20歳以上※1	125	41.9%	8.0%	58.1%	8.0%
	(再掲)20～49歳※1	16	17.6%	10.8%	82.4%	10.8%
	(再掲)20～64歳※1	38	20.8%	8.6%	79.2%	8.6%
	(再掲)65歳以上※1	87	57.9%	5.5%	42.1%	5.5%
	(再掲)65～74歳※1	45	62.1%	9.0%	37.9%	9.0%
	(再掲)75歳以上※1	42	52.1%	6.5%	47.9%	6.5%
女性	20～29歳	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	12	18.7%	12.4%	81.3%	12.4%
	40～49歳	16	26.4%	10.6%	73.6%	10.6%
	50～59歳	22	39.6%	10.5%	60.4%	10.5%
	60～69歳	47	58.7%	7.0%	41.3%	7.0%
	70歳以上	89	32.2%	3.3%	67.8%	3.3%
	(再掲)20歳以上	188	37.8%	4.3%	62.2%	4.3%
	(再掲)65～74歳	71	49.2%	6.4%	50.8%	6.4%
	(再掲)75歳以上	48	28.2%	5.5%	71.8%	5.5%
	(再掲)20歳以上※1	188	36.1%	4.3%	63.9%	4.3%
	(再掲)20～49歳※1	30	21.3%	7.0%	78.7%	7.0%
	(再掲)20～64歳※1	69	31.8%	6.1%	68.2%	6.1%
	(再掲)65歳以上※1	119	39.8%	3.8%	60.2%	3.8%
	(再掲)65～74歳※1	71	48.4%	6.4%	51.6%	6.4%
	(再掲)75歳以上※1	48	28.2%	5.5%	71.8%	5.5%

注1) 身体状況調査の問診において「(8)医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。

*「運動の習慣有」とは、身体状況調査の問診(9)で1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者

表62-1 歩数の平均値及び標準偏差、平均値、標準偏差、標準誤差一総数・男性・女性・20歳以上

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値	
総数	20～29歳	25	5,565	3,291	522	185	1,308	1,413	2,577	6,000	8,075	9,784	12,214	13,348	13,348	
	30～39歳	53	7,146	5,496	797	413	1,587	2,338	3,521	5,825	9,078	13,131	20,360	27,620	27,620	
	40～49歳	66	6,973	4,159	606	750	2,479	2,801	4,095	6,208	8,803	11,990	14,772	26,513	26,513	
	50～59歳	71	6,475	3,629	442	663	1,628	2,401	3,752	6,371	8,523	10,528	12,566	21,627	21,627	
	60～69歳	112	6,382	4,095	434	388	417	1,239	3,335	6,059	8,375	12,423	14,868	19,321	20,483	
	70歳以上	239	4,515	3,726	287	20	361	768	1,775	3,646	5,862	9,708	11,459	18,151	21,961	
	(再掲)20歳以上	566	5,773	4,160	250	20	226	1,263	2,841	5,130	7,748	10,800	13,393	21,848	27,620	
	(再掲)65～74歳	161	5,720	3,814	253	388	394	1,330	2,738	5,126	7,695	11,242	13,159	15,781	15,817	
	(再掲)75歳以上	147	4,153	3,883	384	20	74	267	449	1,332	3,179	5,510	9,093	12,202	20,623	21,961
	(再掲)20歳以上※1	566	5,969	4,209	265	20	214	1,406	2,988	5,413	7,944	10,916	13,393	21,892	27,620	
男性	(再掲)20～49歳※1	144	6,781	4,562	450	185	1,571	2,408	3,622	5,989	8,638	12,063	14,783	27,274	27,620	
	(再掲)65～74歳※1	161	5,751	3,842	256	388	673	1,311	2,739	5,139	7,734	11,368	13,179	15,776	15,817	
	(再掲)75歳以上※1	147	4,106	3,876	398	20	88	269	449	1,274	3,157	5,418	8,948	11,905	20,738	21,961
	20～29歳	9	6,210	3,776	1,083	185	185	318	3,445	5,870	8,371	13,348	13,348	13,348	13,348	
	30～39歳	24	8,093	6,213	1,470	413	413	2,183	4,019	7,274	10,046	13,833	25,322	27,620	27,620	
	40～49歳	27	7,975	5,326	1,229	1,063	1,852	2,796	4,135	6,652	9,505	15,057	24,487	26,513	26,513	
	50～59歳	36	6,422	4,190	661	1,000	1,476	1,868	3,495	6,318	8,103	11,314	18,313	21,627	21,627	
	60～69歳	46	5,884	4,289	640	388	388	676	2,311	5,213	7,696	12,461	14,437	15,633	15,633	
	70歳以上	110	4,697	3,763	282	20	46	273	1,610	3,999	6,509	10,302	13,412	16,310	16,364	
	(再掲)20歳以上	252	5,972	4,574	369	20	176	624	1,232	2,754	5,142	7,798	12,194	13,989	26,613	27,620
女性	(再掲)65～74歳	70	5,404	4,055	549	388	632	909	2,318	4,821	7,519	12,309	14,349	15,817	15,817	
	(再掲)75歳以上	69	4,648	3,940	307	20	20	344	1,479	4,177	6,464	10,328	13,606	16,364	16,364	
	(再掲)20歳以上※1	252	6,319	4,688	414	20	152	1,303	3,123	5,652	8,065	12,239	14,445	26,771	27,620	
	(再掲)20～49歳※1	60	7,610	5,303	792	185	1,207	2,498	4,125	6,264	9,504	13,622	22,366	27,620	27,620	
	(再掲)65～74歳※1	70	5,517	4,140	576	388	388	727	2,170	5,116	7,551	12,354	14,440	15,817	15,817	
	(再掲)75歳以上※1	69	4,648	3,940	307	20	20	218	1,479	4,177	6,464	10,328	13,606	16,364	16,364	
	20～29歳	16	5,242	3,088	725	1,303	1,327	1,427	2,282	6,000	8,395	9,362	9,737	9,737	9,737	
	30～39歳	29	6,282	4,703	423	730	765	1,581	2,039	2,868	5,341	8,030	15,607	18,710	20,700	20,700
	40～49歳	39	6,212	2,845	498	750	750	2,482	2,721	3,866	6,058	7,988	10,468	11,566	12,535	12,535
	50～59歳	35	6,532	2,960	432	663	663	1,609	2,450	4,454	6,551	8,870	9,834	12,733	13,226	13,226
60～69歳	66	6,759	3,935	459	519	519	1,295	2,083	3,491	6,864	8,721	12,228	15,299	20,483	20,483	
70歳以上	129	4,347	3,698	340	167	174	393	564	1,852	3,560	5,725	9,036	11,110	20,934	21,961	
(再掲)20歳以上	314	5,602	3,768	228	167	320	643	1,347	2,905	5,047	7,624	9,984	12,342	20,669	21,961	
(再掲)65～74歳	91	5,993	3,595	326	396	398	1,085	1,675	3,209	5,437	8,430	10,937	12,110	15,751	15,751	
(再掲)75歳以上	78	3,703	3,801	554	167	167	361	450	1,134	3,127	4,862	7,537	9,630	21,961	21,961	
(再掲)20歳以上※1	314	5,653	3,704	234	167	360	750	1,503	2,902	5,229	7,725	9,912	12,189	20,628	21,961	
(再掲)20～49歳※1	84	5,991	3,589	319	730	748	1,561	2,093	2,922	5,869	8,461	9,980	12,296	20,700	20,700	
(再掲)65～74歳※1	91	5,956	3,574	325	396	396	1,084	1,676	3,209	5,390	8,402	10,945	11,874	15,751	15,751	
(再掲)75歳以上※1	78	3,703	3,801	554	167	167	361	450	1,134	3,127	4,862	7,537	9,630	21,961	21,961	

注1) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」及び「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをした値。