

(生活習慣調査)

表63 BMIの平均値及び標準偏差一年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差－総数・男性・女性・20歳以上〔妊婦除外〕

年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20～29歳	45	20.3	2.2	0.4	14.7	16.0	17.1	17.7	18.7	20.3	21.1	23.5	24.5	26.3	26.3
30～39歳	68	23.1	7.2	1.2	16.0	16.0	16.9	17.9	19.6	21.3	24.4	29.3	31.7	61.3	61.3
40～49歳	102	22.4	3.5	0.4	16.4	16.4	17.1	18.6	20.1	21.8	24.0	27.3	29.6	36.7	36.8
50～59歳	110	23.4	3.9	0.5	14.8	16.8	18.3	18.5	20.6	23.2	25.2	29.4	31.3	35.9	35.9
60～69歳	185	23.0	3.5	0.2	15.4	15.5	18.0	18.9	20.6	22.5	25.2	27.2	29.5	34.0	34.3
70歳以上	326	22.8	3.0	0.2	15.2	15.8	18.3	19.2	20.8	22.7	24.7	26.7	28.1	32.3	34.3
(再掲)20歳以上	836	22.8	3.9	0.2	14.7	16.1	17.9	18.7	20.3	22.3	24.5	27.2	29.4	34.2	61.3
(再掲)65～74歳	250	23.2	3.3	0.2	15.2	15.8	18.2	19.7	20.8	22.9	25.2	27.1	29.0	34.3	34.3
(再掲)75歳以上	182	22.6	2.8	0.2	15.8	15.8	18.5	19.2	20.9	22.6	24.2	26.3	27.6	30.2	33.2
(再掲)20歳以上※1	836	22.7	4.1	0.2	14.7	16.1	17.8	18.6	20.2	22.0	24.4	27.3	29.5	34.3	61.3
(再掲)20～49歳※1	215	22.1	5.0	0.5	14.7	16.2	17.1	17.9	19.6	20.8	23.5	27.1	29.7	45.4	61.3
(再掲)65～74歳※1	250	23.2	3.3	0.2	15.2	15.8	18.2	19.6	20.8	22.9	25.2	27.1	29.1	34.3	34.3
(再掲)75歳以上※1	182	22.5	2.8	0.3	15.8	15.8	18.3	19.2	20.8	22.6	24.2	26.3	27.6	30.4	33.2
20～29歳	21	21.0	2.1	0.3	16.9	16.9	17.7	18.0	19.8	20.8	22.4	23.8	26.0	26.3	26.3
30～39歳	38	24.9	9.1	1.9	17.3	17.3	17.5	19.2	20.1	21.6	27.1	31.3	46.5	61.3	61.3
40～49歳	52	23.7	3.0	0.4	17.4	17.4	19.9	20.4	21.0	23.3	25.2	28.1	29.6	33.3	33.3
50～59歳	56	24.7	4.0	0.9	18.3	18.3	18.5	20.3	21.6	24.1	26.7	30.0	33.3	35.9	35.9
60～69歳	83	23.8	3.3	0.4	15.8	15.9	19.7	20.1	21.3	23.5	25.9	27.8	30.4	34.3	34.3
70歳以上	157	23.1	2.6	0.2	17.2	17.2	19.3	19.8	21.2	23.0	24.9	26.9	27.6	29.0	30.1
(再掲)20歳以上	407	23.6	4.1	0.2	15.8	17.3	19.1	19.8	21.0	23.2	25.3	27.6	29.6	35.0	61.3
(再掲)65～74歳	126	23.4	3.0	0.3	17.2	17.2	19.5	19.9	20.9	23.2	25.5	26.9	28.4	34.0	34.3
(再掲)75歳以上	86	23.1	2.3	0.2	18.9	18.9	19.3	19.8	21.3	23.0	24.6	26.6	27.5	28.9	28.9
(再掲)20歳以上※1	407	23.6	4.5	0.3	15.8	17.3	18.6	19.8	20.9	23.1	25.3	28.1	30.1	35.8	61.3
(再掲)65～74歳※1	111	23.4	5.9	0.8	16.9	17.1	18.0	19.4	20.4	22.2	24.6	28.2	30.9	59.4	61.3
(再掲)75歳以上※1	126	23.4	3.1	0.3	17.2	17.2	19.5	20.0	20.9	23.2	25.5	26.9	28.4	34.0	34.3
20～29歳	86	23.1	2.3	0.2	18.9	18.9	19.3	19.8	21.3	23.0	24.6	26.6	27.5	28.9	28.9
30～39歳	24	19.5	2.0	0.5	14.7	14.7	16.3	17.1	17.9	19.2	20.6	23.2	24.2	24.5	24.5
40～49歳	30	21.1	3.4	0.6	16.0	16.0	16.1	17.2	18.6	20.7	22.4	27.2	29.2	30.4	30.4
50～59歳	50	21.1	3.6	0.6	16.4	16.4	16.7	17.1	19.4	20.3	22.0	23.9	29.7	36.8	36.8
60～69歳	54	21.9	3.3	0.4	14.8	15.5	17.5	18.4	19.9	20.9	23.8	25.7	29.8	32.7	32.7
70歳以上	102	22.2	3.5	0.6	15.4	15.4	17.3	18.2	19.6	21.6	24.1	27.2	29.5	34.0	34.1
(再掲)20歳以上	429	21.9	3.4	0.3	15.2	15.5	17.7	18.7	20.3	22.5	24.4	26.6	29.2	33.9	34.3
(再掲)65～74歳	124	23.0	3.6	0.4	14.7	15.7	17.1	18.0	19.5	21.4	23.7	26.3	29.1	33.3	36.8
(再掲)75歳以上	96	22.1	3.1	0.4	15.8	15.8	16.8	18.5	20.3	22.6	24.8	27.2	29.5	34.3	34.3
(再掲)20歳以上※1	429	21.7	3.4	0.3	14.7	15.8	17.1	17.9	19.4	21.1	23.5	25.8	28.9	33.1	36.8
(再掲)65～74歳※1	104	20.7	3.3	0.4	14.7	16.0	16.8	17.1	18.8	20.2	21.8	24.1	28.4	36.5	36.8
(再掲)75歳以上※1	124	23.0	3.6	0.5	15.2	15.2	17.9	18.9	20.4	22.7	24.8	27.2	29.5	34.3	34.3
調査票No.1の問1で身長と体重(自己申告値)の記入があった者を集計対象とした。なお、女性の集計は妊婦9名を除外して行った。	96	22.1	3.1	0.4	15.8	15.8	16.8	18.5	20.3	21.8	23.4	26.1	28.6	33.2	33.2

注1) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問1:
現在のあなたの身長、体重を記入してください。
(ア)身長
(イ)体重

表64-1 BMIの状況一年齢階級別、肥満度別(BMI別)、割合、標準誤差—総数・男性・女性・20歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数									
20～29歳	45	23.7%	10.1%	75.1%	10.1%	1.3%	1.4%	45.5%	10.8%
30～39歳	68	13.8%	5.5%	65.5%	3.9%	20.7%	5.2%	31.5%	5.4%
40～49歳	102	8.9%	2.8%	74.4%	4.3%	16.7%	3.6%	24.2%	4.5%
50～59歳	110	8.7%	3.1%	64.4%	4.3%	26.9%	3.9%	17.8%	3.6%
60～69歳	185	8.4%	2.2%	65.5%	3.6%	26.1%	2.2%	19.1%	3.0%
70歳以上	326	5.3%	1.5%	73.0%	2.6%	21.8%	3.6%	16.8%	1.2%
(再掲)20歳以上	836	8.6%	1.4%	69.7%	1.5%	21.6%	1.8%	21.2%	1.3%
(再掲)65～74歳	250	5.7%	1.3%	67.4%	2.6%	26.9%	3.0%	15.1%	1.7%
(再掲)75歳以上	182	4.8%	1.6%	77.9%	2.8%	17.4%	3.5%	16.1%	2.4%
(再掲)20歳以上※1	836	9.6%	1.6%	69.7%	1.8%	20.8%	1.8%	22.8%	1.4%
(再掲)20～49歳※1	215	13.9%	2.9%	71.6%	4.0%	14.5%	3.0%	31.6%	3.4%
(再掲)65～74歳※1	250	5.6%	1.3%	67.2%	2.9%	27.2%	3.3%	15.1%	1.7%
(再掲)75歳以上※1	182	5.2%	1.7%	77.5%	2.8%	17.3%	3.4%	16.6%	2.4%
20～29歳	21	18.6%	10.2%	79.0%	10.4%	2.4%	2.6%	29.2%	11.1%
30～39歳	38	4.6%	4.5%	61.1%	6.1%	31.0%	6.6%	24.2%	8.2%
40～49歳	52	2.2%	2.2%	72.2%	4.0%	25.6%	3.9%	3.2%	2.4%
50～59歳	56	2.5%	2.2%	55.6%	7.5%	41.9%	8.7%	9.0%	4.3%
60～69歳	83	3.1%	2.2%	60.7%	5.4%	36.1%	5.6%	6.6%	2.7%
70歳以上	157	2.2%	1.1%	74.6%	2.2%	23.2%	2.5%	12.3%	2.2%
(再掲)20歳以上	407	3.6%	0.7%	67.9%	2.0%	28.5%	1.8%	11.6%	1.4%
(再掲)20～69歳	250	4.4%	4.4%	64.1%	2.8%	31.6%	2.7%	11.2%	1.7%
(再掲)65～74歳	126	4.1%	2.1%	64.5%	4.8%	31.4%	5.0%	10.3%	2.1%
(再掲)75歳以上	86	0.0%	0.0%	81.8%	5.2%	18.2%	5.2%	11.2%	3.2%
(再掲)20歳以上※1	407	4.3%	0.8%	67.6%	2.2%	28.1%	1.9%	12.5%	1.4%
(再掲)20～49歳※1	111	7.0%	2.4%	71.2%	3.9%	21.8%	3.7%	16.7%	2.0%
(再掲)65～74歳※1	126	4.1%	2.1%	64.4%	4.8%	31.5%	5.1%	10.1%	2.1%
(再掲)75歳以上※1	86	0.0%	0.0%	81.8%	5.2%	18.2%	5.2%	11.2%	3.2%
20～29歳	24	29.5%	11.9%	70.5%	11.9%	0.0%	0.0%	64.1%	10.7%
30～39歳	30	24.2%	10.0%	66.7%	7.6%	9.1%	6.1%	39.7%	9.2%
40～49歳	50	15.5%	5.0%	76.7%	6.9%	7.7%	4.3%	45.1%	7.8%
50～59歳	54	15.4%	6.7%	73.9%	5.8%	10.7%	4.4%	27.2%	6.1%
60～69歳	102	12.9%	4.2%	69.6%	4.1%	17.5%	5.6%	29.8%	7.0%
70歳以上	169	8.3%	2.2%	71.4%	4.0%	20.3%	5.1%	21.2%	2.2%
(再掲)20歳以上	429	13.6%	2.5%	71.5%	2.0%	14.8%	3.3%	30.7%	2.8%
(再掲)40～69歳	206	14.3%	2.8%	72.6%	3.6%	13.2%	4.9%	33.0%	3.6%
(再掲)65～74歳	124	7.3%	2.2%	70.6%	5.4%	22.1%	5.9%	20.2%	3.5%
(再掲)75歳以上	96	9.4%	2.9%	74.1%	4.2%	16.5%	4.0%	20.7%	2.5%
(再掲)20歳以上※1	429	14.9%	2.6%	71.8%	2.3%	13.3%	3.1%	33.1%	2.7%
(再掲)20～49歳※1	104	21.7%	4.2%	72.1%	4.7%	6.2%	2.7%	48.4%	4.9%
(再掲)65～74歳※1	124	7.3%	2.2%	70.1%	6.0%	22.6%	6.4%	20.4%	3.4%
(再掲)75歳以上※1	96	9.4%	2.9%	74.1%	4.2%	16.5%	4.0%	20.7%	2.5%

注1) 調査票No.1の間1で身長と体重(自己申告値)の記入があった者を集計対象とした。なお、女性の集計は妊婦9名を除外して行った。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ): 18.5未満
 普通: 18.5以上25.0未満
 肥満: 25.0以上

注4) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けを算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表64-2 BMIの状況一年齢階級別、肥満度別(BMI別)、割合、標準誤差—総数・男性・女性・65歳以上

性年齢	人数	やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
65-69歳	106	5.3%	1.8%	68.4%	3.7%	26.3%	3.9%	11.6%	2.2%
70-74歳	144	5.9%	2.4%	66.7%	4.9%	27.4%	5.7%	17.8%	2.1%
75-79歳	84	2.8%	1.7%	81.2%	3.8%	16.0%	3.3%	14.3%	3.5%
80-84歳	58	9.3%	4.2%	73.0%	6.4%	17.7%	6.0%	20.2%	5.4%
80歳以上	98	6.4%	3.1%	75.0%	3.9%	18.6%	4.3%	17.6%	4.5%
85歳以上	40	2.7%	2.3%	77.6%	5.1%	19.7%	5.3%	14.2%	5.2%
(再掲)65歳以上	432	5.3%	1.2%	71.8%	1.7%	22.9%	2.2%	15.5%	1.2%
(再掲)65-69歳※1	106	5.1%	1.9%	67.8%	3.9%	27.1%	4.3%	11.0%	2.0%
(再掲)70-74歳※1	144	6.0%	2.5%	66.8%	5.3%	27.2%	6.0%	18.2%	2.1%
(再掲)75-79歳※1	84	3.1%	1.9%	80.9%	3.6%	16.0%	3.1%	14.4%	3.5%
(再掲)80-84歳※1	58	10.3%	4.6%	72.1%	6.6%	17.6%	6.1%	21.3%	5.5%
(再掲)80歳以上※1	98	7.1%	3.4%	74.6%	4.0%	18.4%	4.4%	18.4%	4.5%
(再掲)85歳以上※1	40	2.9%	2.5%	77.7%	5.3%	19.4%	5.6%	14.7%	5.3%
65-69歳	55	3.2%	2.9%	63.1%	7.0%	33.7%	8.5%	6.2%	2.9%
70-74歳	71	4.9%	2.7%	65.6%	5.4%	29.5%	6.1%	13.7%	3.3%
75-79歳	41	0.0%	0.0%	84.3%	7.4%	15.7%	7.4%	13.0%	4.4%
80-84歳	29	0.0%	0.0%	81.6%	8.6%	18.4%	8.6%	9.6%	6.7%
80歳以上	45	0.0%	0.0%	79.6%	5.2%	20.4%	5.2%	9.7%	6.1%
85歳以上	16	0.0%	0.0%	76.8%	7.1%	23.2%	7.1%	9.7%	5.6%
(再掲)65歳以上	212	2.4%	1.3%	71.5%	2.2%	26.1%	2.4%	10.7%	1.4%
(再掲)65-69歳※1	55	3.2%	2.9%	63.1%	7.0%	33.7%	8.5%	6.2%	2.9%
(再掲)70-74歳※1	71	4.9%	2.7%	65.6%	5.4%	29.5%	6.1%	13.7%	3.3%
(再掲)75-79歳※1	41	0.0%	0.0%	84.3%	7.4%	15.7%	7.4%	13.0%	4.4%
(再掲)80-84歳※1	29	0.0%	0.0%	81.6%	8.6%	18.4%	8.6%	9.6%	6.7%
(再掲)80歳以上※1	45	0.0%	0.0%	79.6%	5.2%	20.4%	5.2%	9.7%	6.1%
(再掲)85歳以上※1	16	0.0%	0.0%	76.8%	7.1%	23.2%	7.1%	9.7%	5.6%
65-69歳	51	7.8%	3.2%	74.5%	5.7%	17.7%	6.1%	17.9%	5.9%
70-74歳	73	7.0%	2.9%	67.8%	9.9%	25.3%	10.0%	21.8%	3.9%
75-79歳	43	5.6%	3.4%	78.2%	4.8%	16.2%	4.4%	15.5%	4.7%
80-84歳	29	18.8%	8.6%	64.2%	10.4%	17.0%	9.2%	31.1%	8.0%
80歳以上	53	12.6%	5.9%	70.6%	6.5%	16.8%	6.3%	25.3%	5.5%
85歳以上	24	5.1%	4.2%	78.4%	9.2%	16.6%	9.3%	18.2%	6.6%
(再掲)65歳以上	220	8.2%	2.0%	72.1%	3.0%	19.7%	3.8%	20.4%	2.6%
(再掲)65-69歳※1	51	7.8%	3.2%	74.5%	5.7%	17.7%	6.1%	17.9%	5.9%
(再掲)70-74歳※1	73	7.0%	2.9%	67.8%	9.9%	25.3%	10.0%	21.8%	3.9%
(再掲)75-79歳※1	43	5.6%	3.4%	78.2%	4.8%	16.2%	4.4%	15.5%	4.7%
(再掲)80-84歳※1	29	18.8%	8.6%	64.2%	10.4%	17.0%	9.2%	31.1%	8.0%
(再掲)80歳以上※1	53	12.6%	5.9%	70.6%	6.5%	16.8%	6.3%	25.3%	5.5%
(再掲)85歳以上※1	24	5.1%	4.2%	78.4%	9.2%	16.6%	9.3%	18.2%	6.6%

注1) 調査票No.1の間1で身長と体重(自己申告値)の記入があった者を集計対象とした。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ):18.5未満

普通:18.5以上25.0未満

肥満:25.0以上

注4) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表64-3 目標とするBMIの範囲の分布—年齢階級、目標とするBMIの範囲、割合、標準誤差— 総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	性年齢	人数	範囲未満		範囲内		範囲以上	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	45	23.7%	10.1%	75.1%	10.1%	1.3%	1.4%
	30～39歳	68	13.8%	5.5%	65.5%	3.9%	20.7%	5.2%
	40～49歳	102	8.9%	2.8%	74.4%	4.3%	16.7%	3.6%
	50～59歳	110	17.8%	3.6%	55.3%	4.2%	26.9%	3.9%
	60～69歳	185	32.8%	4.2%	41.1%	3.9%	26.1%	2.8%
	70歳以上	326	34.9%	2.4%	43.3%	3.4%	21.8%	3.6%
	(再掲)20歳以上	836	26.2%	1.5%	52.2%	2.1%	21.6%	1.8%
	(再掲)65～74歳	250	33.6%	3.6%	39.5%	4.1%	26.9%	3.0%
	(再掲)75歳以上	182	36.9%	3.6%	45.7%	3.3%	17.4%	3.5%
	(再掲)20歳以上※1	836	23.8%	1.4%	55.4%	2.2%	20.8%	1.8%
	(再掲)20～49歳※1	215	13.9%	2.9%	71.6%	4.0%	14.5%	3.0%
	(再掲)65～74歳※1	250	33.4%	3.4%	39.4%	4.3%	27.2%	3.3%
	(再掲)75歳以上※1	182	37.8%	3.7%	45.0%	3.2%	17.3%	3.4%
男性	20～29歳	21	18.6%	10.2%	79.0%	10.4%	2.4%	2.6%
	30～39歳	38	4.6%	4.5%	64.5%	6.1%	31.0%	6.6%
	40～49歳	52	2.2%	2.2%	72.2%	4.0%	25.6%	3.9%
	50～59歳	56	9.0%	4.3%	49.1%	7.7%	41.9%	8.7%
	60～69歳	83	22.7%	4.1%	41.1%	4.2%	36.1%	5.6%
	70歳以上	157	29.7%	4.6%	47.1%	4.5%	23.2%	2.8%
	(再掲)20歳以上	407	18.7%	2.5%	52.9%	2.8%	28.5%	1.8%
	(再掲)65～74歳	126	30.9%	5.7%	37.7%	6.0%	31.4%	5.0%
	(再掲)75歳以上	86	28.2%	4.9%	53.6%	5.2%	18.2%	5.2%
	(再掲)20歳以上※1	407	15.9%	1.9%	55.9%	2.6%	28.1%	1.9%
	(再掲)20～49歳※1	111	7.0%	2.4%	71.2%	3.9%	21.8%	3.7%
	(再掲)65～74歳※1	126	30.8%	5.6%	37.6%	6.0%	31.5%	5.1%
	(再掲)75歳以上※1	86	28.2%	4.9%	53.6%	5.2%	18.2%	5.2%
女性	20～29歳	24	29.5%	11.9%	70.5%	11.9%	0.0%	0.0%
	30～39歳	30	24.2%	10.0%	66.7%	7.6%	9.1%	6.1%
	40～49歳	50	15.5%	5.0%	76.7%	6.9%	7.7%	4.3%
	50～59歳	54	27.2%	6.1%	62.1%	7.5%	10.7%	4.4%
	60～69歳	102	41.5%	8.9%	41.1%	4.7%	17.5%	5.8%
	70歳以上	169	40.1%	2.7%	39.6%	4.1%	20.3%	5.1%
	(再掲)20歳以上	429	33.7%	2.6%	51.5%	2.4%	14.8%	3.3%
	(再掲)65～74歳	124	36.6%	4.4%	41.3%	4.4%	22.1%	5.9%
	(再掲)75歳以上	96	45.3%	4.9%	38.2%	3.3%	16.5%	4.0%
	(再掲)20歳以上※1	429	31.7%	2.3%	54.9%	2.7%	13.3%	3.1%
	(再掲)20～49歳※1	104	21.7%	4.2%	72.1%	4.7%	6.2%	2.7%
	(再掲)65～74歳※1	124	36.1%	4.1%	41.3%	4.7%	22.6%	6.4%
	(再掲)75歳以上※1	96	45.3%	4.9%	38.2%	3.3%	16.5%	4.0%

注1) 調査票No.1の問1で身長と体重(自己申告値)の記入があった者を集計対象とした。なお、女性の集計は妊婦9名を除外して行った。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

<参考> 目標とするBMIの範囲(18歳以上)^{1,2}

年齢(歳)	目標とするBMI(kg/m ²)
18-49	18.5-24.9
50-64	20.0-24.9
65-74 ³	21.5-24.9
75以上 ³	21.5-24.9

¹ 男女共通。あくまでも参考として使用するべきである。

² 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かったBMIを基に、疾患別の発症率とBMIとの関連、死因とBMIとの関連、喫煙や疾患の合併によるBMIや死亡リスクへの影響、日本人のBMIの実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。

³ 高齢者では、フレイルの予防及び生活習慣病の発症予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とするBMIの範囲を21.5-24.9kg/m²とした。

(厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」)

表65 腹囲の分布－年齢階級別、腹囲の区分、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	<85cm(男)/<90cm(女)		≥85cm(男)/≥90cm(女)			
		割合	標準誤差	割合	標準誤差		
総数	20～29歳	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	22	75.5%	6.9%	24.5%	6.9%	
	40～49歳	58	73.0%	6.5%	27.0%	6.5%	
	50～59歳	75	78.2%	7.5%	21.8%	7.5%	
	60～69歳	109	65.2%	4.9%	34.8%	4.9%	
	70歳以上	129	65.6%	3.0%	34.4%	3.0%	
	(再掲)20歳以上	400	70.2%	3.0%	29.8%	3.0%	
	(再掲)65～74歳	139	65.0%	3.1%	35.0%	3.1%	
	(再掲)75歳以上	48	63.3%	6.9%	36.7%	6.9%	
	(再掲)20歳以上※1	400	71.4%	3.1%	28.6%	3.1%	
	(再掲)20～49歳※1	87	75.1%	5.4%	24.9%	5.4%	
	(再掲)65～74歳※1	139	65.2%	3.2%	34.8%	3.2%	
	(再掲)75歳以上※1	48	65.1%	6.5%	34.9%	6.5%	
男性	20～29歳	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	15	69.2%	8.5%	30.8%	8.5%	
	40～49歳	33	64.1%	10.2%	35.9%	10.2%	
	50～59歳	37	63.6%	13.2%	36.4%	13.2%	
	60～69歳	50	38.0%	4.4%	62.0%	4.4%	
	70歳以上	62	43.9%	5.7%	56.1%	5.7%	
	(再掲)20歳以上	199	52.4%	4.2%	47.6%	4.2%	
	(再掲)65～74歳	72	43.0%	3.3%	57.0%	3.3%	
	(再掲)75歳以上	24	45.4%	11.4%	54.6%	11.4%	
	(再掲)20歳以上※1	199	55.6%	4.4%	44.4%	4.4%	
	(再掲)20～49歳※1	50	66.8%	8.3%	33.2%	8.3%	
	(再掲)65～74歳※1	72	43.0%	3.2%	57.0%	3.2%	
	(再掲)75歳以上※1	24	45.4%	11.4%	54.6%	11.4%	
女性	20～29歳	5	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	7	87.5%	11.1%	12.5%	11.1%	
	40～49歳	25	85.1%	6.3%	14.9%	6.3%	
	50～59歳	38	92.2%	4.2%	7.8%	4.2%	
	60～69歳	59	89.6%	5.2%	10.4%	5.2%	
	70歳以上	67	84.7%	5.2%	15.3%	5.2%	
	(再掲)20歳以上	201	88.0%	3.9%	12.0%	3.9%	
	(再掲)65～74歳	67	88.7%	4.5%	11.3%	4.5%	
	(再掲)75歳以上	24	80.7%	6.9%	19.3%	6.9%	
	(再掲)20歳以上※1	201	88.2%	3.8%	11.8%	3.8%	
	(再掲)20～49歳※1	37	87.3%	6.1%	12.7%	6.1%	
	(再掲)65～74歳※1	67	88.5%	4.5%	11.5%	4.5%	
	(再掲)75歳以上※1	24	80.7%	6.9%	19.3%	6.9%	

注1) 調査票No.1の問2-1で令和2年11月から令和3年12月の範囲の年月を記入し、かつ問2-2で腹囲の記入があった者を集計対象とした。なお、女性の集計は妊婦9名を除外して行った。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問2:

あなたはこの1年間に、健診等(健康診断、健康診査及び人間ドック)を受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※次のようなものは健診等には含まれません。がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、病院や診療所で行う医療としての検査

No.1 問2-1:

受診年月を記入して下さい。

No.1 問2-2:

腹囲、血圧の健診結果を記入して下さい。

(ア)腹囲(へその高さ)

(イ)血圧

表66-1 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差、平均値、標準偏差、標準誤差、中央値一総数・男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

性年齢	人数	収縮期(最高)血圧			拡張期(最低)血圧		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
20～29歳	15	117.4	11.4	120.0	69.0	8.4	80.0
30～39歳	30	115.8	12.2	116.8	68.5	10.6	68.8
40～49歳	62	119.8	15.6	119.0	74.9	13.3	71.0
50～59歳	80	123.5	13.0	123.0	77.3	10.8	76.0
60～69歳	113	129.7	13.5	128.0	79.2	10.1	80.0
70歳以上	189	133.7	12.5	132.0	75.5	9.9	75.0
(再掲)20歳以上	489	127.4	14.6	128.0	75.9	11.0	75.0
(再掲)65～74歳	147	131.2	12.4	130.0	77.2	10.5	78.0
(再掲)75歳以上	100	134.8	11.8	133.5	74.6	8.8	75.0
(再掲)20歳以上※1	489	126.0	14.6	126.0	75.4	11.1	75.0
(再掲)20～49歳※1	107	118.4	14.0	119.2	72.2	12.1	70.0
(再掲)40～89歳※1	440	127.6	14.4	128.0	76.6	11.0	76.0
(再掲)65～74歳※1	147	131.4	12.2	130.0	77.2	10.5	78.0
(再掲)75歳以上※1	100	134.7	12.0	132.8	74.3	8.7	74.0
20～29歳	5	117.7	7.5	120.0	66.6	8.1	63.0
30～39歳	18	121.1	9.6	120.6	74.3	8.4	74.9
40～49歳	34	126.6	13.1	124.0	80.9	10.5	79.8
50～59歳	37	127.8	12.3	128.0	81.5	10.0	81.3
60～69歳	52	131.2	10.6	130.0	80.6	7.3	80.0
70歳以上	88	134.5	12.0	135.0	78.0	9.9	79.0
(再掲)20歳以上	234	130.0	12.4	130.0	79.0	9.7	80.0
(再掲)65～74歳	74	133.0	11.7	134.0	79.0	9.3	79.9
(再掲)75歳以上	48	135.6	10.0	135.0	77.4	9.0	80.0
(再掲)20歳以上※1	234	128.7	12.4	129.0	78.9	9.9	79.0
(再掲)20～49歳※1	57	123.8	11.8	120.8	77.2	10.6	75.5
(再掲)40～89歳※1	211	130.3	12.4	130.0	80.1	9.6	80.0
(再掲)65～74歳※1	74	133.0	11.5	134.0	79.1	9.2	80.0
(再掲)75歳以上※1	48	135.6	10.0	135.0	77.4	9.0	80.0
20～29歳	10	117.3	13.6	117.2	70.4	8.7	69.1
30～39歳	12	109.1	12.2	106.9	61.2	8.5	62.6
40～49歳	28	111.3	14.5	109.3	67.5	12.7	69.5
50～59歳	43	119.8	12.5	120.1	73.6	10.1	74.1
60～69歳	61	128.3	15.7	126.0	78.0	12.1	78.0
70歳以上	101	133.0	12.9	130.0	73.4	9.4	72.0
(再掲)20歳以上	255	125.0	16.0	126.0	72.9	11.3	72.0
(再掲)65～74歳	73	129.3	12.8	128.0	75.3	11.4	75.0
(再掲)75歳以上	52	134.0	13.4	130.0	71.9	7.7	72.0
(再掲)20歳以上※1	255	123.3	16.0	123.0	72.1	11.2	72.0
(再掲)20～49歳※1	50	112.1	13.8	110.0	66.5	11.2	65.0
(再掲)40～89歳※1	229	125.0	15.6	126.0	73.2	11.1	72.3
(再掲)75歳以上※1	73	129.7	12.8	128.0	75.3	11.3	75.0
(再掲)75歳以上※1	52	134.0	13.4	130.0	71.9	7.7	72.0

注1) 単位: mmHg

注2) 調査票No.1の間2-1(健診受診年月)で令和2年11月から令和3年12月の範囲の年月を記入し、かつ間2-2(健診結果)で血圧の記入があった者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表66-2 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差一年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差、中央値一総数・男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用除く〕

性年齢	人数	収縮期(最高)血圧				拡張期(最低)血圧			
		平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値
20~29歳	15	117.4	11.4	1.1	120.0	69.0	8.4	1.9	68.4
30~39歳	30	115.8	12.2	1.6	116.8	68.5	10.6	1.8	68.8
40~49歳	57	118.7	13.3	1.6	119.0	74.1	12.3	1.2	70.4
50~59歳	66	121.2	12.6	1.8	120.9	75.5	10.7	1.5	75.0
60~69歳	80	128.4	13.9	1.3	127.8	78.4	10.6	1.0	79.0
70歳以上	81	130.0	11.2	1.2	130.0	74.7	9.7	1.1	74.4
(再掲)20歳以上	329	123.8	13.6	0.7	125.0	74.7	11.0	0.5	75.0
(再掲)65~74歳	89	128.6	11.4	0.9	128.7	76.2	10.0	1.2	78.0
(再掲)75歳以上	31	130.9	10.8	1.8	130.0	73.6	8.9	2.1	73.0
(再掲)20歳以上※1	329	122.6	13.5	0.7	123.0	74.2	10.9	0.5	73.3
(再掲)20~49歳※1	102	117.8	12.6	0.7	119.0	71.7	11.4	0.8	70.0
(再掲)40~89歳※1	282	124.2	13.5	1.0	125.0	75.6	10.9	0.6	75.0
(再掲)65~74歳※1	89	128.9	11.2	0.9	129.0	76.1	9.8	1.2	78.0
(再掲)75歳以上※1	31	130.9	10.9	1.8	130.0	73.3	8.7	2.0	73.0
20~29歳	5	117.7	7.5	2.0	120.0	66.6	8.1	3.1	63.0
30~39歳	18	121.1	9.6	2.1	120.7	74.3	8.4	2.4	74.9
40~49歳	31	124.7	11.0	1.6	123.4	80.0	10.4	1.6	77.9
50~59歳	26	124.2	11.8	1.3	122.8	78.8	10.4	1.7	76.0
60~69歳	37	130.6	11.5	1.3	131.7	80.5	7.1	0.8	80.0
70歳以上	35	130.4	11.6	1.7	130.4	78.1	10.8	1.3	79.5
(再掲)20歳以上	152	126.6	11.6	1.0	127.9	78.3	9.8	0.7	79.0
(再掲)65~74歳	41	131.2	10.8	1.2	132.5	79.9	8.9	1.0	80.0
(再掲)75歳以上	16	131.5	9.9	2.0	130.0	76.3	10.3	2.5	79.3
(再掲)20歳以上※1	152	125.6	11.5	1.0	125.0	77.9	9.9	0.8	78.0
(再掲)20~49歳※1	54	122.7	10.3	1.4	120.3	76.5	10.3	1.7	75.1
(再掲)40~89歳※1	129	127.1	11.7	1.0	128.0	79.5	9.7	0.6	80.0
(再掲)65~74歳※1	41	131.3	10.7	1.2	132.7	79.8	8.8	0.9	80.0
(再掲)75歳以上※1	16	131.5	9.9	2.0	130.0	76.3	10.3	2.5	79.3
20~29歳	10	117.3	13.6	1.8	117.2	70.4	8.7	1.8	69.1
30~39歳	12	109.1	12.2	3.5	106.9	61.2	8.5	2.8	62.5
40~49歳	26	111.5	12.4	2.5	110.0	67.1	10.7	1.7	70.0
50~59歳	40	119.3	12.8	2.2	120.0	73.4	10.4	1.5	73.2
60~69歳	43	126.4	15.6	2.2	125.0	76.5	12.7	1.5	75.3
70歳以上	46	129.7	11.0	1.7	128.0	72.0	7.8	1.1	72.0
(再掲)20歳以上	177	121.4	14.8	0.8	121.0	71.6	11.0	0.8	71.0
(再掲)65~74歳	48	126.2	11.5	1.6	127.0	72.9	9.8	1.3	72.9
(再掲)75歳以上	15	130.4	12.1	2.0	126.1	70.8	6.4	1.9	72.0
(再掲)20歳以上※1	177	120.0	14.6	0.8	120.0	70.9	10.8	0.9	70.0
(再掲)20~49歳※1	48	112.2	12.7	1.7	110.0	66.2	10.1	1.7	65.0
(再掲)40~89歳※1	153	121.6	14.5	1.2	121.7	72.2	10.7	0.7	72.0
(再掲)75歳以上※1	48	126.7	11.4	1.7	127.0	72.8	9.6	1.3	72.0
(再掲)75歳以上※1	15	130.4	12.1	2.0	126.1	70.8	6.4	1.9	72.0

注1) 単位:mmHg

注2) 調査票No.1の問2-1(健診受診年月)で令和2年11月から令和3年12月の範囲の年月を記入し、かつ問2-2(健診結果)で血圧の記入があった者のうち、問4(ア)で血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した者を集計対象とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けを合わせたための重み付けをした値。

表67 糖尿病の指摘の状況－年齢階級別、糖尿病の指摘の有無、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	指摘あり		指摘なし		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	58	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	78	2.5%	2.3%	97.5%	2.3%
	40～49歳	117	2.4%	1.7%	97.6%	1.7%
	50～59歳	115	10.7%	2.0%	89.3%	2.0%
	60～69歳	192	20.1%	4.4%	79.9%	4.4%
	70歳以上	345	20.3%	2.7%	79.7%	2.7%
	(再掲)20歳以上	905	13.6%	1.9%	86.4%	1.9%
	(再掲)65～74歳	255	19.8%	2.9%	80.2%	2.9%
	(再掲)75歳以上	200	22.7%	4.3%	77.3%	4.3%
	(再掲)20歳以上※1	905	11.4%	1.6%	88.6%	1.6%
	(再掲)20～49歳※1	253	1.8%	1.2%	98.2%	1.2%
	(再掲)65～74歳※1	255	19.9%	3.0%	80.1%	3.0%
	(再掲)75歳以上※1	200	22.1%	4.3%	77.9%	4.3%
男性	20～29歳	28	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	40	2.5%	2.3%	97.5%	2.3%
	40～49歳	59	4.7%	3.5%	95.3%	3.5%
	50～59歳	57	13.4%	2.4%	86.6%	2.4%
	60～69歳	84	34.1%	7.6%	65.9%	7.6%
	70歳以上	160	26.6%	4.3%	73.4%	4.3%
	(再掲)20歳以上	428	19.0%	3.1%	81.0%	3.1%
	(再掲)65～74歳	127	28.6%	5.3%	71.4%	5.3%
	(再掲)75歳以上	89	29.6%	5.5%	70.4%	5.5%
	(再掲)20歳以上※1	428	15.5%	2.5%	84.5%	2.5%
	(再掲)20～49歳※1	127	2.8%	1.9%	97.2%	1.9%
	(再掲)65～74歳※1	127	29.0%	5.4%	71.0%	5.4%
	(再掲)75歳以上※1	89	29.6%	5.5%	70.4%	5.5%
女性	20～29歳	30	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	38	2.4%	2.3%	97.6%	2.3%
	40～49歳	58	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	50～59歳	58	7.8%	2.9%	92.2%	2.9%
	60～69歳	108	8.9%	2.9%	91.1%	2.9%
	70歳以上	185	14.4%	3.3%	85.6%	3.3%
	(再掲)20歳以上	477	8.5%	1.7%	91.5%	1.7%
	(再掲)65～74歳	128	10.7%	2.4%	89.3%	2.4%
	(再掲)75歳以上	111	16.7%	4.6%	83.3%	4.6%
	(再掲)20歳以上※1	477	7.5%	1.5%	92.5%	1.5%
	(再掲)20～49歳※1	126	0.7%	0.7%	99.3%	0.7%
	(再掲)65～74歳※1	128	10.8%	2.6%	89.2%	2.6%
	(再掲)75歳以上※1	111	16.7%	4.6%	83.3%	4.6%

注1) 調査票No.1の問5、問5-1、問5-2、問5-3が有効回答の者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問5:

これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。
 (「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのように言われたことも含みます。)

No.1 問5-1:

現在、糖尿病治療を受けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。
 (糖尿病治療には、通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含みます。)

No.1 問5-2:

現在、投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)を受けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

No.1 問5-3:

現在、生活習慣の改善に取り組んでいますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表68 糖尿病を指摘されたことがある者における、治療の状況－治療の状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数、男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	糖尿病の治療あり		糖尿病の治療なし		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	0				
	30～39歳	2	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
	40～49歳	2	63.7%	34.0%	36.3%	34.0%
	50～59歳	11	65.6%	14.0%	34.4%	14.0%
	60～69歳	35	68.7%	10.9%	31.3%	10.9%
	70歳以上	65	73.0%	4.5%	27.0%	4.5%
	(再掲)20歳以上	115	70.2%	4.8%	29.8%	4.8%
	(再掲)65～74歳	49	68.9%	9.3%	31.1%	9.3%
	(再掲)75歳以上	39	73.7%	3.8%	26.3%	3.8%
	(再掲)20歳以上※1	115	69.5%	4.6%	30.5%	4.6%
	(再掲)20～49歳※1	4	56.5%	23.5%	43.5%	23.5%
	(再掲)65～74歳※1	49	68.4%	9.3%	31.6%	9.3%
	(再掲)75歳以上※1	39	73.0%	4.1%	27.0%	4.1%
男性	20～29歳	0				
	30～39歳	1	0.0%		100.0%	
	40～49歳	2	63.7%	34.0%	36.3%	34.0%
	50～59歳	7	68.8%	20.5%	31.2%	20.5%
	60～69歳	27	75.3%	7.4%	24.7%	7.4%
	70歳以上	40	79.0%	3.3%	21.0%	3.3%
	(再掲)20歳以上	77	75.2%	2.8%	24.8%	2.8%
	(再掲)65～74歳	35	72.2%	7.4%	27.8%	7.4%
	(再掲)75歳以上	23	78.6%	4.3%	21.4%	4.3%
	(再掲)20歳以上※1	77	73.7%	3.2%	26.3%	3.2%
	(再掲)20～49歳※1	3	45.8%	36.4%	54.2%	36.4%
	(再掲)65～74歳※1	35	71.8%	7.5%	28.2%	7.5%
	(再掲)75歳以上※1	23	78.6%	4.3%	21.4%	4.3%
女性	20～29歳	0				
	30～39歳	1	100.0%		0.0%	
	40～49歳	0				
	50～59歳	4	59.8%	26.1%	40.2%	26.1%
	60～69歳	8	48.5%	24.9%	51.5%	24.9%
	70歳以上	25	62.7%	9.4%	37.3%	9.4%
	(再掲)20歳以上	38	59.9%	10.8%	40.1%	10.8%
	(再掲)65～74歳	14	60.0%	17.0%	40.0%	17.0%
	(再掲)75歳以上	16	66.0%	9.3%	34.0%	9.3%
	(再掲)20歳以上※1	38	61.0%	10.7%	39.0%	10.7%
	(再掲)20～49歳※1	1	100.0%		0.0%	
	(再掲)65～74歳※1	14	59.3%	17.1%	40.7%	17.1%
	(再掲)75歳以上※1	16	66.0%	9.3%	34.0%	9.3%

注1) 調査票No.1の問5(医療機関や健診での糖尿病指摘の有無)、問5-1(糖尿病の治療の有無)、問5-2(投薬の有無)、問5-3(生活習慣改善の有無)が有効回答の者を集計対象とした。

注2) 問5に「無」と回答した者、問5に「有」と回答し、問5-1に「受けていない」と回答した者を「治療なし」とした。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表69 高血圧症有病者の状況一年齢階級別、高血圧症有病者の状況、割合、標準誤差一総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	高血圧症有病者		高血圧症有病者		正常高値血圧者		左記以外		(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
20～29歳	15	0.0%	0.0%	24.9%	8.9%	37.2%	14.7%	37.9%	12.9%		
30～39歳	32	10.9%	6.6%	11.4%	5.3%	26.7%	7.5%	51.0%	7.3%	33.7%	19.9%
40～49歳	65	28.9%	5.9%	20.2%	3.3%	9.8%	3.2%	41.2%	4.7%	41.4%	13.6%
50～59歳	85	35.2%	4.9%	21.8%	3.5%	19.6%	4.1%	23.4%	5.1%	74.2%	9.7%
60～69歳	135	55.3%	6.0%	20.4%	3.2%	10.5%	2.6%	13.8%	2.6%	75.3%	4.2%
70歳以上	282	75.7%	2.0%	12.0%	2.7%	8.0%	1.2%	4.3%	1.5%	91.4%	1.4%
(再掲)20歳以上	614	54.2%	3.0%	16.5%	1.4%	12.3%	2.0%	17.0%	1.9%	82.5%	1.7%
(再掲)65～74歳	192	62.2%	3.9%	17.7%	3.5%	11.3%	3.8%	8.8%	2.4%	85.6%	2.8%
(再掲)75歳以上	166	82.1%	2.9%	9.8%	2.2%	6.4%	1.9%	1.8%	1.3%	94.0%	2.4%
(再掲)20歳以上※1	614	48.9%	3.2%	17.2%	1.5%	13.9%	2.4%	20.0%	2.0%	80.5%	2.1%
(再掲)20～49歳※1	112	19.1%	4.6%	18.5%	2.4%	19.5%	5.1%	42.9%	4.0%	39.4%	9.8%
(再掲)65～74歳※1	192	61.5%	4.0%	18.2%	3.9%	11.8%	3.8%	8.5%	2.2%	85.5%	2.8%
(再掲)75歳以上※1	166	82.2%	3.0%	9.4%	2.0%	6.7%	1.9%	1.7%	1.3%	94.0%	2.4%
20～29歳	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	77.6%	17.9%	22.4%	17.9%		
30～39歳	19	15.7%	9.7%	16.1%	10.1%	36.5%	9.5%	31.8%	11.4%	17.1%	18.5%
40～49歳	36	42.3%	8.1%	24.1%	5.4%	17.5%	5.6%	16.1%	5.1%	33.6%	13.9%
50～59歳	42	52.5%	8.3%	20.8%	2.8%	18.0%	8.1%	8.8%	5.6%	83.4%	8.6%
60～69歳	64	57.7%	5.9%	26.6%	4.4%	7.9%	3.9%	7.8%	2.9%	77.2%	6.6%
70歳以上	132	80.4%	3.1%	12.3%	3.5%	2.5%	1.8%	4.8%	2.0%	90.2%	2.1%
(再掲)20歳以上	298	60.8%	3.1%	18.2%	2.1%	11.4%	2.5%	9.6%	2.1%	80.5%	2.4%
(再掲)65～74歳	101	70.7%	2.9%	17.2%	3.4%	6.3%	2.8%	5.7%	3.1%	82.3%	4.7%
(再掲)75歳以上	74	80.4%	4.1%	14.1%	4.3%	3.1%	3.2%	2.3%	1.5%	93.8%	3.0%
(再掲)20歳以上※1	298	55.5%	3.5%	18.6%	2.3%	14.7%	3.1%	11.2%	2.6%	77.1%	3.0%
(再掲)20～49歳※1	60	29.1%	6.9%	19.0%	5.4%	29.9%	7.9%	22.0%	6.0%	30.6%	10.0%
(再掲)65～74歳※1	101	70.0%	3.0%	17.7%	3.5%	6.7%	3.0%	5.6%	3.0%	82.1%	4.9%
(再掲)75歳以上※1	74	80.4%	4.1%	14.1%	4.3%	3.1%	3.2%	2.3%	1.5%	93.8%	3.0%
20～29歳	10	0.0%	0.0%	39.0%	11.7%	14.3%	9.4%	46.7%	14.1%		
30～39歳	13	4.9%	5.3%	5.5%	5.6%	14.7%	8.1%	75.0%	12.4%	100.0%	
40～49歳	29	11.9%	5.0%	15.3%	6.9%	0.0%	0.0%	72.8%	8.5%	76.3%	17.8%
50～59歳	43	17.6%	6.1%	22.9%	7.3%	21.3%	8.9%	38.2%	6.9%	46.2%	19.9%
60～69歳	71	52.9%	8.5%	14.5%	4.0%	13.0%	4.1%	19.6%	6.0%	73.3%	4.5%
70歳以上	150	71.2%	3.6%	11.7%	3.3%	13.3%	2.6%	3.8%	1.6%	92.8%	2.7%
(再掲)20歳以上	316	47.6%	4.3%	14.8%	1.8%	13.2%	2.7%	24.4%	3.1%	85.0%	1.9%
(再掲)65～74歳	91	52.4%	7.6%	18.3%	5.3%	17.0%	5.0%	12.4%	4.4%	90.7%	4.6%
(再掲)75歳以上	92	83.5%	4.4%	5.8%	2.1%	9.3%	3.4%	1.3%	1.2%	94.2%	3.1%
(再掲)20歳以上※1	316	42.3%	4.3%	15.8%	2.1%	13.2%	2.9%	28.7%	3.5%	84.8%	2.1%
(再掲)20～49歳※1	52	7.3%	3.8%	17.9%	5.2%	7.3%	2.7%	67.6%	7.4%	80.7%	15.5%
(再掲)65～74歳※1	91	52.2%	7.5%	18.8%	6.1%	17.4%	4.9%	11.6%	3.9%	90.4%	4.9%
(再掲)75歳以上※1	92	83.5%	4.4%	5.8%	2.1%	9.3%	3.4%	1.3%	1.2%	94.2%	3.1%

注1) 調査票No.1の間2-1(健診受診年月)で令和2年11月から令和3年12月の範囲の年月を記入し、かつ間2-2(健診結果)で血圧の記入があった者のうち、間4(ア)(血圧を下げる薬の使用の有無)に回答した者を集計対象とした。

*「服薬者」とは、調査票No.1の間4(ア)で血圧を下げる薬の使用の有無に「有」と回答した者。

注2) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

「高血圧症有病者」の判定

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

「高血圧症」の判定

「高血圧症」の判定
収縮期血圧130～139mmHg、かつ/または拡張期血圧80～89mmHgの者

「正常高血圧症」の判定

「正常高血圧症」の判定
収縮期血圧120～129mmHg、かつ拡張期血圧80mmHg未満の者

表70 運動習慣の有無－運動習慣の有無、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

	性年齢	人数	運動習慣あり		運動習慣なし	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	57	21.4%	10.1%	78.6%	10.1%
	30～39歳	77	18.3%	7.0%	81.7%	7.0%
	40～49歳	114	23.3%	3.9%	76.7%	3.9%
	50～59歳	112	17.0%	2.9%	83.0%	2.9%
	60～69歳	189	43.8%	3.2%	56.2%	3.2%
	70歳以上	331	44.1%	3.0%	55.9%	3.0%
	(再掲)20歳以上	880	33.7%	2.0%	66.3%	2.0%
	(再掲)65～74歳	248	43.2%	4.0%	56.8%	4.0%
	(再掲)75歳以上	190	46.8%	3.8%	53.2%	3.8%
	(再掲)20歳以上※1	880	30.4%	2.0%	69.6%	2.0%
	(再掲)20～49歳※1	248	21.3%	3.8%	78.7%	3.8%
	(再掲)20～64歳※1	442	22.1%	2.3%	77.9%	2.3%
	(再掲)65歳以上※1	438	44.3%	2.6%	55.7%	2.6%
	(再掲)65～74歳※1	248	43.0%	3.9%	57.0%	3.9%
(再掲)75歳以上※1	190	46.0%	3.7%	54.0%	3.7%	
男性	20～29歳	27	25.6%	14.3%	74.4%	14.3%
	30～39歳	39	20.0%	7.8%	80.0%	7.8%
	40～49歳	58	23.3%	5.5%	76.7%	5.5%
	50～59歳	56	16.4%	4.9%	83.6%	4.9%
	60～69歳	83	43.7%	4.2%	56.3%	4.2%
	70歳以上	155	49.5%	5.4%	50.5%	5.4%
	(再掲)20歳以上	418	35.6%	3.2%	64.4%	3.2%
	(再掲)65～74歳	125	44.7%	5.9%	55.3%	5.9%
	(再掲)75歳以上	85	55.0%	5.6%	45.0%	5.6%
	(再掲)20歳以上※1	418	31.8%	3.0%	68.2%	3.0%
	(再掲)20～49歳※1	124	22.9%	4.8%	77.1%	4.8%
	(再掲)20～64歳※1	208	22.3%	3.5%	77.7%	3.5%
	(再掲)65歳以上※1	210	48.8%	4.4%	51.2%	4.4%
	(再掲)65～74歳※1	125	44.8%	5.7%	55.2%	5.7%
(再掲)75歳以上※1	85	55.0%	5.6%	45.0%	5.6%	
女性	20～29歳	30	16.4%	8.4%	83.6%	8.4%
	30～39歳	38	16.7%	9.0%	83.3%	9.0%
	40～49歳	56	23.4%	4.8%	76.6%	4.8%
	50～59歳	56	17.7%	4.6%	82.3%	4.6%
	60～69歳	106	43.8%	5.1%	56.2%	5.1%
	70歳以上	176	38.9%	4.4%	61.1%	4.4%
	(再掲)20歳以上	462	32.0%	2.5%	68.0%	2.5%
	(再掲)65～74歳	123	41.6%	7.8%	58.4%	7.8%
	(再掲)75歳以上	105	39.4%	4.1%	60.6%	4.1%
	(再掲)20歳以上※1	462	29.0%	2.5%	71.0%	2.5%
	(再掲)20～49歳※1	124	19.5%	5.5%	80.5%	5.5%
	(再掲)20～64歳※1	234	21.9%	3.3%	78.1%	3.3%
	(再掲)65歳以上※1	228	40.3%	4.5%	59.7%	4.5%
	(再掲)65～74歳※1	123	41.0%	7.9%	59.0%	7.9%
(再掲)75歳以上※1	105	39.4%	4.1%	60.6%	4.1%	

注1) 調査票No.1の問6(医師等からの運動禁止の有無)に「無」と回答し、問7(運動習慣の状況)が有効回答の者を集計対象とした。

※「運動習慣あり」とは、問7(運動習慣の状況)で1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問6:

現在、医師等から運動を禁止されていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。(運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものを言います。)

No.1 問7:

運動習慣の状況についてお答えください。(ア)及び(イ)は数字を記入し、(ウ)はあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

(ア)1週間の運動日数

(イ)運動を行う日の平均運動時間

(ウ)運動の継続年数

表71 喫煙の状況－喫煙の状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	人数	毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない		吸わない		(再掲) 毎日吸う・時々吸う		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	10-14歳	24	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15-19歳	37	0.0%	0.0%	2.7%	2.6%	0.0%	0.0%	97.3%	2.6%	2.7%	2.6%
	20～29歳	58	9.5%	4.0%	1.5%	1.5%	1.9%	1.8%	87.1%	4.6%	11.0%	4.0%
	30～39歳	78	6.4%	3.6%	0.0%	0.0%	13.0%	4.6%	80.7%	5.5%	6.4%	3.6%
	40～49歳	116	20.0%	6.2%	2.4%	1.6%	11.6%	2.8%	66.0%	5.8%	22.4%	6.9%
	50～59歳	115	19.2%	5.0%	2.5%	1.7%	10.6%	2.3%	67.6%	5.0%	21.7%	5.8%
	60～69歳	191	11.0%	2.4%	1.6%	1.2%	8.3%	1.4%	79.0%	3.2%	12.6%	2.9%
	70歳以上	345	6.0%	1.7%	0.5%	0.4%	8.6%	1.7%	84.8%	1.9%	6.5%	1.8%
	(再掲)20歳以上	903	11.0%	2.3%	1.3%	0.3%	9.3%	0.5%	78.5%	2.2%	12.3%	2.5%
	(再掲)65～74歳	254	11.7%	2.7%	1.5%	0.9%	8.8%	1.5%	78.0%	3.1%	13.1%	3.2%
	(再掲)75歳以上	200	2.9%	1.2%	0.0%	0.0%	8.9%	1.8%	88.2%	1.1%	2.9%	1.2%
	(再掲)20歳以上※1	903	11.7%	2.6%	1.3%	0.3%	9.2%	0.4%	77.7%	2.5%	13.1%	2.6%
	(再掲)20～49歳※1	252	13.1%	4.3%	1.4%	0.8%	9.5%	1.1%	76.1%	4.7%	14.5%	4.6%
	(再掲)65～74歳※1	254	11.5%	2.6%	1.3%	0.8%	8.9%	1.5%	78.4%	3.1%	12.8%	3.1%
(再掲)75歳以上※1	200	2.7%	1.1%	0.0%	0.0%	8.3%	1.7%	89.0%	1.1%	2.7%	1.1%	
男性	10-14歳	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	15-19歳	17	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	20～29歳	28	16.5%	7.6%	2.7%	2.8%	3.6%	3.5%	77.2%	9.8%	19.2%	8.0%
	30～39歳	40	10.4%	5.1%	0.0%	0.0%	13.3%	5.3%	76.3%	7.9%	10.4%	5.1%
	40～49歳	58	24.6%	6.3%	3.0%	3.0%	17.2%	4.3%	55.1%	6.0%	27.6%	7.3%
	50～59歳	57	26.9%	7.2%	5.0%	3.5%	18.6%	5.7%	49.5%	9.7%	31.9%	9.8%
	60～69歳	83	21.7%	4.2%	1.1%	1.0%	18.9%	3.0%	58.3%	5.0%	22.8%	5.1%
	70歳以上	160	10.8%	3.6%	1.1%	0.8%	15.6%	3.5%	72.4%	3.6%	11.9%	3.9%
	(再掲)20歳以上	426	17.5%	3.1%	1.9%	0.4%	15.8%	1.3%	64.8%	2.6%	19.4%	3.1%
	(再掲)65～74歳	126	20.5%	5.0%	1.4%	1.0%	16.8%	2.5%	61.3%	4.3%	21.9%	5.0%
	(再掲)75歳以上	89	4.0%	2.5%	0.0%	0.0%	16.0%	3.5%	80.0%	3.3%	4.0%	2.5%
	(再掲)20歳以上※1	426	18.3%	3.3%	2.1%	0.5%	15.2%	1.3%	64.4%	3.3%	20.4%	3.2%
	(再掲)20～49歳※1	126	18.0%	5.6%	2.0%	1.4%	12.3%	2.0%	67.7%	6.9%	20.0%	6.0%
	(再掲)65～74歳※1	126	20.6%	4.9%	1.3%	1.0%	16.9%	2.4%	61.2%	4.4%	21.9%	5.0%
(再掲)75歳以上※1	89	4.0%	2.5%	0.0%	0.0%	16.0%	3.5%	80.0%	3.3%	4.0%	2.5%	
女性	10-14歳	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	15-19歳	20	0.0%	0.0%	5.0%	4.9%	0.0%	0.0%	95.0%	4.9%	5.0%	4.9%
	20～29歳	30	1.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.9%	1.1%	1.1%	1.1%
	30～39歳	38	2.4%	2.3%	0.0%	0.0%	12.7%	6.5%	84.9%	6.3%	2.4%	2.3%
	40～49歳	58	15.4%	6.9%	1.7%	1.6%	6.0%	3.2%	76.9%	7.1%	17.2%	8.3%
	50～59歳	58	11.2%	5.5%	0.0%	0.0%	2.5%	2.0%	86.3%	5.6%	11.2%	5.5%
	60～69歳	108	2.6%	1.4%	2.0%	1.9%	0.0%	0.0%	95.4%	2.4%	4.6%	2.4%
	70歳以上	185	1.6%	1.1%	0.0%	0.0%	2.2%	1.3%	96.3%	1.4%	1.6%	1.1%
	(再掲)20歳以上	477	4.9%	1.8%	0.7%	0.5%	3.1%	1.1%	91.3%	2.2%	5.6%	2.2%
	(再掲)65～74歳	128	2.7%	1.3%	1.5%	1.6%	0.7%	0.7%	95.1%	2.1%	4.2%	2.1%
	(再掲)75歳以上	111	1.8%	1.6%	0.0%	0.0%	2.7%	1.8%	95.4%	1.9%	1.8%	1.6%
	(再掲)20歳以上※1	477	5.5%	2.1%	0.6%	0.4%	3.5%	1.2%	90.4%	2.4%	6.1%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	126	7.7%	3.5%	0.7%	0.7%	6.4%	2.7%	85.1%	3.8%	8.4%	4.1%
	(再掲)65～74歳※1	128	2.4%	1.2%	1.3%	1.4%	0.8%	0.8%	95.4%	1.9%	3.7%	1.9%
(再掲)75歳以上※1	111	1.8%	1.6%	0.0%	0.0%	2.7%	1.8%	95.4%	1.9%	1.8%	1.6%	

注1) 調査票No.1の問8およびNo.3の問9について回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問8、No.3 問9:
あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表72 受動喫煙の機会-年齢階級別、割合、標準誤差-総数・男性・女性、20歳以上(喫煙者・行かなかった人除外)

性年齢	人数	ア 家庭		人数	イ 職場		人数	ウ 学校		人数	エ 飲食店		人数	オ 遊技場 (ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)		
		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差	
総数	20～29歳	48	4.7%	4.3%	34	18.6%	7.9%	20	4.5%	3.4%	37	22.7%	6.1%	17	13.8%	9.9%
	30～39歳	64	8.8%	5.8%	55	24.5%	4.3%	18	0.0%	0.0%	50	25.4%	6.2%	20	17.5%	7.3%
	40～49歳	89	3.1%	1.7%	77	24.6%	5.7%	36	0.0%	0.0%	69	7.5%	2.0%	37	9.9%	5.2%
	50～59歳	91	8.1%	3.3%	82	26.1%	3.6%	27	0.0%	0.0%	66	23.7%	4.3%	24	23.2%	12.5%
	60～69歳	165	5.9%	1.7%	106	12.9%	2.5%	37	0.0%	0.0%	101	14.5%	3.4%	34	2.6%	2.4%
	70歳以上	323	1.1%	0.5%	82	10.6%	2.9%	47	0.0%	0.0%	147	11.6%	2.9%	52	7.5%	3.4%
	(再掲)20歳以上	780	4.2%	1.0%	436	19.3%	2.1%	185	0.4%	0.4%	470	15.6%	1.2%	184	10.8%	1.9%
	(再掲)65～74歳	224	2.8%	1.3%	105	12.4%	3.7%	48	0.0%	0.0%	128	12.6%	3.7%	53	9.5%	4.1%
	(再掲)75歳以上	193	0.7%	0.5%	29	6.5%	6.5%	18	0.0%	0.0%	71	11.0%	4.2%	19	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	780	4.4%	1.2%	436	20.9%	2.2%	185	0.7%	0.6%	470	16.6%	1.4%	184	11.8%	2.0%
	(再掲)20～49歳※1	201	5.3%	2.2%	166	23.9%	3.6%	74	1.3%	1.1%	156	17.3%	3.0%	74	12.6%	2.7%
	(再掲)65～74歳※1	224	2.7%	1.2%	105	12.3%	3.8%	48	0.0%	0.0%	128	12.1%	3.5%	53	9.2%	4.2%
	(再掲)75歳以上※1	193	0.7%	0.5%	29	5.9%	5.9%	18	0.0%	0.0%	71	10.8%	4.1%	19	0.0%	0.0%
男性	20～29歳	19	5.0%	5.2%	12	15.5%	9.0%	9	8.5%	6.6%	12	36.1%	9.5%	7	31.3%	17.8%
	30～39歳	28	8.2%	6.1%	25	49.5%	9.2%	10	0.0%	0.0%	21	43.0%	11.7%	9	18.9%	10.4%
	40～49歳	41	0.0%	0.0%	36	44.5%	9.5%	15	0.0%	0.0%	31	12.5%	5.3%	20	3.8%	3.4%
	50～59歳	40	8.0%	4.7%	36	36.8%	9.1%	13	0.0%	0.0%	29	35.2%	11.0%	15	37.5%	20.3%
	60～69歳	63	0.0%	0.0%	46	14.4%	6.0%	15	0.0%	0.0%	42	17.0%	6.5%	16	5.2%	5.0%
	70歳以上	142	0.5%	0.5%	36	17.7%	6.0%	19	0.0%	0.0%	64	16.0%	4.5%	23	12.2%	6.4%
	(再掲)20歳以上	333	2.3%	1.1%	191	30.2%	3.5%	81	1.0%	0.8%	199	22.5%	1.4%	90	14.9%	3.7%
	(再掲)65～74歳	101	0.0%	0.0%	51	17.0%	5.9%	20	0.0%	0.0%	56	15.9%	5.3%	24	15.9%	6.8%
	(再掲)75歳以上	85	0.8%	0.8%	14	13.1%	12.9%	9	0.0%	0.0%	33	12.9%	5.3%	10	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	333	3.0%	1.4%	191	32.7%	3.6%	81	1.4%	1.2%	199	24.6%	1.8%	90	16.3%	4.0%
	(再掲)20～49歳※1	88	4.0%	2.4%	73	40.5%	6.1%	34	2.4%	2.0%	64	27.8%	5.3%	36	13.8%	4.5%
	(再掲)65～74歳※1	101	0.0%	0.0%	51	16.8%	5.9%	20	0.0%	0.0%	56	15.6%	5.2%	24	15.2%	6.6%
	(再掲)75歳以上※1	85	0.8%	0.8%	14	13.1%	12.9%	9	0.0%	0.0%	33	12.9%	5.3%	10	0.0%	0.0%
女性	20～29歳	29	4.3%	3.7%	22	20.7%	12.1%	11	0.0%	0.0%	25	13.8%	6.4%	10	0.0%	0.0%
	30～39歳	36	9.3%	5.8%	30	5.1%	4.2%	8	0.0%	0.0%	29	12.5%	7.5%	11	16.3%	15.6%
	40～49歳	48	5.7%	3.0%	41	6.9%	3.2%	21	0.0%	0.0%	38	3.5%	2.9%	17	17.7%	9.8%
	50～59歳	51	8.1%	3.4%	46	17.9%	4.7%	14	0.0%	0.0%	37	14.7%	5.8%	9	0.0%	0.0%
	60～69歳	102	9.5%	2.8%	60	11.7%	2.8%	22	0.0%	0.0%	59	12.5%	3.4%	18	0.0%	0.0%
	70歳以上	181	1.7%	0.8%	46	4.9%	2.7%	28	0.0%	0.0%	83	7.6%	2.5%	29	3.5%	3.4%
	(再掲)20歳以上	447	5.6%	1.3%	245	10.6%	1.2%	104	0.0%	0.0%	271	10.0%	2.0%	94	6.5%	2.6%
	(再掲)65～74歳	123	5.2%	2.4%	54	7.5%	3.5%	28	0.0%	0.0%	72	9.7%	3.9%	29	3.7%	3.5%
	(再掲)75歳以上	108	0.6%	0.6%	15	0.0%	0.0%	9	0.0%	0.0%	38	8.8%	4.7%	9	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	447	5.6%	1.3%	245	11.3%	1.8%	104	0.0%	0.0%	271	10.1%	2.1%	94	7.1%	3.0%
	(再掲)20～49歳※1	113	6.4%	2.2%	93	9.9%	3.3%	40	0.0%	0.0%	92	9.2%	3.3%	38	11.5%	5.6%
	(再掲)65～74歳※1	123	4.9%	2.2%	54	7.5%	3.4%	28	0.0%	0.0%	72	9.2%	3.7%	29	4.0%	3.7%
	(再掲)75歳以上※1	108	0.6%	0.6%	15	0.0%	0.0%	9	0.0%	0.0%	38	8.8%	4.7%	9	0.0%	0.0%

注1) 調査票No.1の問9について回答した者のうち、当該施設に「行かなかった」者、喫煙者を除いて、家庭は毎日、その他の施設は月に1回以上の受動喫煙の機会があったものを集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問9:
あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。
ア 家庭 イ 職場 ウ 学校 エ 飲食店 オ 遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など) カ 行政機関(市役所、町村役場、公民館など) キ 医療機関
ク 公共交通機関 ケ 路上 コ 子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)

性年齢	人数	カ 行政機関 (市役所、町村役場、 公民館など)		人数	キ 医療機関		人数	ク 公共交通機関		人数	ケ 路上		人数	コ 子どもが利用する屋 外の空間(公園、通 学路など)		
		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差	
総数	20～29歳	20	1.5%	1.5%	26	1.2%	1.2%	27	2.2%	2.3%	38	22.1%	8.7%	21	6.3%	5.8%
	30～39歳	35	1.4%	1.6%	42	0.0%	0.0%	31	5.9%	5.1%	56	27.1%	5.2%	49	4.0%	2.7%
	40～49歳	53	0.0%	0.0%	72	1.9%	1.3%	42	0.6%	0.7%	81	23.3%	6.3%	60	12.7%	4.4%
	50～59歳	46	2.3%	1.8%	56	0.0%	0.0%	38	7.4%	4.5%	78	25.4%	6.5%	47	6.8%	3.6%
	60～69歳	87	4.5%	2.0%	133	8.9%	2.1%	61	7.8%	3.9%	139	17.8%	3.0%	83	3.9%	2.3%
	70歳以上	128	2.7%	1.5%	251	4.8%	1.2%	72	0.0%	0.0%	235	8.6%	2.9%	123	3.8%	1.7%
	(再掲)20歳以上	369	2.5%	0.8%	580	4.4%	0.8%	271	3.9%	1.0%	627	17.4%	1.7%	383	5.9%	0.9%
	(再掲)65～74歳	117	5.3%	2.0%	188	7.1%	1.9%	71	3.2%	2.1%	185	12.0%	1.6%	109	1.8%	1.7%
	(再掲)75歳以上	59	2.5%	2.1%	139	3.6%	1.4%	34	0.0%	0.0%	129	9.6%	4.9%	63	5.4%	3.0%
	(再掲)20歳以上※1	369	2.2%	0.7%	580	3.6%	0.7%	271	3.7%	1.1%	627	19.2%	2.0%	383	6.3%	0.9%
	(再掲)20～49歳※1	108	0.8%	0.9%	140	1.2%	0.7%	100	2.9%	2.1%	175	24.4%	2.8%	130	8.2%	2.3%
	(再掲)65～74歳※1	117	5.1%	2.0%	188	6.7%	1.8%	71	2.7%	1.8%	185	11.7%	1.6%	109	1.6%	1.5%
	(再掲)75歳以上※1	59	2.3%	1.9%	139	3.7%	1.5%	34	0.0%	0.0%	129	9.7%	5.1%	63	5.3%	2.9%
男性	20～29歳	6	0.0%	0.0%	8	0.0%	0.0%	11	2.2%	2.5%	14	24.4%	15.3%	10	12.0%	10.5%
	30～39歳	14	1.8%	2.0%	15	0.0%	0.0%	14	13.0%	11.3%	21	43.3%	15.2%	20	8.7%	6.4%
	40～49歳	27	0.0%	0.0%	32	2.6%	2.4%	22	0.0%	0.0%	35	21.4%	8.1%	27	6.1%	5.2%
	50～59歳	23	4.5%	3.7%	21	0.0%	0.0%	19	16.6%	8.7%	34	26.6%	9.5%	21	7.0%	5.5%
	60～69歳	35	8.4%	4.5%	56	8.1%	2.7%	28	1.9%	2.0%	61	28.8%	4.3%	38	5.2%	3.5%
	70歳以上	54	6.0%	3.3%	116	6.8%	2.2%	32	0.0%	0.0%	106	9.4%	3.3%	63	5.5%	2.9%
	(再掲)20歳以上	159	4.5%	1.4%	248	5.2%	1.2%	126	4.4%	1.8%	271	21.2%	2.3%	179	6.5%	1.6%
	(再掲)65～74歳	52	9.5%	3.8%	89	9.5%	3.1%	33	0.0%	0.0%	88	15.4%	1.9%	56	1.6%	1.6%
	(再掲)75歳以上	26	5.1%	4.2%	65	2.3%	1.7%	17	0.0%	0.0%	59	8.4%	3.4%	33	7.3%	4.9%
	(再掲)20歳以上※1	159	3.8%	1.2%	248	4.4%	1.0%	126	5.2%	2.1%	271	23.1%	2.8%	179	7.0%	1.6%
	(再掲)20～49歳※1	47	0.5%	0.6%	55	1.4%	1.3%	47	4.5%	3.6%	70	28.6%	4.8%	57	8.4%	2.9%
	(再掲)65～74歳※1	52	9.7%	4.0%	89	9.3%	3.1%	33	0.0%	0.0%	88	15.7%	1.8%	56	1.5%	1.5%
	(再掲)75歳以上※1	26	5.1%	4.2%	65	2.3%	1.7%	17	0.0%	0.0%	59	8.4%	3.4%	33	7.3%	4.9%
女性	20～29歳	14	2.5%	2.5%	18	1.9%	1.9%	16	2.2%	2.1%	24	20.4%	10.6%	11	0.0%	0.0%
	30～39歳	21	1.2%	1.3%	27	0.0%	0.0%	17	0.0%	0.0%	35	18.0%	5.9%	29	0.8%	0.9%
	40～49歳	26	0.0%	0.0%	40	1.3%	1.4%	20	1.4%	1.5%	46	24.7%	6.0%	33	18.1%	5.3%
	50～59歳	23	0.0%	0.0%	35	0.0%	0.0%	19	0.0%	0.0%	44	24.5%	5.8%	26	6.6%	5.4%
	60～69歳	52	1.8%	1.7%	77	9.4%	3.1%	33	13.1%	6.2%	78	9.4%	3.0%	45	2.7%	2.0%
	70歳以上	74	0.0%	0.0%	135	3.0%	1.4%	40	0.0%	0.0%	129	8.0%	4.2%	60	1.9%	1.9%
	(再掲)20歳以上	210	0.8%	0.5%	332	3.7%	1.1%	145	3.4%	1.6%	356	14.6%	2.6%	204	5.3%	1.1%
	(再掲)65～74歳	65	1.6%	1.4%	99	4.9%	1.8%	38	6.3%	4.1%	97	8.8%	2.4%	53	1.9%	1.8%
	(再掲)75歳以上	33	0.0%	0.0%	74	4.8%	2.4%	17	0.0%	0.0%	70	10.6%	6.9%	30	3.4%	3.6%
	(再掲)20歳以上※1	210	0.7%	0.5%	332	2.9%	0.9%	145	2.4%	1.1%	356	16.2%	2.8%	204	5.7%	1.2%
	(再掲)20～49歳※1	61	1.1%	1.1%	85	1.0%	0.8%	53	1.2%	1.2%	105	21.4%	4.0%	73	8.1%	2.4%
	(再掲)65～74歳※1	65	1.3%	1.2%	99	4.3%	1.5%	38	5.3%	3.5%	97	8.1%	2.4%	53	1.6%	1.5%
	(再掲)75歳以上※1	33	0.0%	0.0%	74	4.8%	2.4%	17	0.0%	0.0%	70	10.6%	6.9%	30	3.4%	3.6%

表73 飲酒日の1日当たりの飲酒量一年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性・20歳以上

性年齢	総数	1台未満		1台以上2台未満		2台以上3台未満		3台以上4台未満		4台以上5台未満		5台以上	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
20～29歳	23	43.6%	11.3%	35.6%	14.5%	19.2%	6.8%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	29	31.2%	8.7%	51.9%	12.8%	16.9%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40～49歳	50	25.2%	7.2%	44.0%	6.3%	24.0%	4.8%	2.8%	2.8%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%
50～59歳	53	30.3%	4.1%	37.8%	8.3%	19.1%	4.0%	4.4%	4.4%	0.0%	0.0%	5.1%	3.5%
60～69歳	76	45.7%	4.3%	31.3%	5.3%	19.1%	4.4%	3.9%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
70歳以上	114	64.9%	4.2%	28.8%	3.2%	4.6%	3.0%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)20歳以上	345	44.6%	2.5%	35.6%	3.2%	15.2%	1.9%	3.5%	1.3%	0.3%	0.3%	0.9%	0.6%
(再掲)65～74歳	99	51.7%	4.2%	33.0%	5.5%	12.5%	3.0%	2.8%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)75歳以上	57	71.6%	4.0%	25.5%	1.4%	1.4%	1.2%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)20歳以上※1	345	41.5%	2.8%	36.8%	2.3%	16.7%	2.3%	3.6%	1.4%	0.3%	0.3%	1.0%	0.7%
(再掲)20～49歳※1	102	30.8%	4.8%	44.3%	6.0%	21.4%	4.8%	2.8%	1.8%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳※1	99	52.7%	4.2%	32.0%	5.3%	12.7%	3.0%	1.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)75歳以上※1	57	72.9%	3.8%	24.3%	2.7%	1.3%	1.1%	1.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20～29歳	10	30.6%	20.8%	44.6%	23.9%	24.8%	15.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	18	24.8%	10.4%	51.0%	18.6%	24.1%	11.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40～49歳	27	23.0%	8.6%	35.7%	8.0%	31.8%	8.0%	9.5%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
50～59歳	33	25.1%	5.9%	33.6%	7.3%	25.6%	6.8%	7.3%	6.0%	0.0%	0.0%	8.3%	5.9%
60～69歳	47	38.2%	4.2%	33.5%	5.4%	28.3%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
70歳以上	83	52.8%	3.9%	38.5%	4.4%	4.4%	4.1%	2.3%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)20歳以上	218	38.1%	3.2%	37.4%	3.3%	19.9%	3.0%	3.2%	1.2%	0.0%	0.0%	1.4%	0.9%
(再掲)65～74歳	71	42.5%	5.7%	38.9%	7.3%	17.4%	4.3%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)75歳以上	41	62.3%	5.6%	33.5%	4.6%	2.0%	1.6%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)20歳以上※1	218	34.9%	3.8%	37.9%	4.0%	21.9%	3.7%	3.7%	1.4%	0.0%	0.0%	1.7%	1.2%
(再掲)20～49歳※1	55	25.1%	8.6%	42.4%	8.7%	28.0%	8.0%	4.6%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳※1	71	42.4%	5.9%	38.5%	7.2%	17.8%	4.3%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)75歳以上※1	41	62.3%	5.6%	33.5%	4.6%	2.0%	1.6%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20～29歳	13	57.3%	12.1%	26.1%	8.8%	13.2%	7.7%	3.4%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	11	39.2%	15.5%	53.0%	16.4%	7.8%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40～49歳	23	27.4%	8.5%	52.3%	7.6%	17.1%	7.9%	0.0%	0.0%	3.2%	3.4%	0.0%	0.0%
50～59歳	20	38.6%	10.9%	44.4%	12.3%	8.7%	6.1%	8.2%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
60～69歳	29	60.4%	8.0%	26.9%	8.6%	1.1%	1.1%	11.6%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
70歳以上	31	95.7%	3.2%	4.3%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)20歳以上	127	55.6%	4.7%	32.6%	4.9%	7.1%	2.2%	4.0%	2.5%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳	28	75.1%	6.6%	18.2%	8.2%	0.0%	0.0%	6.7%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)75歳以上	16	93.8%	5.4%	6.2%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)20歳以上※1	127	52.1%	4.9%	35.2%	4.9%	8.5%	2.6%	3.5%	2.2%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%
(再掲)20～49歳※1	47	37.2%	7.2%	46.4%	6.5%	13.9%	4.4%	4.4%	0.8%	1.7%	1.7%	0.0%	0.0%
(再掲)65～74歳※1	28	78.4%	5.7%	15.8%	7.2%	0.0%	0.0%	5.8%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(再掲)75歳以上※1	16	93.8%	5.4%	6.2%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

注1) 調査票No.1の間10、及び間10で月に1～3回以上飲酒すると回答した場合は間10-1にも回答している者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問10:

あなたは週に何日お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

No.1 問10-1:

お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表74 飲酒習慣の状況—年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	飲酒習慣あり		
		割合	標準誤差	
総数	20～29歳	58	4.5%	2.8%
	30～39歳	78	10.3%	4.4%
	40～49歳	117	23.8%	6.7%
	50～59歳	115	26.7%	4.9%
	60～69歳	191	18.6%	2.4%
	70歳以上	344	10.8%	1.3%
	(再掲)20歳以上	903	15.9%	0.9%
	(再掲)65～74歳	254	17.5%	2.0%
	(再掲)75歳以上	200	8.1%	1.3%
	(再掲)20歳以上※1	903	15.9%	1.1%
	(再掲)20～49歳※1	253	14.5%	2.4%
	(再掲)65～74歳※1	254	17.1%	1.9%
	(再掲)75歳以上※1	200	7.3%	1.2%
男性	20～29歳	28	7.4%	5.3%
	30～39歳	40	8.5%	3.7%
	40～49歳	59	29.1%	8.3%
	50～59歳	57	37.0%	4.8%
	60～69歳	83	31.0%	3.6%
	70歳以上	159	21.6%	2.8%
	(再掲)20歳以上	426	24.4%	1.2%
	(再掲)65～74歳	126	30.1%	2.4%
	(再掲)75歳以上	89	16.0%	3.3%
	(再掲)20歳以上※1	426	23.6%	1.2%
	(再掲)20～49歳※1	127	16.8%	3.0%
	(再掲)65～74歳※1	126	30.2%	2.4%
	(再掲)75歳以上※1	89	16.0%	3.3%
女性	20～29歳	30	1.1%	1.1%
	30～39歳	38	12.0%	6.8%
	40～49歳	58	18.5%	6.1%
	50～59歳	58	16.0%	6.4%
	60～69歳	108	8.7%	2.3%
	70歳以上	185	0.8%	0.6%
	(再掲)20歳以上	477	7.9%	1.7%
	(再掲)65～74歳	128	4.8%	1.8%
	(再掲)75歳以上	111	1.0%	1.0%
	(再掲)20歳以上※1	477	8.5%	1.9%
	(再掲)20～49歳※1	126	11.9%	2.4%
	(再掲)65～74歳※1	128	4.1%	1.5%
	(再掲)75歳以上※1	111	1.0%	1.0%

注1) 調査票No.1の問10(飲酒の頻度)、および問10で月に1～3回以上飲酒すると回答した場合は問10-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。

注2) 「飲酒習慣のある者」とは週に3回以上飲酒し、飲酒日1日あたり1合以上を飲酒すると回答した者。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表75 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合-年齢階級別、割合、標準誤差-総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		総数	生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の割合		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者の割合	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	58	0.5%	0.5%	99.5%	0.5%
	30～39歳	78	6.8%	3.4%	93.2%	3.4%
	40～49歳	117	15.1%	4.5%	84.9%	4.5%
	50～59歳	115	18.9%	3.8%	81.1%	3.8%
	60～69歳	191	11.8%	2.1%	88.2%	2.1%
	70歳以上	344	2.6%	1.1%	97.4%	1.1%
	(再掲)20歳以上	903	8.7%	0.9%	91.3%	0.9%
	(再掲)65～74歳	254	7.6%	2.1%	92.4%	2.1%
	(再掲)75歳以上	200	1.5%	0.7%	98.5%	0.7%
	(再掲)20歳以上※1	903	9.0%	1.0%	91.0%	1.0%
	(再掲)20～49歳※1	253	8.4%	1.6%	91.6%	1.6%
	(再掲)65～74歳※1	254	7.4%	2.0%	92.6%	2.0%
(再掲)75歳以上※1	200	1.4%	0.7%	98.6%	0.7%	
男性	20～29歳	28	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	40	1.3%	1.4%	98.7%	1.4%
	40～49歳	59	10.1%	4.6%	89.9%	4.6%
	50～59歳	57	21.8%	6.6%	78.2%	6.6%
	60～69歳	83	15.6%	3.7%	84.4%	3.7%
	70歳以上	159	4.5%	2.3%	95.5%	2.3%
	(再掲)20歳以上	426	9.3%	1.6%	90.7%	1.6%
	(再掲)65～74歳	126	10.5%	2.8%	89.5%	2.8%
	(再掲)75歳以上	89	1.9%	1.3%	98.1%	1.3%
	(再掲)20歳以上※1	426	9.2%	1.7%	90.8%	1.7%
	(再掲)20～49歳※1	127	4.7%	2.0%	95.3%	2.0%
	(再掲)65～74歳※1	126	10.7%	2.8%	89.3%	2.8%
(再掲)75歳以上※1	89	1.9%	1.3%	98.1%	1.3%	
女性	20～29歳	30	1.1%	1.1%	98.9%	1.1%
	30～39歳	38	12.0%	6.8%	88.0%	6.8%
	40～49歳	58	20.0%	5.9%	80.0%	5.9%
	50～59歳	58	16.0%	6.4%	84.0%	6.4%
	60～69歳	108	8.7%	2.3%	91.3%	2.3%
	70歳以上	185	0.8%	0.6%	99.2%	0.6%
	(再掲)20歳以上	477	8.1%	1.6%	91.9%	1.6%
	(再掲)65～74歳	128	4.8%	1.8%	95.2%	1.8%
	(再掲)75歳以上	111	1.0%	1.0%	99.0%	1.0%
	(再掲)20歳以上※1	477	8.7%	1.8%	91.3%	1.8%
	(再掲)20～49歳※1	126	12.6%	2.2%	87.4%	2.2%
	(再掲)65～74歳※1	128	4.1%	1.5%	95.9%	1.5%
(再掲)75歳以上※1	111	1.0%	1.0%	99.0%	1.0%	

注1) 調査票No.1の問10(飲酒の頻度)、および問10で月に1～3回以上飲酒すると回答した場合は問10-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

- ①男性:「毎日×2合以上」+「週5-6日×2合以上」+「週3-4日×3合以上」+「週1-2日×5合以上」+「月1-3日×5合以上」
- ②女性:「毎日×1合以上」+「週5-6日×1合以上」+「週3-4日×1合以上」+「週1-2日×3合以上」+「月1-3日×5合以上」

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表76 歯科検診受診—この1年間における歯科検診の受診状況、年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上

	性年齢	総数	検診あり	
			割合	標準誤差
総数	20～29歳	58	33.3%	3.4%
	30～39歳	78	56.1%	7.0%
	40～49歳	117	45.1%	6.7%
	50～59歳	115	57.6%	2.7%
	60～69歳	191	63.7%	4.8%
	70歳以上	345	59.8%	3.2%
	(再掲)20歳以上	904	56.4%	2.5%
	(再掲)65～74歳	255	56.2%	5.0%
	(再掲)75歳以上	200	61.1%	3.3%
	(再掲)20歳以上※1	904	54.2%	2.5%
	(再掲)20～49歳※1	253	45.0%	3.9%
	(再掲)65～74歳※1	255	56.5%	5.1%
	(再掲)75歳以上※1	200	61.2%	3.3%
男性	20～29歳	28	34.9%	5.7%
	30～39歳	40	44.1%	8.5%
	40～49歳	59	37.3%	9.9%
	50～59歳	57	55.5%	4.7%
	60～69歳	84	60.8%	5.7%
	70歳以上	160	56.4%	3.7%
	(再掲)20歳以上	428	51.8%	2.0%
	(再掲)65～74歳	127	51.0%	4.8%
	(再掲)75歳以上	89	60.3%	5.4%
	(再掲)20歳以上※1	428	49.5%	2.2%
	(再掲)20～49歳※1	127	38.7%	4.8%
	(再掲)65～74歳※1	127	51.0%	5.0%
	(再掲)75歳以上※1	89	60.3%	5.4%
女性	20～29歳	30	31.4%	7.5%
	30～39歳	38	67.6%	9.0%
	40～49歳	58	53.0%	4.2%
	50～59歳	58	59.8%	6.6%
	60～69歳	107	66.0%	6.4%
	70歳以上	185	63.0%	4.7%
	(再掲)20歳以上	476	60.7%	3.6%
	(再掲)65～74歳	128	61.5%	7.7%
	(再掲)75歳以上	111	61.8%	4.8%
	(再掲)20歳以上※1	476	58.7%	3.6%
	(再掲)20～49歳※1	126	51.7%	4.5%
	(再掲)65～74歳※1	128	62.0%	7.9%
	(再掲)75歳以上※1	111	61.8%	4.8%

注1) 調査票No.1の問12に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問12:

あなたはこの1年間に、歯科検診を受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表77 睡眠による休養の状況－睡眠による休養の状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、10歳以上

性年齢		総数	充分とれている・まあまあとれている		あまりとれていない・まったくとれていない	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	10-14歳	24	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15-19歳	37	76.1%	4.2%	23.9%	4.2%
	20～29歳	58	85.1%	6.5%	14.9%	6.5%
	30～39歳	78	77.4%	3.8%	22.6%	3.8%
	40～49歳	117	72.8%	4.3%	27.2%	4.3%
	50～59歳	115	65.6%	4.6%	34.4%	4.6%
	60～69歳	192	82.2%	2.5%	17.8%	2.5%
	70歳以上	345	89.8%	2.0%	10.2%	2.0%
	(再掲)20歳以上	905	81.2%	1.3%	18.8%	1.3%
	(再掲)65～74歳	255	87.9%	1.7%	12.1%	1.7%
	(再掲)75歳以上	200	90.1%	2.8%	9.9%	2.8%
	(再掲)20歳以上※1	905	80.0%	1.4%	20.0%	1.4%
	(再掲)20～49歳※1	253	77.7%	1.7%	22.3%	1.7%
	(再掲)65～74歳※1	255	88.2%	1.6%	11.8%	1.6%
	(再掲)75歳以上※1	200	90.2%	2.6%	9.8%	2.6%
男性	10-14歳	12	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15-19歳	17	65.1%	7.6%	34.9%	7.6%
	20～29歳	28	83.2%	7.8%	16.8%	7.8%
	30～39歳	40	81.3%	5.6%	18.7%	5.6%
	40～49歳	59	83.8%	5.1%	16.2%	5.1%
	50～59歳	57	67.6%	6.6%	32.4%	6.6%
	60～69歳	84	83.7%	2.9%	16.3%	2.9%
	70歳以上	160	87.5%	4.0%	12.5%	4.0%
	(再掲)20歳以上	428	82.6%	2.0%	17.4%	2.0%
	(再掲)65～74歳	127	85.4%	2.1%	14.6%	2.1%
	(再掲)75歳以上	89	89.5%	5.4%	10.5%	5.4%
	(再掲)20歳以上※1	428	81.6%	1.9%	18.4%	1.9%
	(再掲)20～49歳※1	127	82.9%	2.3%	17.1%	2.3%
	(再掲)65～74歳※1	127	85.4%	2.0%	14.6%	2.0%
	(再掲)75歳以上※1	89	89.5%	5.4%	10.5%	5.4%
女性	10-14歳	12	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15-19歳	20	85.7%	8.3%	14.3%	8.3%
	20～29歳	30	87.3%	6.6%	12.7%	6.6%
	30～39歳	38	73.7%	4.1%	26.3%	4.1%
	40～49歳	58	61.8%	6.1%	38.2%	6.1%
	50～59歳	58	63.5%	5.7%	36.5%	5.7%
	60～69歳	108	81.0%	3.6%	19.0%	3.6%
	70歳以上	185	91.9%	1.3%	8.1%	1.3%
	(再掲)20歳以上	477	79.9%	1.8%	20.1%	1.8%
	(再掲)65～74歳	128	90.5%	2.8%	9.5%	2.8%
	(再掲)75歳以上※1	111	90.6%	2.2%	9.4%	2.2%
	(再掲)20歳以上※1	477	78.5%	1.9%	21.5%	1.9%
	(再掲)20～49歳※1	126	72.2%	2.7%	27.8%	2.7%
	(再掲)65～74歳※1	128	91.0%	2.6%	9.0%	2.6%
	(再掲)75歳以上※1	111	90.6%	2.2%	9.4%	2.2%

注1) 調査票No.1の問14、又はNo.3の問7に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問14、No.3 問7:

ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表78 高齢者の社会活動の状況－社会活動の実施の有無、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、60歳以上

	性年齢	人数	働いている・何らかの活動を行っている		いずれも行っていない	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	60～69歳	189	68.3%	3.5%	31.7%	3.5%
	70歳以上	345	41.7%	3.1%	58.3%	3.1%
	(再掲)60歳以上	534	51.4%	2.3%	48.6%	2.3%
	(再掲)65～74歳	254	56.8%	3.1%	43.2%	3.1%
	(再掲)75歳以上	200	33.2%	4.1%	66.8%	4.1%
	(再掲)60歳以上※1	534	50.6%	2.3%	49.4%	2.3%
	(再掲)65～74歳※1	254	56.7%	3.1%	43.3%	3.1%
	(再掲)75歳以上※1	200	32.7%	4.1%	67.3%	4.1%
男性	60～69歳	82	70.1%	4.0%	29.9%	4.0%
	70歳以上	160	47.4%	4.5%	52.6%	4.5%
	(再掲)60歳以上	242	55.2%	3.7%	44.8%	3.7%
	(再掲)65～74歳	126	62.5%	4.6%	37.5%	4.6%
	(再掲)75歳以上	89	38.6%	5.8%	61.4%	5.8%
	(再掲)60歳以上※1	242	55.9%	3.7%	44.1%	3.7%
	(再掲)65～74歳※1	126	62.7%	4.4%	37.3%	4.4%
	(再掲)75歳以上※1	89	38.6%	5.8%	61.4%	5.8%
女性	60～69歳	107	66.8%	4.6%	33.2%	4.6%
	70歳以上	185	36.5%	3.6%	63.5%	3.6%
	(再掲)60歳以上	292	48.1%	2.9%	51.9%	2.9%
	(再掲)65～74歳	128	51.1%	3.6%	48.9%	3.6%
	(再掲)75歳以上	111	28.4%	4.8%	71.6%	4.8%
	(再掲)60歳以上※1	292	46.1%	2.9%	53.9%	2.9%
	(再掲)65～74歳※1	128	50.7%	3.3%	49.3%	3.3%
	(再掲)75歳以上※1	111	28.4%	4.8%	71.6%	4.8%

注1) 調査票No.1の問17に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問17:

あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動(町内会、地域行事など)、趣味やおけいこ事を行っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。 ※60歳以上の方のみ回答

表79 健康づくりに関係したボランティア活動の実施状況－ボランティア活動の種類、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	1. 食生活などの生活習慣の改善のための活動		2. スポーツ・文化・芸術に関係した活動		3. まちづくりのための活動		4. 子どもを対象とした活動		5. 高齢者を対象とした活動		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	58	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	3.9%	3.1%	0.5%	0.5%
	30～39歳	75	0.0%	0.0%	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	2.1%	1.6%	0.0%	0.0%
	40～49歳	115	0.0%	0.0%	5.2%	3.3%	0.0%	0.0%	4.8%	2.3%	1.5%	1.4%
	50～59歳	115	0.8%	0.8%	3.6%	1.7%	2.9%	1.5%	4.3%	1.6%	0.5%	0.5%
	60～69歳	190	0.3%	0.3%	6.1%	2.5%	2.2%	1.0%	2.0%	0.7%	4.5%	1.9%
	70歳以上	345	1.6%	0.6%	6.3%	1.0%	4.5%	1.7%	3.3%	1.0%	5.5%	1.6%
	(再掲)20歳以上	898	0.7%	0.3%	4.9%	0.7%	2.5%	0.8%	3.3%	0.5%	3.3%	1.0%
	(再掲)65～74歳	254	0.9%	0.5%	7.0%	2.3%	4.6%	1.9%	1.0%	0.4%	4.4%	1.3%
	(再掲)75歳以上	200	1.5%	0.9%	5.6%	1.2%	3.6%	1.5%	5.3%	1.6%	6.4%	2.4%
	(再掲)20歳以上※1	898	0.6%	0.2%	4.4%	0.7%	2.0%	0.7%	3.4%	0.6%	2.7%	0.8%
	(再掲)20～49歳※1	248	0.0%	0.0%	2.7%	1.5%	0.0%	0.0%	3.7%	1.5%	0.8%	0.6%
	(再掲)65～74歳※1	254	1.0%	0.5%	6.7%	2.2%	4.3%	1.8%	1.0%	0.5%	4.6%	1.3%
	(再掲)75歳以上※1	200	1.6%	1.0%	5.6%	1.1%	3.3%	1.3%	5.2%	1.6%	6.2%	2.3%
男性	20～29歳	28	0.0%	0.0%	0.9%	1.0%	0.0%	0.0%	6.2%	5.2%	0.0%	0.0%
	30～39歳	37	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.1%	0.0%	0.0%
	40～49歳	58	0.0%	0.0%	4.5%	2.4%	0.0%	0.0%	4.8%	2.5%	1.5%	1.4%
	50～59歳	57	0.0%	0.0%	3.1%	2.9%	4.2%	2.7%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%
	60～69歳	83	0.0%	0.0%	7.1%	4.4%	3.7%	2.3%	1.7%	1.3%	4.6%	2.6%
	70歳以上	160	1.1%	0.8%	8.5%	2.3%	8.5%	3.2%	3.6%	1.3%	5.7%	2.3%
	(再掲)20歳以上	423	0.4%	0.3%	5.6%	0.9%	4.4%	1.6%	3.1%	0.7%	3.2%	1.3%
	(再掲)65～74歳	126	0.7%	0.7%	9.5%	3.2%	7.9%	3.6%	1.2%	0.8%	3.6%	2.1%
	(再掲)75歳以上	89	0.9%	1.0%	6.0%	2.8%	6.4%	2.8%	6.4%	2.0%	8.5%	3.5%
	(再掲)20歳以上※1	423	0.3%	0.2%	4.7%	0.7%	3.5%	1.3%	3.2%	0.8%	2.4%	1.0%
	(再掲)20～49歳※1	123	0.0%	0.0%	2.2%	1.2%	0.0%	0.0%	4.6%	2.2%	0.6%	0.6%
	(再掲)65～74歳※1	126	0.7%	0.6%	9.3%	3.2%	7.7%	3.5%	1.2%	0.9%	3.8%	2.2%
	(再掲)75歳以上※1	89	0.9%	1.0%	6.0%	2.8%	6.4%	2.8%	6.4%	2.0%	8.5%	3.5%
女性	20～29歳	30	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
	30～39歳	38	0.0%	0.0%	2.7%	2.6%	0.0%	0.0%	1.3%	1.4%	0.0%	0.0%
	40～49歳	57	0.0%	0.0%	6.0%	4.5%	0.0%	0.0%	4.8%	3.0%	1.5%	1.5%
	50～59歳	58	1.5%	1.5%	4.1%	2.9%	1.5%	1.5%	8.2%	3.4%	0.9%	1.0%
	60～69歳	107	0.5%	0.6%	5.3%	2.5%	1.1%	1.0%	2.3%	1.3%	4.5%	2.0%
	70歳以上	185	2.0%	1.1%	4.3%	1.4%	0.8%	0.6%	3.1%	1.3%	5.3%	1.5%
	(再掲)20歳以上	475	1.1%	0.5%	4.3%	1.0%	0.8%	0.3%	3.5%	0.9%	3.4%	1.0%
	(再掲)65～74歳	128	1.1%	0.9%	4.4%	2.2%	1.2%	0.8%	0.7%	0.7%	5.3%	1.6%
	(再掲)75歳以上	111	2.1%	1.6%	5.3%	1.9%	1.1%	0.8%	4.2%	2.0%	4.6%	2.0%
	(再掲)20歳以上※1	475	1.0%	0.4%	4.1%	1.1%	0.7%	0.3%	3.6%	0.9%	2.9%	0.9%
	(再掲)20～49歳※1	125	0.0%	0.0%	3.4%	2.1%	0.0%	0.0%	2.7%	1.4%	0.9%	0.7%
	(再掲)65～74歳※1	128	1.2%	1.0%	4.1%	2.0%	1.1%	0.7%	0.8%	0.8%	5.4%	1.7%
	(再掲)75歳以上※1	111	2.1%	1.6%	5.3%	1.9%	1.1%	0.8%	4.2%	2.0%	4.6%	2.0%

注1) 調査票No.1の問15に回答した者を集計対象とした。再掲は9を回答した者を除いた割合である。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.1 問15:

あなたがこの1年間に行ったボランティア活動(近隣の人への手助け・支援を含む)のうち、健康づくりに関係したものはありますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。

性年齢	6. 防犯・防災に関係した活動		7. 自然や環境を守るための活動		8. 上記以外の活動		9. 健康づくりに関係したものはない・ボランティア活動はしていない		(再掲)健康づくりに関係した何らかのボランティア活動をしている(9. 除く)		
	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	1.9%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	93.6%	3.1%	6.4%	3.1%
	30～39歳	1.3%	1.2%	2.9%	1.9%	0.0%	0.0%	92.7%	2.0%	7.3%	2.0%
	40～49歳	2.5%	1.6%	2.8%	1.7%	2.2%	1.4%	85.0%	4.5%	15.0%	4.5%
	50～59歳	0.0%	0.0%	4.1%	1.6%	2.3%	1.2%	86.6%	2.3%	13.4%	2.3%
	60～69歳	0.9%	0.9%	4.3%	1.7%	1.6%	0.8%	81.4%	3.7%	18.6%	3.7%
	70歳以上	2.6%	0.7%	5.4%	1.8%	3.1%	0.8%	80.9%	2.9%	19.1%	2.9%
	(再掲)20歳以上	1.7%	0.4%	4.1%	0.9%	2.1%	0.4%	84.2%	2.0%	15.8%	2.0%
	(再掲)65～74歳	1.6%	0.9%	5.1%	2.0%	3.7%	1.2%	81.4%	3.1%	18.6%	3.1%
	(再掲)75歳以上	3.1%	1.0%	4.3%	1.6%	1.9%	1.0%	81.9%	3.2%	18.1%	3.2%
	(再掲)20歳以上※1	1.6%	0.4%	3.7%	0.7%	1.9%	0.3%	85.5%	1.6%	14.5%	1.6%
	(再掲)20～49歳※1	2.0%	1.0%	2.1%	0.8%	1.0%	0.6%	89.6%	1.7%	10.4%	1.7%
	(再掲)65～74歳※1	1.6%	0.8%	4.9%	1.9%	3.8%	1.3%	81.6%	3.1%	18.4%	3.1%
	(再掲)75歳以上※1	3.0%	1.0%	4.1%	1.5%	1.8%	1.0%	82.3%	3.1%	17.7%	3.1%
男性	20～29歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	92.8%	5.1%	7.2%	5.1%
	30～39歳	2.7%	2.4%	5.4%	4.2%	0.0%	0.0%	88.9%	4.4%	11.1%	4.4%
	40～49歳	1.5%	1.4%	2.4%	1.6%	2.5%	2.4%	87.3%	4.8%	12.7%	4.8%
	50～59歳	0.0%	0.0%	7.0%	2.9%	3.1%	2.0%	84.5%	4.1%	15.5%	4.1%
	60～69歳	1.0%	1.0%	6.0%	2.9%	1.7%	1.2%	80.6%	4.6%	19.4%	4.6%
	70歳以上	3.3%	1.2%	8.4%	3.4%	3.5%	1.4%	76.8%	4.5%	23.2%	4.5%
	(再掲)20歳以上	1.9%	0.6%	6.1%	1.6%	2.4%	0.6%	82.3%	2.3%	17.7%	2.3%
	(再掲)65～74歳	2.2%	1.1%	7.0%	3.4%	3.9%	1.7%	79.0%	4.5%	21.0%	4.5%
	(再掲)75歳以上	3.8%	2.0%	6.3%	2.9%	2.5%	1.8%	78.6%	5.5%	21.4%	5.5%
	(再掲)20歳以上※1	1.6%	0.5%	5.4%	1.2%	2.1%	0.5%	83.9%	1.9%	16.1%	1.9%
	(再掲)20～49歳※1	1.4%	0.9%	2.6%	1.3%	1.1%	1.0%	89.3%	2.5%	10.7%	2.5%
	(再掲)65～74歳※1	2.1%	1.1%	6.7%	3.3%	3.8%	1.6%	79.3%	4.5%	20.7%	4.5%
	(再掲)75歳以上※1	3.8%	2.0%	6.3%	2.9%	2.5%	1.8%	78.6%	5.5%	21.4%	5.5%
女性	20～29歳	4.3%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.6%	3.6%	5.4%	3.6%
	30～39歳	0.0%	0.0%	0.6%	0.7%	0.0%	0.0%	96.1%	2.9%	3.9%	2.9%
	40～49歳	3.5%	2.3%	3.1%	3.1%	1.9%	1.9%	82.6%	5.3%	17.4%	5.3%
	50～59歳	0.0%	0.0%	1.2%	1.2%	1.4%	1.5%	88.7%	3.6%	11.3%	3.6%
	60～69歳	0.8%	0.8%	3.0%	1.8%	1.6%	1.1%	82.0%	3.9%	18.0%	3.9%
	70歳以上	1.8%	1.1%	2.6%	1.1%	2.8%	1.1%	84.7%	2.5%	15.3%	2.5%
	(再掲)20歳以上	1.5%	0.5%	2.2%	0.6%	1.8%	0.5%	86.0%	2.1%	14.0%	2.1%
	(再掲)65～74歳	1.1%	0.9%	3.0%	1.4%	3.6%	1.7%	83.9%	3.0%	16.1%	3.0%
	(再掲)75歳以上	2.5%	1.7%	2.4%	1.4%	1.3%	1.0%	84.9%	2.9%	15.1%	2.9%
	(再掲)20歳以上※1	1.7%	0.5%	2.0%	0.6%	1.6%	0.5%	86.9%	2.0%	13.1%	2.0%
	(再掲)20～49歳※1	2.6%	1.3%	1.5%	1.4%	0.8%	0.8%	90.0%	2.5%	10.0%	2.5%
	(再掲)65～74歳※1	1.1%	0.8%	3.0%	1.3%	3.8%	1.9%	83.9%	2.8%	16.1%	2.8%
	(再掲)75歳以上※1	2.5%	1.7%	2.4%	1.4%	1.3%	1.0%	84.9%	2.9%	15.1%	2.9%

表80 朝食の欠食の状況－朝食の欠食の状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性－10歳以上

性年齢	人数	ほとんど毎日食べる		週2-3日食べない		週4-5日食べない		ほとんど食べない		(再掲) 週4-5日・ ほとんど食べない		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	10-14歳	24	87.8%	8.3%	8.5%	5.5%	0.0%	0.0%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%
	15-19歳	37	86.5%	5.1%	9.7%	5.9%	3.8%	3.1%	0.0%	0.0%	3.8%	3.1%
	20-29歳	58	51.6%	7.5%	19.2%	5.7%	2.8%	2.6%	26.4%	6.6%	29.2%	6.5%
	30-39歳	77	66.6%	4.7%	13.1%	3.7%	3.5%	1.9%	16.8%	5.1%	20.3%	5.4%
	40-49歳	117	71.8%	7.7%	7.8%	2.9%	2.6%	2.4%	17.8%	4.0%	20.4%	6.2%
	50-59歳	115	71.8%	6.2%	8.2%	2.8%	3.6%	1.8%	16.4%	4.9%	20.0%	6.3%
	60-69歳	192	90.6%	3.6%	1.5%	0.7%	1.4%	0.9%	6.4%	3.9%	7.9%	3.7%
	70歳以上	345	94.6%	2.0%	2.6%	1.1%	0.0%	0.0%	2.8%	1.1%	2.8%	1.1%
	(再掲)20歳以上	904	82.3%	2.7%	5.8%	0.7%	1.6%	0.6%	10.2%	1.9%	11.8%	2.4%
	(再掲)65-74歳	255	93.4%	1.8%	0.6%	0.4%	1.1%	0.7%	4.9%	1.8%	6.0%	1.9%
	(再掲)75歳以上	200	94.9%	2.6%	3.7%	1.8%	0.0%	0.0%	1.5%	1.0%	1.5%	1.0%
	(再掲)20歳以上※1	904	78.4%	3.0%	7.3%	0.8%	2.0%	0.6%	12.4%	2.2%	14.4%	2.8%
	(再掲)20-49歳※1	252	64.5%	5.0%	12.6%	2.0%	2.9%	1.3%	20.0%	3.7%	22.9%	4.7%
	(再掲)65-74歳※1	255	93.5%	1.8%	0.5%	0.4%	1.2%	0.8%	4.7%	1.7%	5.9%	1.8%
(再掲)75歳以上※1	200	94.8%	2.6%	3.7%	1.8%	0.0%	0.0%	1.5%	1.0%	1.5%	1.0%	
男性	10-14歳	12	93.0%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	7.3%	7.0%	7.3%
	15-19歳	17	94.2%	5.7%	5.8%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20-29歳	28	48.1%	10.5%	6.4%	4.2%	5.1%	4.8%	40.4%	9.1%	45.5%	9.5%
	30-39歳	40	56.0%	5.9%	10.4%	5.0%	4.4%	4.0%	29.2%	6.5%	33.6%	7.1%
	40-49歳	59	68.2%	5.6%	6.8%	3.2%	1.7%	1.6%	23.2%	3.7%	25.0%	4.4%
	50-59歳	57	60.7%	8.2%	11.7%	5.6%	3.1%	2.9%	24.5%	8.7%	27.5%	10.0%
	60-69歳	84	88.3%	5.7%	0.0%	0.0%	3.3%	2.1%	8.5%	6.1%	11.7%	5.7%
	70歳以上	160	93.0%	2.1%	2.8%	1.3%	0.0%	0.0%	4.2%	1.5%	4.2%	1.5%
	(再掲)20歳以上	428	77.4%	2.9%	5.1%	1.4%	2.1%	0.7%	15.4%	2.1%	17.5%	2.7%
	(再掲)65-74歳	127	89.4%	3.1%	1.2%	0.8%	2.2%	1.4%	7.3%	2.8%	9.5%	3.2%
	(再掲)75歳以上	89	95.6%	2.1%	3.3%	2.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	(再掲)20歳以上※1	428	72.4%	3.2%	6.0%	1.8%	2.5%	0.8%	19.1%	2.4%	21.6%	2.9%
	(再掲)20-49歳※1	127	59.0%	5.1%	7.8%	2.3%	3.5%	1.4%	29.7%	4.0%	33.2%	4.4%
	(再掲)65-74歳※1	127	89.3%	3.1%	1.1%	0.7%	2.4%	1.5%	7.2%	2.8%	9.6%	3.2%
(再掲)75歳以上※1	89	95.6%	2.1%	3.3%	2.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
女性	10-14歳	12	82.3%	11.1%	17.7%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15-19歳	20	79.8%	6.5%	13.0%	8.0%	7.1%	5.2%	0.0%	0.0%	7.1%	5.2%
	20-29歳	30	55.7%	11.0%	34.7%	11.0%	0.0%	0.0%	9.7%	7.2%	9.7%	7.2%
	30-39歳	37	77.2%	6.5%	15.9%	5.9%	2.5%	2.4%	4.4%	4.7%	6.9%	5.1%
	40-49歳	58	75.4%	10.6%	8.7%	4.1%	3.5%	3.3%	12.4%	6.5%	15.8%	9.5%
	50-59歳	58	83.2%	5.5%	4.5%	3.0%	4.1%	3.3%	8.1%	4.0%	12.2%	4.3%
	60-69歳	108	92.5%	3.1%	2.7%	1.2%	0.0%	0.0%	4.8%	2.6%	4.8%	2.6%
	70歳以上	185	96.1%	2.0%	2.4%	1.2%	0.0%	0.0%	1.6%	1.1%	1.6%	1.1%
	(再掲)20歳以上	476	87.0%	2.8%	6.5%	0.7%	1.2%	0.7%	5.3%	2.0%	6.5%	2.6%
	(再掲)65-74歳	128	97.6%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	1.2%	2.4%	1.2%
	(再掲)75歳以上※1	111	94.2%	3.2%	4.0%	1.8%	0.0%	0.0%	1.8%	1.7%	1.8%	1.7%
	(再掲)20歳以上※1	476	84.1%	3.2%	8.5%	1.0%	1.5%	0.8%	5.9%	2.4%	7.4%	3.2%
	(再掲)20-49歳※1	125	70.7%	6.3%	17.8%	3.7%	2.3%	2.1%	9.3%	4.6%	11.6%	6.5%
	(再掲)65-74歳※1	128	97.8%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	1.2%	2.2%	1.2%
(再掲)75歳以上※1	111	94.2%	3.2%	4.0%	1.8%	0.0%	0.0%	1.8%	1.7%	1.8%	1.7%	

注1) 調査票No.2の問1、又はNo.3の問1に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問1、No.3 問1:
あなたはふだん朝食を食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表81 食品を選択する際に重視する点－食品を選択する際に重視する点、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	おいしさ		安全性		栄養価		価格		簡便性	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
20～29歳	58	77.7%	6.4%	23.1%	4.3%	32.6%	6.2%	56.4%	6.2%	14.9%	5.2%
30～39歳	77	88.3%	5.1%	51.4%	5.0%	48.1%	8.0%	65.8%	5.8%	32.4%	5.6%
40～49歳	117	74.0%	3.3%	39.1%	3.3%	44.2%	5.0%	51.2%	6.3%	15.2%	3.9%
50～59歳	115	69.1%	6.4%	47.7%	5.9%	51.9%	6.8%	78.2%	5.7%	25.9%	4.6%
60～69歳	192	71.1%	2.9%	61.8%	3.9%	56.2%	3.6%	60.7%	5.1%	15.0%	2.8%
70歳以上	345	61.3%	3.3%	51.2%	2.7%	54.1%	2.3%	44.1%	2.7%	14.1%	1.7%
(再掲)20歳以上	904	69.7%	2.4%	49.6%	2.3%	51.0%	2.9%	55.9%	1.5%	17.8%	1.9%
(再掲)65～74歳	255	68.0%	2.6%	59.9%	2.3%	55.8%	2.3%	56.4%	2.3%	11.1%	2.2%
(再掲)75歳以上	200	56.5%	3.8%	47.1%	3.5%	52.9%	4.0%	37.1%	3.0%	13.9%	2.6%
(再掲)20歳以上※1	904	71.2%	2.6%	47.1%	2.5%	49.2%	3.2%	57.2%	2.0%	18.4%	2.1%
(再掲)20～49歳※1	252	79.2%	3.9%	38.3%	2.8%	42.0%	5.1%	56.7%	5.0%	19.8%	2.5%
(再掲)65～74歳※1	255	68.5%	2.7%	60.0%	2.3%	56.2%	2.3%	56.1%	2.3%	11.3%	2.3%
(再掲)75歳以上※1	200	57.0%	3.7%	47.4%	3.6%	53.4%	4.0%	37.7%	2.9%	14.4%	2.6%
20～29歳	28	72.8%	7.8%	14.9%	7.8%	29.6%	7.9%	55.3%	7.9%	16.7%	5.6%
30～39歳	40	79.5%	9.0%	40.9%	12.9%	39.0%	7.4%	55.7%	6.3%	8.0%	5.4%
40～49歳	59	72.4%	5.4%	30.5%	4.0%	32.2%	6.8%	41.1%	6.4%	14.7%	3.5%
50～59歳	57	57.3%	11.1%	28.9%	8.6%	34.5%	8.5%	63.6%	11.3%	22.8%	6.7%
60～69歳	84	65.0%	3.2%	50.8%	4.6%	44.3%	5.8%	51.6%	6.1%	8.4%	4.1%
70歳以上	160	54.7%	3.6%	45.3%	3.1%	44.3%	3.6%	39.0%	3.0%	10.0%	2.5%
(再掲)20歳以上	428	63.2%	3.5%	39.5%	3.1%	38.6%	2.6%	47.9%	2.6%	12.4%	2.6%
(再掲)65～74歳	127	62.5%	3.2%	50.4%	2.5%	42.0%	2.5%	50.1%	4.0%	9.3%	3.4%
(再掲)75歳以上	89	51.9%	7.1%	44.7%	3.6%	48.1%	6.1%	30.4%	4.9%	8.5%	3.5%
(再掲)20歳以上※1	428	65.2%	3.9%	36.7%	3.6%	37.2%	3.0%	49.5%	3.3%	13.2%	2.5%
(再掲)20～49歳※1	127	74.7%	6.2%	29.5%	5.3%	33.6%	5.0%	49.5%	5.0%	13.2%	2.1%
(再掲)65～74歳※1	127	62.8%	3.0%	50.7%	2.4%	42.2%	2.3%	50.1%	4.2%	9.1%	3.4%
(再掲)75歳以上※1	89	51.9%	7.1%	44.7%	3.6%	48.1%	6.1%	30.4%	4.9%	8.5%	3.5%
20～29歳	30	83.7%	6.8%	33.1%	7.6%	36.3%	8.5%	57.8%	6.4%	12.8%	7.1%
30～39歳	37	97.2%	2.7%	61.9%	7.2%	57.2%	10.1%	75.9%	8.5%	57.0%	8.6%
40～49歳	58	75.6%	4.7%	47.7%	4.7%	56.2%	5.6%	61.4%	8.3%	15.8%	6.2%
50～59歳	58	81.3%	4.2%	67.1%	7.0%	69.8%	8.9%	93.2%	3.3%	29.0%	5.9%
60～69歳	108	76.0%	5.1%	70.6%	4.0%	70.3%	4.4%	68.0%	5.5%	20.3%	4.2%
70歳以上	185	67.3%	4.7%	56.6%	3.4%	63.1%	3.4%	48.9%	2.9%	17.9%	2.8%
(再掲)20歳以上	476	75.8%	2.3%	59.2%	2.2%	62.7%	4.1%	63.5%	2.3%	22.9%	2.2%
(再掲)65～74歳	128	73.7%	4.0%	69.6%	3.9%	69.9%	3.8%	62.9%	3.7%	13.0%	2.9%
(再掲)75歳以上	111	60.6%	5.7%	49.2%	4.7%	57.2%	4.8%	43.0%	3.0%	18.7%	3.7%
(再掲)20歳以上※1	476	77.1%	2.1%	57.1%	2.2%	60.8%	4.5%	64.5%	2.7%	23.4%	2.3%
(再掲)20～49歳※1	125	84.2%	2.6%	48.0%	2.6%	51.2%	6.4%	64.7%	6.9%	27.2%	3.8%
(再掲)65～74歳※1	128	74.2%	4.1%	69.3%	4.0%	70.2%	3.6%	62.1%	3.9%	13.6%	3.2%
(再掲)75歳以上※1	111	60.6%	5.7%	49.2%	4.7%	57.2%	4.8%	43.0%	3.0%	18.7%	3.7%

注1) 調査票No.2の問2に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問2:

あなたはたん食品を選択する際にどのようなかを重視していますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

性年齢	季節感・旬		好み		鮮度		量・大きさ		特になし		
	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	6.9%	2.9%	84.1%	8.0%	19.8%	5.3%	50.1%	8.4%	4.9%	3.5%
	30～39歳	35.3%	5.7%	70.2%	6.3%	54.0%	7.3%	45.1%	5.7%	3.2%	1.7%
	40～49歳	38.2%	6.5%	71.2%	3.5%	42.2%	4.9%	33.3%	5.8%	8.1%	1.8%
	50～59歳	45.0%	5.7%	68.3%	8.6%	54.4%	4.7%	39.3%	5.0%	8.1%	5.8%
	60～69歳	47.7%	3.4%	71.3%	4.8%	67.0%	3.7%	39.0%	3.5%	1.8%	0.8%
	70歳以上	40.6%	4.0%	65.5%	1.6%	60.4%	2.3%	29.2%	2.7%	9.3%	1.6%
	(再掲)20歳以上	39.8%	2.0%	69.4%	1.4%	55.4%	2.2%	36.0%	2.1%	6.5%	1.2%
	(再掲)65～74歳	43.9%	1.6%	69.6%	3.3%	65.6%	2.7%	32.8%	3.1%	4.6%	1.7%
	(再掲)75歳以上	37.4%	6.1%	63.3%	2.6%	56.1%	3.4%	27.2%	4.4%	11.6%	1.6%
	(再掲)20歳以上※1	37.6%	1.9%	70.3%	1.4%	52.3%	2.1%	37.3%	2.1%	6.5%	1.3%
	(再掲)20～49歳※1	28.4%	3.4%	74.1%	2.5%	39.4%	3.1%	41.6%	3.5%	5.9%	1.4%
	(再掲)65～74歳※1	43.8%	1.7%	70.1%	3.2%	66.0%	2.8%	33.1%	3.2%	4.3%	1.5%
	(再掲)75歳以上※1	38.8%	6.3%	63.2%	2.6%	57.5%	3.4%	27.6%	4.3%	11.5%	1.7%
	20～29歳	5.8%	3.9%	79.9%	10.6%	12.1%	7.4%	41.7%	10.5%	8.1%	6.3%
男性	30～39歳	18.7%	6.0%	55.2%	7.4%	39.5%	10.0%	51.5%	7.2%	6.3%	3.3%
	40～49歳	27.4%	5.0%	67.3%	6.9%	30.3%	6.0%	29.5%	6.1%	16.2%	3.4%
	50～59歳	28.3%	6.4%	58.9%	15.1%	34.7%	8.2%	33.0%	6.8%	15.9%	11.3%
	60～69歳	26.5%	3.6%	74.6%	5.3%	57.4%	6.1%	30.5%	4.2%	1.6%	1.3%
	70歳以上	28.0%	3.2%	63.8%	3.4%	46.6%	3.8%	23.0%	2.8%	12.6%	2.3%
	(再掲)20歳以上	25.3%	2.0%	66.0%	2.5%	41.7%	3.5%	30.8%	2.0%	10.5%	6.3%
	(再掲)65～74歳	31.1%	3.3%	69.4%	3.8%	55.6%	3.4%	26.1%	3.1%	7.4%	2.8%
	(再掲)75歳以上	22.6%	4.7%	63.6%	5.1%	40.6%	6.2%	22.7%	5.2%	13.1%	2.6%
	(再掲)20歳以上※1	23.9%	2.5%	66.0%	2.5%	38.5%	3.4%	32.9%	2.0%	10.7%	2.2%
	(再掲)20～49歳※1	18.8%	3.8%	67.0%	2.3%	28.2%	3.7%	39.6%	3.8%	11.0%	2.5%
	(再掲)65～74歳※1	30.8%	3.1%	69.8%	3.9%	55.7%	3.6%	26.3%	3.1%	7.0%	2.6%
	(再掲)75歳以上※1	22.6%	4.7%	63.6%	5.1%	40.6%	6.2%	22.7%	5.2%	13.1%	2.6%
	20～29歳	8.2%	4.0%	89.1%	6.7%	29.1%	10.3%	60.1%	12.8%	1.1%	1.1%
	30～39歳	52.0%	9.5%	85.3%	6.4%	68.5%	6.4%	38.6%	7.9%	0.0%	0.0%
女性	40～49歳	49.1%	11.0%	75.1%	6.1%	54.2%	7.3%	37.2%	8.6%	0.0%	0.0%
	50～59歳	62.1%	7.6%	78.0%	6.2%	74.8%	5.3%	45.9%	5.0%	0.0%	0.0%
	60～69歳	64.7%	5.8%	68.6%	6.0%	74.6%	2.8%	45.8%	4.6%	2.0%	1.2%
	70歳以上	52.3%	7.0%	67.0%	3.4%	73.1%	4.1%	35.0%	3.2%	6.2%	1.9%
	(再掲)20歳以上	53.6%	3.5%	72.7%	2.4%	68.4%	2.4%	40.8%	3.0%	2.8%	0.9%
	(再掲)65～74歳	57.1%	4.6%	69.8%	4.9%	75.9%	4.1%	39.7%	4.5%	1.8%	1.0%
	(再掲)75歳以上	50.5%	8.2%	62.9%	4.1%	69.7%	4.5%	31.1%	4.2%	10.3%	2.9%
	(再掲)20歳以上※1	50.8%	3.6%	74.5%	2.1%	65.7%	2.6%	41.6%	3.5%	2.4%	0.7%
	(再掲)20～49歳※1	39.0%	7.2%	81.9%	3.6%	51.7%	4.5%	43.7%	6.0%	0.3%	0.3%
	(再掲)65～74歳※1	56.7%	4.9%	70.3%	4.7%	76.3%	4.0%	39.9%	4.7%	1.5%	0.9%
	(再掲)75歳以上※1	50.5%	8.2%	62.9%	4.1%	69.7%	4.5%	31.1%	4.2%	10.3%	2.9%

表82 栄養成分表示を参考にしている状況－栄養成分表示を参考にしている状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		総数	参考にしている	
			割合	標準誤差
総数	20～29歳	58	32.8%	11.1%
	30～39歳	77	40.1%	5.3%
	40～49歳	117	48.0%	6.1%
	50～59歳	115	47.6%	6.8%
	60～69歳	192	54.7%	3.3%
	70歳以上	344	40.6%	2.2%
	(再掲)20歳以上	903	45.0%	2.3%
	(再掲)65～74歳	254	47.0%	2.4%
	(再掲)75歳以上	200	38.3%	2.8%
	(再掲)20歳以上※1	903	44.0%	2.6%
	(再掲)20～49歳※1	252	41.2%	4.2%
	(再掲)65～74歳※1	254	46.6%	2.3%
	(再掲)75歳以上※1	200	39.0%	2.9%
男性	20～29歳	28	30.5%	14.7%
	30～39歳	40	31.9%	4.6%
	40～49歳	59	33.6%	7.0%
	50～59歳	57	31.3%	6.4%
	60～69歳	84	31.1%	1.6%
	70歳以上	160	31.3%	2.8%
	(再掲)20歳以上	428	31.6%	1.4%
	(再掲)65～74歳	127	30.8%	3.2%
	(再掲)75歳以上	89	31.4%	2.5%
	(再掲)20歳以上※1	428	31.6%	1.8%
	(再掲)20～49歳※1	127	32.2%	3.0%
	(再掲)65～74歳※1	127	30.8%	3.2%
	(再掲)75歳以上※1	89	31.4%	2.5%
女性	20～29歳	30	35.6%	11.5%
	30～39歳	37	48.3%	8.3%
	40～49歳	58	62.5%	6.3%
	50～59歳	58	64.4%	8.5%
	60～69歳	108	73.6%	4.7%
	70歳以上	184	49.2%	3.4%
	(再掲)20歳以上	475	57.7%	4.0%
	(再掲)65～74歳	127	63.6%	4.1%
	(再掲)75歳以上	111	44.5%	4.5%
	(再掲)20歳以上※1	475	56.0%	4.3%
	(再掲)20～49歳※1	125	51.1%	7.0%
	(再掲)65～74歳※1	127	62.4%	4.1%
	(再掲)75歳以上※1	111	44.5%	4.5%

注1) 調査票No.2の問4に回答した者を集計対象とし、「いつもしている」、「時々している」と回答した者を「参考にしている」とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問4:

あなたはふだん外食をする時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にしていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表83 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の頻度－主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、10歳以上

性年齢		人数	ほとんど毎日		週に4-5日		週に2-3日		ほとんどない	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	10-14歳	24	70.5%	14.9%	13.1%	8.0%	16.3%	9.5%	0.0%	0.0%
	15-19歳	37	67.1%	6.5%	9.2%	4.0%	14.9%	8.0%	8.8%	3.6%
	20~29歳	58	16.8%	4.6%	26.0%	3.7%	32.9%	10.5%	24.2%	5.9%
	30~39歳	77	34.4%	7.2%	21.8%	5.7%	29.9%	5.6%	13.9%	3.8%
	40~49歳	117	37.3%	3.7%	21.9%	4.0%	22.7%	5.1%	18.1%	4.1%
	50~59歳	115	41.3%	2.9%	18.1%	4.7%	22.7%	3.5%	17.9%	3.0%
	60~69歳	192	56.6%	6.2%	19.3%	4.2%	18.5%	3.1%	5.5%	1.5%
	70歳以上	345	54.2%	2.7%	20.5%	2.5%	19.3%	2.5%	6.0%	1.9%
	(再掲)20歳以上	904	46.6%	2.6%	20.6%	1.3%	21.9%	1.4%	11.0%	1.4%
	(再掲)65~74歳	255	58.8%	2.9%	16.5%	2.4%	20.8%	3.0%	3.9%	1.5%
	(再掲)75歳以上	200	50.6%	3.5%	24.0%	3.1%	17.3%	2.8%	8.1%	3.1%
	(再掲)20歳以上※1	904	43.2%	2.5%	21.0%	1.3%	23.0%	1.5%	12.8%	1.5%
	(再掲)20~49歳※1	252	30.8%	2.7%	23.0%	2.6%	27.7%	3.4%	18.5%	2.0%
	(再掲)65~74歳※1	255	59.1%	2.9%	16.8%	2.4%	20.2%	3.0%	3.9%	1.5%
(再掲)75歳以上※1	200	50.5%	3.7%	24.0%	3.1%	17.5%	3.0%	8.0%	3.1%	
男性	10-14歳	12	73.6%	15.3%	1.8%	2.0%	24.6%	15.0%	0.0%	0.0%
	15-19歳	17	76.5%	10.6%	1.5%	1.6%	17.0%	10.3%	4.9%	5.0%
	20~29歳	28	13.5%	7.6%	19.4%	6.1%	34.3%	13.2%	32.8%	12.2%
	30~39歳	40	27.7%	8.8%	20.1%	7.2%	34.2%	8.4%	18.1%	5.4%
	40~49歳	59	39.6%	5.8%	20.8%	3.9%	21.4%	6.4%	18.2%	5.6%
	50~59歳	57	30.7%	4.9%	19.2%	7.8%	24.2%	4.9%	25.9%	6.5%
	60~69歳	84	56.0%	8.7%	20.0%	6.0%	15.4%	3.7%	8.6%	2.5%
	70歳以上	160	53.0%	2.4%	19.7%	3.3%	20.9%	2.4%	6.3%	2.1%
	(再掲)20歳以上	428	43.4%	3.1%	19.9%	1.6%	22.6%	1.8%	14.1%	1.8%
	(再掲)65~74歳	127	58.2%	4.3%	17.6%	5.2%	19.8%	2.8%	4.4%	1.7%
	(再掲)75歳以上	89	51.0%	3.4%	24.2%	4.4%	16.0%	2.7%	8.8%	3.1%
	(再掲)20歳以上※1	428	39.5%	2.9%	19.9%	1.4%	24.0%	2.2%	16.7%	1.8%
	(再掲)20~49歳※1	127	28.8%	3.3%	20.2%	3.3%	28.9%	4.6%	22.1%	3.2%
	(再掲)65~74歳※1	127	58.4%	4.5%	17.8%	5.4%	19.2%	2.8%	4.5%	1.7%
(再掲)75歳以上※1	89	51.0%	3.4%	24.2%	4.4%	16.0%	2.7%	8.8%	3.1%	
女性	10-14歳	12	67.3%	16.5%	25.2%	15.9%	7.5%	7.3%	0.0%	0.0%
	15-19歳	20	59.0%	6.0%	15.9%	7.3%	13.1%	9.9%	12.1%	5.3%
	20~29歳	30	20.8%	7.4%	34.0%	8.1%	31.3%	8.0%	14.0%	9.4%
	30~39歳	37	41.1%	7.2%	23.5%	6.2%	25.6%	4.8%	9.8%	3.8%
	40~49歳	58	35.1%	4.8%	23.0%	5.5%	24.0%	5.3%	17.9%	5.2%
	50~59歳	58	52.2%	5.2%	17.0%	3.6%	21.0%	3.5%	9.7%	4.3%
	60~69歳	108	57.1%	6.8%	18.8%	4.1%	21.1%	4.9%	3.0%	1.8%
	70歳以上	185	55.4%	5.0%	21.2%	3.8%	17.8%	3.7%	5.7%	1.9%
	(再掲)20歳以上	476	49.5%	3.1%	21.2%	2.0%	21.2%	1.6%	8.0%	1.2%
	(再掲)65~74歳	128	59.3%	4.9%	15.5%	2.7%	21.9%	3.9%	3.3%	1.5%
	(再掲)75歳以上	111	50.2%	5.7%	23.8%	4.4%	18.5%	4.8%	7.4%	3.3%
	(再掲)20歳以上※1	476	46.8%	3.0%	22.0%	2.1%	22.0%	1.7%	9.1%	1.6%
	(再掲)20~49歳※1	125	33.0%	4.1%	26.1%	3.1%	26.4%	3.5%	14.4%	3.9%
	(再掲)65~74歳※1	128	59.9%	5.2%	15.7%	2.9%	21.1%	3.6%	3.3%	1.5%
(再掲)75歳以上※1	111	50.2%	5.7%	23.8%	4.4%	18.5%	4.8%	7.4%	3.3%	

注1) 調査票No.2の問5、又はNo.3の問1に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問5、No.3 問2:

あなたは主食(ご飯、パン、麺類などの料理)、主菜(魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理)、副菜(野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理)の3つを組み合わせる食べることが1日2回以上あるのは週に何日ありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表84 三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている－三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている状況・年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		総数	はい		いいえ		わからない	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	58	39.3%	6.5%	54.2%	7.1%	6.5%	3.9%
	30～39歳	77	52.7%	5.2%	42.8%	5.2%	4.5%	2.5%
	40～49歳	117	61.6%	7.2%	31.7%	6.7%	6.7%	1.9%
	50～59歳	115	67.0%	7.3%	28.4%	6.4%	4.7%	2.1%
	60～69歳	192	80.2%	3.3%	16.4%	3.3%	3.4%	1.2%
	70歳以上	345	88.6%	2.7%	7.6%	2.0%	3.7%	1.7%
	(再掲)20歳以上	904	73.9%	3.0%	21.7%	2.5%	4.4%	0.9%
	(再掲)65～74歳	255	84.0%	3.0%	12.6%	2.6%	3.4%	1.4%
	(再掲)75歳以上	200	90.1%	3.4%	5.4%	2.1%	4.5%	2.0%
	(再掲)20歳以上※1	904	69.6%	3.3%	25.7%	2.9%	4.7%	0.7%
	(再掲)20～49歳※1	252	52.7%	5.6%	41.3%	5.3%	6.0%	1.6%
	(再掲)65～74歳※1	255	84.4%	2.9%	12.4%	2.6%	3.2%	1.3%
	(再掲)75歳以上※1	200	89.9%	3.5%	5.4%	2.1%	4.7%	2.2%
男性	20～29歳	28	33.5%	7.4%	59.4%	11.4%	7.1%	6.1%
	30～39歳	40	44.0%	7.1%	52.8%	7.4%	3.2%	2.5%
	40～49歳	59	57.1%	8.3%	35.6%	6.0%	7.3%	3.4%
	50～59歳	57	56.4%	8.8%	36.4%	7.1%	7.2%	3.4%
	60～69歳	84	79.1%	5.4%	18.3%	5.7%	2.6%	1.6%
	70歳以上	160	88.0%	2.5%	8.3%	1.9%	3.6%	1.4%
	(再掲)20歳以上	428	69.5%	2.8%	25.8%	2.1%	4.6%	0.9%
	(再掲)65～74歳	127	82.9%	3.6%	12.5%	3.3%	4.7%	1.8%
	(再掲)75歳以上	89	91.8%	2.3%	5.9%	2.1%	2.3%	1.4%
	(再掲)20歳以上※1	428	63.8%	3.3%	31.2%	2.6%	5.1%	0.9%
	(再掲)20～49歳※1	127	46.6%	6.2%	47.4%	6.2%	6.0%	2.1%
	(再掲)65～74歳※1	127	82.8%	3.6%	12.5%	3.4%	4.6%	1.7%
	(再掲)75歳以上※1	89	91.8%	2.3%	5.9%	2.1%	2.3%	1.4%
女性	20～29歳	30	46.3%	11.3%	47.9%	12.5%	5.8%	4.8%
	30～39歳	37	61.4%	5.5%	32.8%	6.1%	5.8%	3.4%
	40～49歳	58	66.1%	9.2%	27.8%	9.4%	6.1%	4.0%
	50～59歳	58	77.9%	6.7%	20.1%	6.8%	2.0%	1.6%
	60～69歳	108	81.0%	3.6%	14.9%	3.1%	4.1%	1.9%
	70歳以上	185	89.2%	3.5%	7.0%	2.5%	3.8%	2.2%
	(再掲)20歳以上	476	78.0%	3.4%	17.8%	3.0%	4.2%	1.2%
	(再掲)65～74歳	128	85.1%	3.8%	12.7%	3.5%	2.2%	1.5%
	(再掲)75歳以上	111	88.6%	4.9%	5.0%	2.4%	6.4%	3.6%
	(再掲)20歳以上※1	476	75.1%	3.7%	20.5%	3.5%	4.4%	1.1%
	(再掲)20～49歳※1	125	59.4%	7.1%	34.7%	6.8%	5.9%	2.0%
	(再掲)65～74歳※1	128	85.9%	3.6%	12.2%	3.5%	1.9%	1.3%
	(再掲)75歳以上※1	111	88.6%	4.9%	5.0%	2.4%	6.4%	3.6%

注1) 調査票No.2の問8に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問8:

あなたは朝食・昼食・夕食の三食を必ず食べることに気をつけていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表85 地域等での共食の希望－地域等での共食希望者の共食状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		総数	共食したい人が共食した割合	
			割合	標準誤差
総数	20～29歳	12	55.1%	14.7%
	30～39歳	20	22.8%	6.2%
	40～49歳	18	31.0%	7.8%
	50～59歳	25	30.2%	11.2%
	60～69歳	48	24.5%	4.3%
	70歳以上	77	40.8%	5.8%
	(再掲)20歳以上	200	33.3%	3.4%
	(再掲)65～74歳	59	33.1%	8.4%
	(再掲)75歳以上	45	39.9%	12.0%
	(再掲)20歳以上※1	200	33.8%	3.7%
	(再掲)20～49歳※1	50	34.1%	5.5%
	(再掲)65～74歳※1	59	33.6%	8.5%
	(再掲)75歳以上※1	45	40.6%	11.7%
男性	20～29歳	7	72.2%	18.5%
	30～39歳	8	15.7%	9.0%
	40～49歳	12	39.5%	13.5%
	50～59歳	9	35.1%	22.7%
	60～69歳	22	28.7%	7.5%
	70歳以上	35	39.4%	8.3%
	(再掲)20歳以上	93	37.0%	3.5%
	(再掲)65～74歳	30	43.3%	10.1%
	(再掲)75歳以上	20	31.7%	16.1%
	(再掲)20歳以上※1	93	38.3%	3.8%
	(再掲)20～49歳※1	27	42.2%	6.4%
	(再掲)65～74歳※1	30	42.9%	10.2%
	(再掲)75歳以上※1	20	31.7%	16.1%
女性	20～29歳	5	25.8%	23.0%
	30～39歳	12	27.6%	12.3%
	40～49歳	6	14.9%	12.4%
	50～59歳	16	27.7%	8.4%
	60～69歳	26	21.2%	5.0%
	70歳以上	42	42.0%	7.3%
	(再掲)20歳以上	107	30.0%	4.3%
	(再掲)65～74歳	29	22.7%	8.0%
	(再掲)75歳以上	25	46.9%	10.2%
	(再掲)20歳以上※1	107	29.6%	5.0%
	(再掲)20～49歳※1	23	23.4%	7.9%
	(再掲)65～74歳※1	29	24.4%	8.5%
	(再掲)75歳以上※1	25	46.9%	10.2%

注1) 調査票No.2の問10で「とてもそう思う」、「そう思う」に回答した者のうち、問11に回答した者を集計対象とした。
問10で「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した200人のうち、問11に「参加した」者を共食したい人が共食した割合とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問10:

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策が十分にとられているという前提でお伺いします。地域や所属コミュニティー(町内会、趣味の会、職場等を含む)で食事会等の機会があれば、あなたは参加したいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

No.2 問11:

あなたは過去1年間に、地域や所属コミュニティーでの食事会等に参加しましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表86 たばこの害の認知度・たばこの害の認知度、疾病別、年齢階級別、割合、標準誤差一総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	ア 肺がん		イ 喘息		ウ 気管支炎		エ 心臓病		オ 脳卒中		カ 胃かいよう		キ 妊婦への影響		ク 歯周病	
	人数	割合	人数	標準誤差	人数	標準誤差	人数	標準誤差	人数	標準誤差	人数	標準誤差	人数	標準誤差	人数	標準誤差
10~14歳	24	79.0%	23	10.9%	23	50.0%	23	53.0%	23	51.0%	23	33.9%	23	77.3%	23	43.7%
15~19歳	37	96.6%	37	77.2%	37	83.6%	37	80.6%	37	80.6%	37	47.0%	37	93.0%	37	75.6%
20~29歳	58	89.4%	58	76.5%	58	75.1%	58	73.0%	58	73.0%	58	57.2%	58	85.2%	58	65.6%
30~39歳	77	91.8%	77	78.3%	77	77.9%	77	66.3%	77	73.1%	77	50.7%	77	89.3%	77	67.7%
40~49歳	116	85.7%	116	63.8%	116	64.1%	116	58.5%	116	69.5%	116	45.6%	116	83.1%	116	63.9%
50~59歳	114	90.6%	114	59.2%	114	67.4%	114	57.7%	114	80.8%	114	35.6%	114	84.9%	114	53.4%
60~69歳	192	85.5%	192	67.3%	192	72.5%	192	58.5%	192	60.9%	192	36.3%	192	80.8%	192	45.9%
70歳以上	341	85.5%	338	63.7%	339	67.8%	340	50.5%	340	50.2%	340	35.0%	339	73.2%	340	41.0%
(再掲)20歳以上	898	87.0%	895	66.0%	895	69.6%	895	57.1%	895	60.1%	897	39.6%	896	80.0%	897	50.8%
(再掲)65~74歳	255	80.3%	254	62.9%	254	71.4%	255	52.9%	255	53.4%	255	34.0%	255	76.1%	255	39.9%
(再掲)75歳以上	196	90.4%	194	65.9%	194	66.1%	195	52.0%	194	52.8%	195	36.4%	194	73.3%	194	43.1%
(再掲)20~49歳※1	251	88.4%	251	71.5%	251	71.2%	251	64.8%	250	72.0%	251	50.3%	251	85.4%	251	65.5%
(再掲)65~74歳※1	255	80.3%	254	62.5%	254	71.1%	255	52.7%	255	53.2%	255	33.6%	255	75.6%	255	39.8%
(再掲)75歳以上※1	196	90.4%	194	65.9%	194	65.9%	195	51.6%	194	52.2%	195	36.0%	194	73.7%	195	43.1%
10~14歳	12	87.7%	11	55.2%	11	55.2%	11	57.9%	11	60.6%	11	26.5%	11	92.0%	11	63.2%
15~19歳	17	100.0%	17	94.2%	17	87.9%	17	79.2%	17	79.2%	17	40.1%	17	100.0%	17	84.1%
20~29歳	28	87.1%	28	72.2%	28	65.2%	28	70.6%	28	71.5%	28	54.0%	28	79.5%	28	56.0%
30~39歳	40	87.1%	40	71.1%	40	72.6%	40	67.0%	40	78.2%	40	51.7%	40	82.6%	40	64.7%
40~49歳	58	78.8%	58	55.7%	58	61.2%	58	51.5%	58	71.9%	58	43.5%	58	73.7%	58	60.7%
50~59歳	56	86.9%	56	56.5%	56	65.5%	56	57.4%	56	58.2%	56	36.8%	56	80.6%	56	54.3%
60~69歳	84	81.9%	84	62.3%	84	67.5%	84	53.0%	84	53.1%	84	32.3%	84	69.9%	84	42.4%
70歳以上	159	84.2%	158	66.3%	159	69.7%	159	51.8%	159	50.9%	159	38.8%	159	70.1%	159	40.4%
(再掲)20歳以上	425	84.0%	424	63.6%	425	67.5%	425	58.6%	425	59.3%	425	40.2%	425	73.9%	425	48.8%
(再掲)65~74歳	127	78.5%	126	66.2%	127	71.2%	127	50.8%	127	47.0%	127	34.3%	127	71.0%	127	36.6%
(再掲)75歳以上	88	90.3%	88	66.6%	88	68.0%	88	55.6%	88	59.1%	88	40.4%	88	69.2%	88	43.3%
(再掲)20歳以上※1	425	84.2%	424	63.5%	425	67.0%	425	57.1%	425	62.1%	425	41.7%	425	79.2%	425	51.5%
(再掲)65~74歳※1	126	84.1%	126	65.0%	126	65.9%	126	61.6%	126	73.7%	126	48.9%	126	78.1%	126	60.7%
(再掲)75歳以上※1	127	78.7%	126	65.0%	127	71.1%	127	51.1%	127	47.5%	127	34.1%	127	71.0%	127	36.6%
10~14歳	12	69.7%	12	47.6%	12	45.1%	12	48.4%	12	42.0%	12	40.9%	12	63.5%	12	25.3%
15~19歳	20	93.7%	20	62.5%	20	79.9%	20	81.8%	20	81.8%	20	53.0%	20	87.0%	20	68.2%
20~29歳	30	92.1%	30	81.5%	30	87.1%	30	76.0%	30	76.9%	30	61.0%	30	92.1%	30	77.0%
30~39歳	37	96.6%	37	85.5%	37	83.2%	37	65.5%	37	68.0%	37	49.7%	37	95.9%	37	70.7%
40~49歳	58	91.5%	58	71.8%	58	66.8%	58	65.5%	58	67.1%	58	47.8%	58	92.4%	58	67.0%
50~59歳	58	94.3%	58	61.8%	58	69.4%	58	58.1%	58	63.6%	58	34.4%	58	89.3%	58	52.4%
60~69歳	108	88.3%	108	71.4%	107	76.6%	108	62.8%	108	67.1%	108	39.4%	108	89.5%	108	48.7%
70歳以上	182	86.7%	180	61.2%	180	66.0%	181	49.3%	180	49.6%	181	31.5%	180	76.1%	181	41.9%
(再掲)20歳以上	473	89.9%	471	68.4%	470	71.7%	472	58.6%	470	60.9%	471	39.1%	471	85.7%	472	52.7%
(再掲)65~74歳	128	82.1%	128	59.5%	127	71.6%	128	55.0%	128	60.0%	128	33.6%	128	81.2%	128	43.3%
(再掲)75歳以上※1	108	90.4%	106	65.4%	106	64.3%	107	48.7%	106	47.2%	107	32.8%	106	77.0%	107	42.9%
(再掲)20~49歳※1	473	90.5%	471	69.3%	470	72.3%	470	59.8%	470	62.0%	472	40.8%	471	86.6%	472	55.4%
(再掲)65~74歳※1	125	93.2%	125	78.5%	125	77.1%	125	66.3%	124	70.0%	125	51.9%	125	93.3%	125	70.8%
(再掲)75歳以上※1	128	82.0%	128	58.8%	127	71.1%	128	54.3%	128	58.9%	128	33.0%	128	80.2%	128	42.9%
総数	108	90.4%	106	65.4%	106	64.3%	107	48.7%	106	47.2%	107	32.8%	106	77.0%	107	42.9%

注1) 調査票No.2の間13、又はNo.3の間12の「ア、イ、エ、オ、カ、キ、ク」にそれぞれ回答した者を集計対象とし、1は「は」とか「は」を誤りか「は」を正しく回答した者として集計した。

注2) 歯は保健所区域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1) 保健所区域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと果の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした。

No.2 問13、No.3 問12: あなたはたばこが健康に与える影響について、どう思いますか。次のアからクの病状について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

ア 肺がん イ 喘息 ウ 気管支炎 エ 心臓病 オ 脳卒中 カ 胃かいよう キ 妊婦への影響(未熟児など) ク 歯周病(歯槽膿漏など)

表87 飲みこみにくいまたはむせたりする状況一飲みこみにくいまたはむせたりする状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	頻繁にある		ときどきある		めったにない		全くない		(再掲) めったにない、全くない		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	58	0.0%	8.2%	3.6%	19.3%	5.4%	72.5%	4.6%	91.8%	3.6%	
	30～39歳	77	0.0%	14.0%	2.8%	31.3%	5.8%	54.7%	6.2%	86.0%	2.8%	
	40～49歳	117	2.2%	16.9%	4.5%	39.5%	5.1%	41.4%	4.4%	80.9%	3.8%	
	50～59歳	115	1.0%	16.8%	5.8%	47.0%	5.7%	35.3%	3.6%	82.2%	6.0%	
	60～69歳	192	3.8%	1.2%	23.2%	4.7%	39.0%	5.7%	34.1%	6.4%	73.1%	4.8%
	70歳以上	345	3.8%	0.8%	36.7%	1.6%	37.9%	1.9%	21.5%	2.4%	59.4%	1.6%
	(再掲)20歳以上	904	2.6%	0.4%	24.6%	0.7%	37.8%	1.5%	34.9%	2.0%	72.8%	0.9%
	(再掲)65～74歳	255	1.9%	0.8%	30.5%	3.2%	37.4%	3.1%	30.2%	3.7%	67.6%	3.1%
	(再掲)75歳以上	200	5.5%	1.4%	40.2%	3.3%	35.9%	2.8%	18.5%	3.0%	54.3%	3.1%
	(再掲)20歳以上※1	904	2.2%	0.5%	22.5%	0.8%	36.8%	1.6%	38.5%	1.8%	75.4%	0.8%
男性	(再掲)20～49歳※1	252	0.9%	0.7%	13.8%	2.7%	31.4%	2.7%	53.9%	3.6%	85.3%	2.6%
	(再掲)65～74歳※1	255	1.9%	0.8%	30.8%	3.1%	37.3%	3.0%	30.0%	3.7%	67.3%	3.0%
	(再掲)75歳以上※1	200	5.1%	1.3%	40.8%	3.3%	35.5%	2.7%	18.5%	3.0%	54.1%	3.2%
	20～29歳	28	0.0%	0.0%	6.0%	4.8%	25.8%	7.7%	68.2%	6.3%	94.0%	4.8%
	30～39歳	40	0.0%	0.0%	16.4%	5.8%	29.3%	6.8%	54.3%	9.4%	83.6%	5.8%
	40～49歳	59	3.0%	3.0%	17.5%	5.1%	31.5%	8.9%	48.0%	6.6%	79.5%	4.7%
	50～59歳	57	0.0%	0.0%	14.1%	5.5%	41.3%	7.2%	44.6%	5.3%	85.9%	5.5%
	60～69歳	84	5.1%	2.3%	22.7%	4.5%	39.9%	5.6%	32.2%	6.8%	72.1%	4.6%
	70歳以上	160	5.8%	1.9%	30.6%	2.0%	42.5%	2.2%	21.1%	2.7%	63.6%	2.5%
	(再掲)20歳以上	428	3.5%	1.1%	21.9%	1.2%	37.8%	2.4%	36.8%	2.9%	74.6%	1.4%
女性	(再掲)65～74歳	127	1.6%	1.0%	27.4%	4.5%	41.2%	3.4%	29.9%	4.0%	71.0%	4.3%
	(再掲)75歳以上	89	9.2%	3.1%	33.4%	5.3%	39.8%	5.7%	17.7%	3.4%	57.5%	4.8%
	(再掲)20歳以上※1	428	2.8%	1.0%	19.6%	1.2%	36.3%	2.6%	41.3%	3.0%	77.6%	1.2%
	(再掲)20～49歳※1	127	1.3%	1.3%	14.0%	4.1%	29.3%	5.3%	55.4%	6.1%	84.7%	4.2%
	(再掲)65～74歳※1	127	1.6%	1.0%	27.4%	4.6%	40.8%	3.6%	30.2%	4.2%	71.0%	4.4%
	(再掲)75歳以上※1	89	9.2%	3.1%	33.4%	5.3%	39.8%	5.7%	17.7%	3.4%	57.5%	4.8%
	20～29歳	30	0.0%	0.0%	10.8%	6.3%	11.4%	6.9%	77.8%	7.3%	89.2%	6.3%
	30～39歳	37	0.0%	0.0%	11.7%	5.7%	33.3%	6.1%	55.0%	7.9%	88.3%	5.7%
	40～49歳	58	1.3%	1.4%	16.3%	5.1%	47.7%	5.0%	34.7%	4.1%	82.4%	4.9%
	50～59歳	58	2.0%	2.0%	19.6%	8.2%	52.9%	5.7%	25.6%	5.9%	78.5%	8.5%
60～69歳	108	2.6%	1.2%	23.6%	5.5%	38.2%	6.6%	35.6%	7.3%	73.8%	5.6%	
70歳以上	185	2.0%	0.9%	42.3%	3.4%	33.7%	4.0%	21.9%	3.2%	55.6%	3.4%	
(再掲)20歳以上	476	1.8%	0.8%	27.2%	1.2%	37.8%	1.9%	33.2%	2.0%	71.0%	1.0%	
(再掲)65～74歳	128	2.3%	1.1%	33.7%	3.4%	33.5%	3.8%	30.5%	5.5%	64.0%	3.5%	
(再掲)75歳以上	111	2.3%	1.4%	46.2%	4.8%	32.4%	3.7%	19.2%	4.3%	51.6%	5.4%	
(再掲)20歳以上※1	476	1.6%	0.7%	25.2%	1.0%	37.4%	1.8%	35.8%	1.6%	73.2%	1.0%	
(再掲)20～49歳※1	125	0.6%	0.6%	13.4%	2.7%	33.7%	3.5%	52.3%	3.5%	86.0%	2.9%	
(再掲)65～74歳※1	128	2.2%	1.0%	34.2%	3.0%	33.8%	3.8%	29.8%	5.4%	63.6%	3.2%	
(再掲)75歳以上※1	111	2.3%	1.4%	46.2%	4.8%	32.4%	3.7%	19.2%	4.3%	51.6%	5.4%	

注1) 調査票No.2の問14に回答した者を集計対象とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問14:

あなたは食べ物や飲み物が飲みにくく感じたり、食事中にむせたりすることがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表88 ゆっくりよく噛んで食べる割合－年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、10歳以上

性年齢		総数	ゆっくりよく噛んで食べる人の割合	
			割合	標準誤差
総数	10-14歳	24	87.1%	6.3%
	15-19歳	37	75.0%	6.3%
	20～29歳	58	49.9%	5.7%
	30～39歳	77	42.6%	6.9%
	40～49歳	117	39.1%	5.1%
	50～59歳	115	32.2%	3.7%
	60～69歳	192	46.2%	2.4%
	70歳以上	345	57.9%	2.0%
	(再掲)20歳以上	904	47.5%	1.2%
	(再掲)65～74歳	255	49.4%	2.4%
	(再掲)75歳以上	200	63.2%	2.2%
	(再掲)20歳以上※1	904	46.2%	1.5%
	(再掲)20～49歳※1	252	42.9%	4.5%
	(再掲)65～74歳※1	255	49.9%	2.2%
(再掲)75歳以上※1	200	63.8%	2.2%	
男性	10-14歳	12	77.0%	10.9%
	15-19歳	17	79.0%	8.8%
	20～29歳	28	40.4%	6.5%
	30～39歳	40	35.1%	7.8%
	40～49歳	59	30.5%	4.9%
	50～59歳	57	26.2%	3.6%
	60～69歳	84	43.3%	3.4%
	70歳以上	160	50.4%	4.2%
	(再掲)20歳以上	428	40.7%	1.7%
	(再掲)65～74歳	127	44.7%	3.7%
	(再掲)75歳以上	89	56.8%	4.0%
	(再掲)20歳以上※1	428	38.6%	1.7%
	(再掲)20～49歳※1	127	34.6%	3.5%
	(再掲)65～74歳※1	127	44.9%	3.7%
(再掲)75歳以上※1	89	56.8%	4.0%	
女性	10-14歳	12	98.0%	2.1%
	15-19歳	20	71.6%	9.0%
	20～29歳	30	61.4%	9.7%
	30～39歳	37	50.1%	7.3%
	40～49歳	58	47.8%	7.9%
	50～59歳	58	38.4%	7.8%
	60～69歳	108	48.5%	5.4%
	70歳以上	185	64.8%	3.2%
	(再掲)20歳以上	476	53.9%	2.4%
	(再掲)65～74歳	128	54.2%	4.0%
	(再掲)75歳以上※1	111	68.9%	2.6%
	(再掲)20歳以上※1	476	53.5%	2.7%
	(再掲)20～49歳※1	125	52.1%	6.8%
	(再掲)65～74歳※1	128	54.9%	4.1%
(再掲)75歳以上※1	111	68.9%	2.6%	

注1) 調査票No.2の問15、又はNo.3の問13に回答した者を集計対象とし、「ゆっくりよく噛んで食べている」、「どちらかといえばゆっくりよく噛んで食べている」と回答した者を「ゆっくりよく噛んで食べる者」とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問15、No.3 問13:

あなたはふだんゆっくりよく噛んで食べていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表89 地域社会とのつながりの状況－地域社会とのつながりの状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		人数	ア お互いに助け合っている		イ 信頼できる		ウ お互いにあいさつしている		エ 問題が生じた場合、力を合わせて解決しようとする	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	58	28.1%	5.9%	31.0%	7.3%	43.0%	7.6%	15.3%	5.2%
	30～39歳	77	42.0%	5.3%	42.5%	8.4%	66.8%	5.5%	36.1%	6.2%
	40～49歳	116	34.0%	6.6%	39.5%	5.8%	72.6%	5.4%	32.6%	5.1%
	50～59歳	115	41.3%	6.9%	48.9%	6.4%	78.1%	5.5%	40.4%	5.9%
	60～69歳	192	46.8%	3.4%	54.7%	4.5%	85.5%	3.8%	46.9%	4.5%
	70歳以上	345	56.0%	3.1%	65.6%	3.6%	89.4%	2.5%	57.0%	3.3%
	(再掲)20歳以上	903	46.1%	3.2%	53.2%	3.6%	79.8%	3.1%	44.8%	3.2%
	(再掲)65～74歳	255	54.0%	2.1%	59.3%	4.2%	86.2%	3.6%	57.5%	2.3%
	(再掲)75歳以上	200	57.6%	4.5%	68.3%	4.2%	88.4%	3.3%	52.9%	3.7%
	(再掲)20歳以上※1	903	43.8%	3.7%	50.3%	3.7%	76.4%	3.4%	41.8%	3.2%
	(再掲)20～49歳※1	251	34.6%	4.8%	37.9%	2.8%	62.6%	3.9%	28.8%	2.7%
	(再掲)65～74歳※1	255	54.5%	2.2%	60.1%	4.3%	86.9%	3.6%	58.3%	2.4%
	(再掲)75歳以上※1	200	57.8%	4.6%	68.3%	4.3%	88.2%	3.4%	53.2%	3.7%
男性	20～29歳	28	19.0%	8.3%	29.6%	13.3%	44.2%	9.5%	11.8%	6.1%
	30～39歳	40	32.0%	10.3%	33.1%	8.0%	59.6%	6.6%	29.2%	11.1%
	40～49歳	58	27.9%	5.9%	33.6%	7.6%	69.1%	5.0%	27.4%	5.0%
	50～59歳	57	32.7%	10.0%	43.3%	8.4%	68.3%	7.0%	35.2%	7.0%
	60～69歳	84	44.7%	4.8%	55.0%	6.5%	86.2%	6.2%	50.5%	6.6%
	70歳以上	160	51.2%	3.6%	63.3%	4.9%	87.6%	3.3%	53.3%	5.0%
	(再掲)20歳以上	427	40.0%	4.3%	49.5%	5.0%	76.4%	3.9%	41.5%	4.1%
	(再掲)65～74歳	127	50.4%	3.1%	59.4%	6.4%	84.4%	6.1%	57.5%	5.1%
	(再掲)75歳以上	89	55.5%	4.4%	69.1%	4.2%	89.6%	4.1%	50.0%	5.2%
	(再掲)20歳以上※1	427	36.7%	4.9%	45.6%	5.4%	72.2%	3.9%	37.3%	4.0%
	(再掲)20～49歳※1	126	26.7%	6.6%	32.4%	6.0%	59.3%	4.5%	23.7%	4.3%
	(再掲)65～74歳※1	127	50.7%	3.1%	59.7%	6.4%	84.3%	6.3%	57.5%	5.2%
	(再掲)75歳以上※1	89	55.5%	4.4%	69.1%	4.2%	89.6%	4.1%	50.0%	5.2%
女性	20～29歳	30	39.0%	8.6%	32.6%	6.3%	41.5%	9.6%	19.5%	5.1%
	30～39歳	37	52.1%	8.7%	51.9%	12.1%	74.1%	6.3%	43.0%	7.6%
	40～49歳	58	39.9%	8.9%	45.3%	7.6%	76.1%	6.3%	37.8%	7.2%
	50～59歳	58	50.1%	6.4%	54.6%	5.9%	88.0%	4.3%	45.7%	6.3%
	60～69歳	108	48.5%	3.1%	54.4%	5.1%	84.9%	2.7%	44.0%	5.1%
	70歳以上	185	60.5%	4.2%	67.7%	3.5%	91.1%	2.3%	60.4%	2.5%
	(再掲)20歳以上	476	51.8%	2.6%	56.7%	3.2%	83.1%	2.4%	48.0%	2.4%
	(再掲)65～74歳	128	57.7%	3.2%	59.2%	3.7%	88.1%	2.4%	57.5%	2.3%
	(再掲)75歳以上	111	59.4%	5.8%	67.7%	5.6%	87.3%	4.2%	55.4%	3.6%
	(再掲)20歳以上※1	476	50.7%	3.0%	54.8%	3.1%	80.5%	2.9%	46.0%	2.5%
	(再掲)20～49歳※1	125	43.3%	6.3%	43.9%	4.3%	66.3%	4.7%	34.4%	3.0%
	(再掲)65～74歳※1	128	58.3%	3.4%	60.5%	3.8%	89.4%	2.3%	59.1%	2.2%
	(再掲)75歳以上※1	111	59.4%	5.8%	67.7%	5.6%	87.3%	4.2%	55.4%	3.6%

注1) 調査票No.2の問16のア、イ、ウ、エにそれぞれ回答した者を集計対象とし「強く思う」、「どちらかといえば思う」と回答した者の割合を集計した。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問16:

あなたのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている
- イ あなたのお住まいの地域の人々は、信頼できる
- ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いにあいさつをしている
- エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする

表90 ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を認知している人の割合－年齢階級別、割合、標準誤差(認知)
－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	知っている人の割合		
		割合	標準誤差	
総数	20～29歳	58	32.5%	10.2%
	30～39歳	76	43.0%	6.4%
	40～49歳	117	38.4%	4.4%
	50～59歳	114	42.4%	4.1%
	60～69歳	192	49.6%	4.3%
	70歳以上	344	45.5%	2.8%
	(再掲)20歳以上	901	44.0%	1.9%
	(再掲)65～74歳	255	47.9%	3.4%
	(再掲)75歳以上	199	43.3%	3.5%
	(再掲)20歳以上※1	901	42.8%	2.1%
	(再掲)20～49歳※1	251	37.9%	4.7%
	(再掲)65～74歳※1	255	49.2%	3.3%
(再掲)75歳以上※1	199	43.4%	3.5%	
男性	20～29歳	28	34.7%	10.1%
	30～39歳	39	32.5%	9.8%
	40～49歳	59	34.1%	6.4%
	50～59歳	57	27.0%	5.0%
	60～69歳	84	48.7%	5.0%
	70歳以上	160	36.1%	4.1%
	(再掲)20歳以上	427	36.6%	2.2%
	(再掲)65～74歳	127	39.0%	3.4%
	(再掲)75歳以上	89	41.6%	4.3%
	(再掲)20歳以上※1	427	35.6%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	126	33.8%	5.0%
	(再掲)65～74歳※1	127	39.7%	3.4%
(再掲)75歳以上※1	89	41.6%	4.3%	
女性	20～29歳	30	30.0%	13.8%
	30～39歳	37	53.4%	7.1%
	40～49歳	58	42.7%	5.8%
	50～59歳	57	58.4%	4.6%
	60～69歳	108	50.2%	5.5%
	70歳以上	184	54.2%	2.7%
	(再掲)20歳以上	474	50.9%	2.0%
	(再掲)65～74歳	128	57.1%	4.0%
	(再掲)75歳以上	110	44.8%	4.8%
	(再掲)20歳以上※1	474	49.9%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	125	42.4%	6.5%
	(再掲)65～74歳※1	128	58.8%	3.7%
(再掲)75歳以上※1	110	44.8%	4.8%	

注1) 調査票No.2の問17に回答した者を集計対象とし、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)という言葉が「言葉も意味もよく知っていた」、「言葉も知っていたし、意味も大体知っていた」、「言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった」、「言葉は聞いたことがあるが意味は知らなかった」と回答した者を「知っている人の割合」とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問17:

あなたはロコモティブシンドローム(運動器症候群)という言葉やその意味を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表91 COPDの認知—COPDの認知、年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上

	性年齢	総数	知っていた人の割合	
			割合	標準誤差
総数	20～29歳	58	30.9%	6.0%
	30～39歳	76	44.0%	4.8%
	40～49歳	117	51.4%	5.6%
	50～59歳	115	48.7%	5.8%
	60～69歳	192	40.6%	3.7%
	70歳以上	345	29.7%	3.3%
	(再掲)20歳以上	903	38.9%	2.2%
	(再掲)65～74歳	255	36.2%	3.5%
	(再掲)75歳以上	200	25.9%	3.2%
	(再掲)20歳以上※1	903	40.1%	2.3%
	(再掲)20～49歳※1	251	43.4%	3.9%
	(再掲)65～74歳※1	255	36.9%	3.4%
	(再掲)75歳以上※1	200	26.2%	3.2%
男性	20～29歳	28	25.0%	5.0%
	30～39歳	39	29.8%	6.4%
	40～49歳	59	48.4%	7.8%
	50～59歳	57	40.6%	5.7%
	60～69歳	84	43.2%	4.5%
	70歳以上	160	23.6%	4.8%
	(再掲)20歳以上	427	34.0%	2.8%
	(再掲)65～74歳	127	31.8%	3.0%
	(再掲)75歳以上	89	23.2%	5.1%
	(再掲)20歳以上※1	427	34.9%	2.8%
	(再掲)20～49歳※1	126	36.3%	4.9%
	(再掲)65～74歳※1	127	32.4%	3.1%
	(再掲)75歳以上※1	89	23.2%	5.1%
女性	20～29歳	30	37.9%	12.0%
	30～39歳	37	58.1%	6.2%
	40～49歳	58	54.5%	4.3%
	50～59歳	58	57.0%	7.6%
	60～69歳	108	38.6%	4.4%
	70歳以上	185	35.3%	2.9%
	(再掲)20歳以上	476	43.5%	2.1%
	(再掲)65～74歳	128	40.6%	4.5%
	(再掲)75歳以上	111	28.4%	4.2%
	(再掲)20歳以上※1	476	45.0%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	125	51.1%	4.7%
	(再掲)65～74歳※1	128	41.4%	4.5%
	(再掲)75歳以上※1	111	28.4%	4.2%

注1) 調査票No.2の問18に回答した者を集計対象とし、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という言葉を「どんな病気かよく知っていた」、「名前は聞いたことがあった」と回答した者を「知っていた人の割合」とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問18:

あなたはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表92 健康寿命の認知－健康寿命の認知、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

	性年齢	総数	言葉も意味もよく知っていた人の割合		意味も大体知っていた人の割合	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	58	21.2%	7.1%	30.2%	5.8%
	30～39歳	76	34.5%	7.4%	28.1%	6.6%
	40～49歳	117	22.8%	5.5%	25.3%	5.9%
	50～59歳	115	32.8%	5.1%	32.7%	4.5%
	60～69歳	191	35.2%	3.9%	40.2%	4.4%
	70歳以上	345	29.6%	2.3%	37.3%	1.6%
	(再掲)20歳以上	902	30.2%	2.6%	34.3%	2.0%
	(再掲)65～74歳	254	33.1%	2.6%	37.9%	4.3%
	(再掲)75歳以上	200	27.5%	4.1%	37.4%	3.3%
	(再掲)20歳以上※1	902	29.4%	2.7%	32.9%	2.0%
	(再掲)20～49歳※1	251	25.8%	3.9%	27.0%	4.2%
	(再掲)65～74歳※1	254	33.3%	2.4%	38.1%	4.2%
	(再掲)75歳以上※1	200	27.4%	4.1%	37.2%	3.6%
男性	20～29歳	28	17.0%	7.3%	35.9%	6.4%
	30～39歳	39	31.1%	11.8%	11.6%	5.7%
	40～49歳	59	16.4%	7.5%	21.4%	6.2%
	50～59歳	57	21.0%	5.3%	36.4%	6.3%
	60～69歳	84	30.0%	4.6%	39.5%	3.9%
	70歳以上	160	26.9%	2.7%	36.5%	3.9%
	(再掲)20歳以上	427	24.9%	2.9%	32.5%	2.4%
	(再掲)65～74歳	127	26.2%	3.6%	35.8%	5.0%
	(再掲)75歳以上	89	28.8%	4.8%	39.1%	2.6%
	(再掲)20歳以上※1	427	23.9%	3.1%	31.0%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	126	21.1%	4.8%	22.4%	4.3%
	(再掲)65～74歳※1	127	26.4%	3.6%	36.0%	4.9%
	(再掲)75歳以上※1	89	28.8%	4.8%	39.1%	2.6%
女性	20～29歳	30	26.3%	13.3%	23.5%	9.4%
	30～39歳	37	38.0%	6.2%	44.4%	9.4%
	40～49歳	58	29.1%	5.1%	29.2%	7.7%
	50～59歳	58	45.0%	9.4%	28.8%	4.3%
	60～69歳	107	39.4%	4.6%	40.8%	7.5%
	70歳以上	185	32.0%	3.2%	37.9%	3.6%
	(再掲)20歳以上	475	35.2%	3.2%	36.1%	2.8%
	(再掲)65～74歳	127	40.2%	3.6%	40.1%	5.4%
	(再掲)75歳以上	111	26.3%	4.5%	35.9%	6.3%
	(再掲)20歳以上※1	475	34.7%	3.4%	34.8%	2.8%
	(再掲)20～49歳※1	125	31.0%	4.3%	32.1%	5.7%
	(再掲)65～74歳※1	127	40.2%	3.4%	40.3%	5.2%
	(再掲)75歳以上※1	111	26.3%	4.5%	35.9%	6.3%

注1) 調査票No.2の問19に回答した者を集計対象とし、健康寿命という言葉が「言葉も意味もよく知っていた」、「言葉も知っていたし、意味も大体知っていた」、「言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった」、「言葉は聞いたことがあるが意味は知らなかった」、「言葉も意味も知らなかった」と回答した者の中で「言葉も意味もよく知っていた」、「意味も大体知っていた人の割合」とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問19:

あなたは「健康寿命」という言葉やその意味を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

表93 ぐんま元気(GENKI)の5か条を認知している人の割合—年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	知っている人の割合		
		割合	標準誤差	
総数	20～29歳	58	23.6%	7.1%
	30～39歳	76	18.6%	3.4%
	40～49歳	117	15.8%	4.2%
	50～59歳	115	23.4%	5.9%
	60～69歳	192	31.7%	3.6%
	70歳以上	345	44.2%	3.1%
	(再掲)20歳以上	903	31.3%	2.2%
	(再掲)65～74歳	255	37.5%	4.5%
	(再掲)75歳以上	200	42.9%	4.5%
	(再掲)20歳以上※1	903	28.8%	2.2%
	(再掲)20～49歳※1	251	18.6%	2.2%
	(再掲)65～74歳※1	255	38.2%	4.6%
(再掲)75歳以上※1	200	42.6%	4.5%	
男性	20～29歳	28	21.4%	6.1%
	30～39歳	39	10.7%	4.3%
	40～49歳	59	17.2%	6.8%
	50～59歳	57	20.4%	6.6%
	60～69歳	84	28.0%	7.0%
	70歳以上	160	41.8%	3.8%
	(再掲)20歳以上	427	28.3%	2.8%
	(再掲)65～74歳	127	30.1%	5.5%
	(再掲)75歳以上	89	46.2%	5.2%
	(再掲)20歳以上※1	427	25.3%	2.3%
	(再掲)20～49歳※1	126	16.4%	3.2%
	(再掲)65～74歳※1	127	29.7%	5.6%
(再掲)75歳以上※1	89	46.2%	5.2%	
女性	20～29歳	30	26.2%	10.6%
	30～39歳	37	26.4%	5.4%
	40～49歳	58	14.5%	5.1%
	50～59歳	58	26.5%	8.1%
	60～69歳	108	34.6%	3.3%
	70歳以上	185	46.4%	3.6%
	(再掲)20歳以上	476	34.1%	2.4%
	(再掲)65～74歳	128	45.1%	7.5%
	(再掲)75歳以上	111	39.9%	5.7%
	(再掲)20歳以上※1	476	32.2%	2.8%
	(再掲)20～49歳※1	125	21.1%	5.0%
	(再掲)65～74歳※1	128	46.8%	7.6%
(再掲)75歳以上※1	111	39.9%	5.7%	

注1) 調査票No.2の問20に回答した者を集計対象とし、「ぐんま元気(GENKI)の5か条」を「言葉も意味もよく知っていた」、「言葉も知っていたし、意味も大体知っていた」、「言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった」、「言葉は聞いたことがあるが意味は知らなかった」と回答した者を「知っている人の割合」とした。

注2) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR3人口構成に合わせるための重み付けをした値。

No.2 問20:

あなたは群馬県の健康寿命の延伸 県民運動「ぐんま元気(GENKI)の5か条」を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

