

クビアカツヤカミキリ対策に使用できる農薬（令和7年3月17日現在）

農薬を使用する場合は、ラベル等に記載されている使用方法や注意事項を守って使用してください。

樹幹注入

薬剤名(有効成分名)	作物名	使用時期	備考
アトラック液剤 (チアメトキサム)	サクラ	幼虫発生前～幼虫発生期	—
ウッドスター (ジノテフラン)	サクラ	新葉展開後～落葉前まで	—
リバイブ (エマメクチン安息香酸塩)	サクラ	発生前～発生期	—

フラス孔注入

薬剤名(有効成分名)	作物名	使用時期	備考
園芸用キンチョールE (ペルメトリン)	サクラ	—	スプレー式
マツグリーン液剤2 (アセタミプリド)	サクラ	発生初期	—
バイオセーフ (スタイナーネマカーボカプサエ)	サクラ、ウメ、モモ	幼虫発生期	生物農薬
アクセルフロアブル (メタフルミゾン)	サクラ	—	—
ベニカカミキリシエアゾール/ロビンフッド (フェンプロパトリン)	樹木類 ウメ、モモ、スモモ、おうとう、果樹類(※)	— 収穫前日まで	スプレー式

果樹類(※):かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、すもも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴーを除く

散布

薬剤名(有効成分名)	作物名	使用時期	備考
スミチオン乳剤 (MEP)	サクラ モモ ウメ	成虫の発生初期 成虫発生初期但し、収穫3日前まで 成虫発生初期但し、収穫14日前まで	—
スミパイン乳剤 (MEP)	樹木類	成虫の発生初期又は直前	—
オリオン水和剤40 (アラニカルブ)	ウメ、小粒核果類(※1) モモ ネクタリン サクラ	成虫発生期但し、収穫7日前まで 成虫発生期但し、収穫14日前まで 成虫発生期但し、収穫21日前まで 成虫発生期	—
アクタラ顆粒水溶剤 (チアメトキサム)	モモ、ネクタリン、おうとう ウメ、小粒核果類(※1)	収穫前日まで 収穫7日前まで	—
ダントツ水溶剤/ベニカ水溶剤 (クロチアニジン)	サクラ ウメ モモ スモモ	成虫発生初期 収穫前日まで 収穫7日前まで 収穫3日前まで	—
マツグリーン液剤2 (アセタミプリド)	サクラ	成虫発生初期	—
ハチハチフロアブル (トルフェンピラド)	モモ、ネクタリン	成虫発生期但し、収穫前日まで	—
アクセルフロアブル (メタフルミゾン)	サクラ ウメ、モモ類、スモモ	成虫発生直前～成虫発生期 収穫前日まで	—
モスピラン顆粒水溶剤 (アセタミプリド)	サクラ ウメ、モモ、スモモ、 おうとう、小粒核果類(※2)	発生初期 収穫前日まで	—
トルネードエースDF (インドキサカルブ)	サクラ	成虫発生初期	—
ベニカカミキリシエアゾール/ ロビンフッド (フェンプロパトリン)	樹木類	成虫発生初期	スプレー式
テツパン液剤 (シクラニプロール)	モモ、おうとう、小粒核果類	収穫前日まで	—
ダブルトリガー液剤 (シクラニプロール)	サクラ	発生初期	—
ファイントリムDF (インドキサカルブ)	サクラ	成虫発生初期	—
カルホス乳剤 (イソキサチオン)	サクラ	成虫発生初期	—
アグロスリン水和剤 (シネルメトリン)	サクラ モモ、スモモ、ネクタリン おうとう	成虫の発生初期 収穫前日まで 収穫の3日前まで	—

小粒核果類(※1):アンズ、ウメ、スモモ(ウメを除く)

小粒核果類(※2):アンズ、ウメ、スモモ(ウメ、スモモを除く)

樹木類:食用又は飼料用に利用されないもの

くん蒸

薬剤名(有効成分名)	作物名	くん蒸時間
NCS (カーバム)	サクラ、ウメ、モモ、スモモ	14日以上
キルパー 40 (カーバムナトリウム塩)	サクラ、ウメ、モモ、スモモ	14日以上

木に巻き付ける

薬剤名(有効成分名)	作物名	使い方
バイオリサ・カミキリ (ボーベリアブロンニアティ)	サクラ、果樹類	木の幹に巻き付ける